

**MANUEL COMPLET
DE BOTANIQUE,
DEUXIÈME PARTIE.**

**FLORE
FRANÇAISE,**

ou

DESCRIPTION SYNOPTIQUE

DE TOUTES LES PLANTES PHANÉROGAMES ET CRYPTOAMES QUI
CROISSENT NATURELLEMENT SUR LE SOL FRANÇAIS, AVEC LES
CARACTÈRES DES GENRES DES AGAMES, ET L'INDICATION DES
PRINCIPALES ESPÈCES ;

PAR M. J. A. BOISDUVAL,
Membre de plusieurs Sociétés savantes.

TOME PREMIER.

PARIS,
RORET, LIBRAIRE, RUE HAUTEFEUILLE,
AU COIN DE CELLE DU BATTOIR.

1828.

ovales, dentées, pubescentes en dessous; fleurs blanches, en ombelle, presque sessiles; fruit petit, globuleux, rouge ou noir, très peu charnu, sucré et un peu amer. $\bar{H}$. Commun dans les bois.

7. CERISIER-BIGARREAUTIER (*C. duracina*, DC. fl. fr. *Pr. avium*, L. sp. var. β . γ .).

Arbre de la taille du précédent; feuilles dentées, pendantes; fleurs blanches, en ombelle, presque sessiles; fruit charnu, dur, sucré, un peu cordiforme. $\bar{H}$. Cultivé.

Nota. Les cerisiers présentent, en outre, une très grande quantité de variétés décrites par Dubamel. Nous n'affirmons pas que, dans le principe, les cinq dernières espèces n'auraient pas eu la même origine, il est presque impossible de s'en assurer; car, excepté le merisier, les autres ne se trouvent pas à l'état sauvage: toutes ces espèces se multiplient par greffe sur le merisier.

Genre PRUNIER (*Prunus*, TOURN. LIN.).

Drupe charnu, glabre, sillonné sur un de ses côtés, et couvert d'une poussière très fine, de couleur glauque; noyau oval-oblong, comprimé, un peu rude, pointu au sommet.

Espèce 1. PRUNIER ÉPINEUX (*Prunus spinosa*, L. sp. 681).

Arbrisseau à écorce noirâtre; rameaux nombreux; feuilles elliptiques-lancéolées, pubescentes en dessous; fleurs blanches, nombreuses, naissant avant les feuilles; fruits petits, sphériques, d'un noir bleuâtre, d'une saveur très astringente. $\bar{H}$. Commun dans les haies et au bord des bois.

2. PRUNIER DE BRIANÇON (*P. Brigantiacae*, VILL. dauph. i. p. 299).

Arbrisseau à écorce brune, à rameaux nombreux; feuilles ovales, mucronées, glabres, doublement dentées; fleurs blanches, petites, presque sessiles, réunies 3-4 ensemble; fruits d'un blanc jaunâtre ou rous-

sâtre. H. Commun dans les Alpes depuis le Lautaret jusqu'à Briançon. La célèbre huile de marmotte s'extrait des amandes de cet arbrisseau.

3. PRUNIER DOMESTIQUE (*P. domestica*, L. sp. 680).

Arbre de petite taille; à écorce d'un brun grisâtre, à rameaux étalés; feuilles ovales-lancéolées, un peu velues en dessous, dentées; fleurs blanches, nombreuses; fruit très variable, toujours couvert d'une poussière glauque. H. Le prunier présente une foule de variétés obtenues par la culture.

Genre ABRICOTIER (*Armeniaca*, TOURN. JUSS. *Prunus*, L.).

Drupe arrondi, offrant un sillon profond sur une de ses faces, et muni d'un duvet court; noyau arrondi, comprimé, sillonné des deux côtés.

Espèce. ABRICOTIER COMMUN (*Armeniaca vulgaris*, LAM. D. I. p. 2. *Pr. armeniaca*, L.).

Arbre de petite taille, à rameaux ramassés en tête; feuilles glabres, ovales, dentées, un peu cordiformes; fleurs blanches, se développant avant les feuilles. H. Cultivé partout pour l'excellence de son fruit; offre beaucoup de variétés. H. Originaire d'Arménie.

Genre AMANDIER (*Amygdalus*, L. JUSS.).

Drupe oblong, un peu charnu, recouvert d'un duvet court; noyau oblong, lisse, se terminant en pointe et criblé de trous enfoncés.

Espèce. AMANDIER COMMUN (*Amygdalus communis*, L. sp. 677).

Arbre de petite taille, à rameaux étalés; feuilles allongées, étroites, pointus, dentées; fleurs roses, gémées. H. Provinces méridionales. Le péricarpe de ce fruit ne se mange pas, mais ses amandes sont excellentes.