

BULLETIN BI-MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

Secrétaire gen. : M. P. NICOD, 122, r. St-Georges ; Trésorier : M. F. RAVINET, 11, r. Franklin

Abonnement	} France et Colonies fr ^{es}	10 fr.
		annuel

SIÈGE SOCIAL A LYON :
33, Rue Bossuet (Immeuble Municipal)

2952 MEMBRES

MULTA PAUCIS

Chèques postaux
c/c Lyon, 101-98**PARTIE ADMINISTRATIVE**

LE BULLETIN NE PARAÎT PAS PENDANT LES VACANCES JUILLET-AOUT

Admissions.*Ont été admis à la séance du 11 juin.*MM. Arditi, Ducharne, Stakman, M^{lle} Ottley, MM. Graves, Paniel, Faz, M^{lle} Maigre, MM. Boiteux, John, Balme, Demare.**ORDRE DU JOUR**

DE LA

Séance générale du Jeudi 27 Juin 1929, à 17 heures1^o *Vote sur l'admission des candidats présentés le 11 juin auxquels est ajouté :*M. Maréchal (J.), 33, rue Centrale, Lyon (2^e), parrains : M. le professeur et M^{lle} Beauverie.2^o *Présentation de :*M. Courtier (Jules), pharmacien, le Pouzin (Ardèche). — M. Cru (Henri), pharmacien, le Pouzin (Ardèche). — M. Chaze (Emile), la Voulte-sur-Rhône (Ardèche), par MM. Marin et Riel. — M. Riquelme Inda (Ing. Julio) 3/a, Alamo 99, Mexico, D. F. (Mexique), par MM. Balme et Riel. — M. Moresco (Théodore), 1, impasse Flesselles, Lyon (1^{er}), par MM. Guillon et Riel. — M. Robinson (B.-L.), Gray Herbarium, Cambridge, Mass. (U. S. A.) *Botanique, spéc. Composées Eupatoriées*, par MM. Fernald et Riel. — M. Lagoutte (Maurice), 2, quai du Loui, Roanne (Loire), par MM. Depaux et Larue. —

tata vel sinuata, nervis literalibus utrinque 11-12; petiolus glaber, 4-6 mm. longus. Spica fructifera 5-12 cm. longa. Cupula asymmetrica, 2,5-2,8 cm. longa, 2,2-2,5 cm. diam., aculeis remotis 6-8 mm. longis ornata. Glans ovoidea, 1,3-1,5 cm. diam.; cicatrix rugosa.

Kouy-tchéou : Pin-fa (Cavalerie, n° 57, in herb. Mus. Par.).

L'espèce suivante a été récoltée par Rock, au Yun-nan : *C. Rockii* A. Camus, n. sp.

Arbor 24-27 m. alta. Rami glabri. Folia subelliptica, basi attenuata, apice acuminata, 13-22 cm. longa, 4,5-6 cm. lata, supra glabra, margine integra, nervis lateralibus utrinque 15-16; petiolus 1 cm. longus, glaber. Cupula sphaerica, 7 cm. diam., aculeis confertis 2 cm. longis.

Yun-nan : entre Tengyueh et Lungling (Rock, pl. Yunnan, n° 7229).

Diffère du *C. Lecomtei* Hickel et A. Camus par ses cupules bien plus grosses, à paroi cachée par les aiguillons, ceux-ci plus longs, moins gros et glabres, la partie inerme de la cupule extrêmement restreinte, cachée par les épines voisines.

Se distingue du *C. megacarpa* Gamble, dont il rappelle les cupules, par ses feuilles plus minces, de forme différente.

SECTION ENTOMOLOGIQUE

Séance du 4 Juin

A propos de « *Tritonus cribratus* » Muls.

Par M. G. SÉRULLAZ

M. G. SÉRULLAZ analyse un savant mémoire de M. d'ORCHYMONT sur *Tritonus cribratus* MULSANT (*Annales de la Société Entomolog. de Belgique*, t. LXIX, 1929). Le type de *T. cribratus* fait partie des collections du Muséum de Lyon.

L'exemplaire unique provenant de l'île de France (île Maurice) avait appartenu à LATREILLE et passa dans la collection DÉJEAN où il figure sous le nom d'*Hydrophilus (Cyclonatum) cribratus*. En 1844, MULSANT le décrivit sous le nom d'*Hydrobius cribratus* et créa pour cet Hydrophilide le genre *Tritonus*. Ce genre nouveau fut jugé discutable et l'insecte resta énigmatique.

A la suite d'une étude minutieuse, M. d'ORCHYMONT a reconnu la par-faite probité de la diagnose de MULSANT et la validité du genre créé par lui.

Présentation d'insectes.

M. le Dr BONNAMOUR présente un couple d'*Hypera oxalidis* Herbst. var. *Ovalis* Boh. (Coléoptères Curculionides) capturé à terre à Mègeve (Haute-Savoie). Le type et sa variété ont une aire de répartition assez limitée. En France, CAPIOMONT ne signale l'espèce que des montagnes des Vosges, du Jura, de la Savoie et de la Haute-Loire. Il convient d'ajouter que le Dr ROBERT l'a prise à Morzine (Haute-Savoie) et M. G. SÉRULLAZ à la Grande-Sure (Isère).

M. J. JACQUET présente deux exemplaires de la var. *nigricans* Muls. d'*Aphodius scybalarius* F. (Coléoptères Scarabéidés) qui diffère du type par ses élytres entièrement noirs. Si le type est relativement fréquent dans la région lyonnaise, la variété est très rare. A Bron (Rhône), notre distingué collègue ne l'a capturée que deux fois volant aux premiers soleils de février.