

ANNALES
DE LA
SOCIÉTÉ BOTANIQUE
DE LYON

Paraissant tous les trois mois

TOME XXXIV (1909)

NOTES ET MÉMOIRES

COMPTES RENDUS DES SÉANCES

1-2 1909



SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

1, PLACE D'ALBON, 1

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38.

1909

critiques ou intéressantes ont été soumises à notre éminent maître, M. E. Boudier, que nous sommes heureux de pouvoir, à cette occasion, remercier une fois de plus de son inépuisable bienveillance.

SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 1909

PRÉSIDENCE DE M. LE D^r RIEL

M. PRUDENT analyse une brochure de M. le professeur Muller, de Berlin, sur les Diatomées de la Patagonie, et fait remarquer la similitude de cette flore diatomique avec celle de notre climat, quoique n'étant pas sous le même degré de latitude.

ADMISSIONS

Sont admis membres titulaires de la Société :

M. COTTIN, Louis, 25, rue Sala, présenté par MM. les D^{rs} Philip et Riel.

M. CREBIER, P.-L., 54, rue Sala, présenté par MM. Sogno et Riel.

M. N. ROUX donne de nouveaux renseignements sur le catalogue des plantes de l'Ardèche, de M. Revol, et indique les modifications que l'auteur a apportées à son manuscrit. Il demande que la Société vote sur la publication de ce travail.

M. CL. ROUX souhaite que l'auteur complète son catalogue par une bibliographie.

Après quelques observations de M. le Secrétaire général et de M. Roux, la Société vote la publication de ce catalogue en une seule fois.

M. N. ROUX présente les espèces suivantes, provenant de ses dernières herborisations dans l'Ardèche :

Trifolium angustifolium, *Potentilla hirta*, *Sorbus chamaespilus*, *Alchimilla saxatilis*, Buser., *A. pubescens*, *Herniaria glabra*, *Trifolium spadiceum*, *Adenocarpus cebennensis*, *Genista prostrata*, *Vicia Orobus*, *Melilotus neapolitanus*, *Saxifraga Souliei*, hyb., *S. pedatifida*, *Scleranthus uncinatus*, *Sedum villosum*, *Paronychia polygonifolia*, *Cardamine resedifolia*, *Arabis cebennensis*, *Thlaspi arvernense*, *T. virens*, *Corydalis claviculata*, *Centranthus calcitrapa*, f. *subalbida*, *Xeranthemum cylindraceum*, *Hieracium albulum*, *H. tridentatum*, *Crepis succisifolia*, *Senecio leucophyllus*, *Antirrhinum asarina*, *Plantago carinala*, *Euphorbia flavicoma*, *E. taurinensis*, *Scutellaria alpina*, etc.

M. DUVAL donne lecture d'une note très intéressante sur l'herbier de Félix Plater, d'après le *Journal de Voyage de Montagne*. (Voir Notes et Mémoires.)

M. LE D^r PHÉLIP présente le compte rendu de l'excursion du 31 octobre, à la Tour-de-Salvagny.

Des ondées fréquentes depuis la veille, et aussi pendant l'excursion, après trois semaines de temps secs et la grande pluie de fin septembre, avaient favorisé la croissance des champignons, qui purent être récoltés en grande quantité pendant la course, au début de laquelle M. Colleur a présenté deux espèces trouvées au parc de la Tête d'Or: *Pholiota squarrosa* et *Lepiota haematosperma*, cette dernière sur le tan d'une serre.

Parmi le très grand nombre d'espèces recueillies pendant l'excursion (dans des prairies et bois de chênes et de pins, à sol couvert de mousses, de graminées et de bruyères), j'ai noté les suivantes comme les plus intéressantes. Je les donne dans l'ordre de leur trouvaille.

Tricholoma terreum, var. *atrosquamosum* de Cooke, déterminé par M. Boudier.

Clavaria fastigiata. Cette espèce ressemble à *corniculata*, mais elle en diffère par ses rameaux très fins, crépus, partant très bas, de la base du pied, et dont un très grand nombre ne sont pas terminés en corne bifurquée ou croissant. Elle exhale,

en outre, une très forte odeur de farine rance, qui la fait facilement reconnaître.

Clavaria vermicularis, croissant dans le voisinage de la précédente, en même temps que *Mycena flavoalba*, *Clitocybe dealbata*, *Marasmius scabellus*, *Leptonia sericellum*.

Hygrophorus niveus, à chapeau fréquemment taché de rouge carmin, dans les spécimens de tout âge, altération peut-être due à un microorganisme.

Flammula alnicola, récolté en assez grand nombre sur une souche.

Pholiota spectabilis, à l'état jeune. Cette espèce peut acquérir un très grand développement.

Clitocybe ptyophila et *obsoleta*, tous deux déterminés par M. Boudier, ainsi que les deux espèces qui les précèdent.

Lactarius deliciosus, à chapeau orangé très brun. Le chapeau de cette espèce est très variable de couleur, ainsi que la chair, suivant l'état atmosphérique. Seul, le lait conserve toujours sa couleur jaune safrané. Il en est de même pour *L. sanguifluus*, qui ne varie pas à ce sujet, et dont le lait est toujours rouge de sang.

Cortinarius elatior, *mucosus*, *bolaris*, *brunneus*, *decipiens*, *millinus*, *collinitus*.

Boletus luteus, dont plusieurs spécimens présentaient, au centre de la surface convexe du chapeau, un mamelon conique très marqué, ce qui n'existe ordinairement pas dans cette espèce.

Tricholoma portentosum. Tous les spécimens jeunes ou complètement développés avaient le pied blanc sulfurin. Dans une précédente excursion personnelle que j'ai faite à Givors, les spécimens étaient, pour la plupart, à pied ponctué de noir violacé.

Russula Queletii. Un échantillon à pied entièrement blanc. Un autre à pied rose et à chapeau pourpre, dont la viscosité présentait un reflet violet manifeste. Cette espèce se reconnaît toujours à l'extrême âcreté de sa chair et à la couleur de ses lamelles d'un blanc jaunâtre, couleur de cire (quelquefois un peu olivâtre, d'après Quélet).

Russula integra, variété à chapeau jaune ocracé ou brun

orangé, ressemblant un peu à *mustelina*, mais les lamelles sont plus larges, plus ocracées, toujours fortement réunies par des veines.

Russula serotina, verdâtre, olivâtre et violacée, parfois avec belles taches azurées sur le chapeau et aussi une teinte azurée sur le pied et les lamelles.

Tricholoma inamœnum, blanchâtre, avec odeur de *sulfureum*. Quélet l'indique dans les sapinières montagneuses.

Mycena galericulata, forme à pied renflé en fuseau dans le milieu, tandis qu'il est presque toujours cylindrique. Cette espèce est très polymorphe.

Nolanea pisciodora, à odeur de poisson. Sans ce caractère, il serait facilement confondu avec *N. pascua* ou *Entoloma sericeum*.

Collybia clusilis, toujours avec ses lamelles épaisses et son petit ombilic bien formé.

Mycena rubromarginata, à arête rose, mais à chapeau fauve comme celui d'*aurantiomarginata*, forme par conséquent intermédiaire entre les deux espèces.

Pleurotus pardalis, sur troncs de chênes. Echantillons bien semblables à ceux de Tassin.

Hydnum rufescens, en échantillons bien caractérisés par la couleur plus orangé fauve du chapeau, qui est souvent pelucheux, son pied bien cylindrique et ses aiguillons non décurrents, disposés horizontalement sur la surface inférieure du chapeau et s'arrêtant par une ligne de démarcation nette au niveau du sommet du pied.

SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 1909

PRÉSIDENCE DE M. LE D^r RIEL

M. ABRIAL donne lecture du résumé d'un travail qu'il a présenté en juillet à la Faculté des Sciences de Lyon, pour obtenir