

ANNALES
DE LA
SOCIÉTÉ BOTANIQUE
DE LYON

Paraissant tous les trois mois

TOME XXXIV (1909)

NOTES ET MÉMOIRES

COMPTES RENDUS DES SÉANCES

1-2 1909



SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
1, PLACE D'ALBON, 1

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38.

1909

orangé, ressemblant un peu à *mustelina*, mais les lamelles sont plus larges, plus ocracées, toujours fortement réunies par des veines.

Russula serotina, verdâtre, olivâtre et violacée, parfois avec belles taches azurées sur le chapeau et aussi une teinte azurée sur le pied et les lamelles.

Tricholoma inamœnum, blanchâtre, avec odeur de *sulfureum*. Quélet l'indique dans les sapinières montagneuses.

Mycena galericulata, forme à pied renflé en fuseau dans le milieu, tandis qu'il est presque toujours cylindrique. Cette espèce est très polymorphe.

Nolanea pisciodora, à odeur de poisson. Sans ce caractère, il serait facilement confondu avec *N. pascua* ou *Entoloma seri-ceum*.

Collybia clusilis, toujours avec ses lamelles épaisses et son petit ombilic bien formé.

Mycena rubromarginata, à arête rose, mais à chapeau fauve comme celui d'*aurantiomarginata*, forme par conséquent intermédiaire entre les deux espèces.

Pleurotus pardalis, sur troncs de chênes. Echantillons bien semblables à ceux de Tassin.

Hydnum rufescens, en échantillons bien caractérisés par la couleur plus orangé fauve du chapeau, qui est souvent pelucheux, son pied bien cylindrique et ses aiguillons non décur-rents, disposés horizontalement sur la surface inférieure du chapeau et s'arrêtant par une ligne de démarcation nette au niveau du sommet du pied.

SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 1909

PRÉSIDENCE DE M. LE D^r RIEL

M. ABRIAL donne lecture du résumé d'un travail qu'il a présenté en juillet à la Faculté des Sciences de Lyon, pour obtenir

le « diplôme d'études supérieures de sciences naturelles » : *De la persistance d'une partie de l'albumen chez les graines dites exalbuminées* (1).

M. N. Roux présente des plantes en herbier récoltées dans les Alpes-Maritimes, et en particulier plusieurs espèces de Saxifragas.

M. GIROD présente le compte rendu de l'excursion du 14 novembre, entre Lentilly et Lozanne.

Cette excursion, favorisée par un temps superbe, a permis de récolter les espèces suivantes :

Flammula ochrochlora, poussant en touffes sur bois enfouis dans la terre, reconnaissable à sa couleur foncière jaunâtre pâle, un peu verdâtre, à écailles roussâtres.

Tricholoma sejunctum, récolté en échantillons assez nombreux, à chapeau d'un beau jaune clair, rayé de fibrilles innées et à lamelles bien blanches.

Russula cyanozantha, forme à chapeau d'un pourpre violet, plus rouge que dans le type.

Clavaria fastigiata, déjà récolté dans les excursions précédentes, notamment à la Tour-de-Salvagny, à odeur de farine rance toujours très prononcée.

Cortinarius elatior.

Polyporus lucidus, dont un échantillon à chapeau assez grand, et remarquable par son pied presque exactement central.

Clitocybe ditopus, grisâtre, à chapeau strié sur le bord quand il est humide et à odeur de farine.

Cortinarius hinnuleus, odeur spiritueuse, rappelant celle de l'esprit de bois.

Clavaria cinerea, de couleur grisâtre et de forme variable.

Cantharellus cinereus. Cette espèce ressemble beaucoup en dessus à *Craterellus Cornucopioides*, mais le dessous du chapeau est orné de plis. Comestible au même titre que la corne d'abondance.

Cortinarius decipiens et *C. multiformis*, espèces toutes deux assez communes.

(1) Sera publié dans les Notes et Mémoires de 1910.

Collybia butyracea, var. *phaeopodia*, à chapeau et pied d'un brun bistré.

Une espèce du genre *Tricholome* du groupe *terreum*, ayant l'arête des lamelles ornée d'une bordure noire très marquée, et qui, pour cette raison, a été déterminée *Tricholoma murinaceum*.

Hydnum Queletti, à chapeau présentant des crêtes saillantes radiées.

Cortinarius brunneus, à pied toujours renflé en massue à la base.

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1909

PRÉSIDENTE DE M. LE D^r RIEL

M. PRUDENT présente une étude sur les Diatomées des lacs du Jura. (Voir aux Notes et Mémoires.)

M. CL. ROUX annonce la découverte, par M. de Vilmorin, d'une station de pins à crochets spontanés sur le plateau de la Margeride.

Cette station, jointe à celle du Mont-Dore, découverte par Gay en 1860, et à celle de Pierre-sur-Haute, découverte par d'Alverny en 1902, vient à l'appui de l'hypothèse d'une extension beaucoup plus considérable de cet arbre à l'époque quaternaire dans les tourbières du Plateau Central.

Il est ensuite procédé aux élections du Bureau et des Comités pour 1910.

Sont élus :

Président	Mlle M. RENARD.
Vice-président	M. BEAUVERIE.

Secrétaire général M. le D^r BRETIN.
Secrétaire des séances M. MEYRAN.
Trésorier M. DUVAL.
Bibliothécaire. M. CL. ROUX.

Comité de Finances.

MM. LAVENIR, ROCHELANDET, NIS. ROUX.

Comité d'Herborisations.

MM. ABRIAL, LIGIER, VIVIAND-MOREL.

Comité de Publications.

MM. PRUDENT, D^r RIEL, VIVIAND-MOREL.
