

Bulletin mensuel
de la
**SOCIÉTÉ LINNÉENNE
DE LYON**



Compte rendu faunistique de la sortie entomologique à Fréjus (Var) (7-8 mai 2011) : les Esclamandes et le vallon du Reyran

Bernard Guérin

6 place des Pensées, F 69340 Francheville - beguerin@orange.fr

Faunistical report of the field entomological trip at Fréjus (Var, May 7-8 2011)

Suite à la prospection fructueuse des 29 et 30 mai 2010 (ALLEMAND *et al.*, 2011), notre collègue J.-P. Thélot a renouvelé en 2011 son invitation de prospection des zones humides de la région de Fréjus.

Afin de faciliter les comparaisons entre les deux sorties, nous avons conservé la numérotation des stations qui avait été publiée, et ne signalons que les espèces qui n'avaient pas été inventoriées en 2010.

Station 1 : Les Esclamandes, site qui comprend l'étang de Bret, les dunes, la plage, l'embouchure de l'Argens et sa ripisylve,

Station 4 : Malpasset (vallée du Reyran),

Station 6 : la ferme Saint Benoît, la ripisylve de l'Argens et la prairie.

Cette sortie a permis de compléter l'inventaire des stations autour de Fréjus notamment en Cicindelidae où quatre espèces ont été trouvées : *Cicindela campestris* et *maroccana*, *Cylindera paludosa* et *Lophyra flexuosa*.

On peut signaler deux bonnes espèces, *Chrysolina peregrina* (qui vit sur le fenouil et occupe la région méditerranéenne) et *Dasytes iteratus*, connu en France de la seule vallée de l'Argens, déjà trouvées en 2010.

Nous avons retrouvé en un seul exemplaire le Ténébrionide *Pimelia bipunctata*, signalé comme très commun par G. AUDRAS en 1937 (non trouvé en 2010), et de nombreuses chrysomèles avec notamment *Chrysolina quadrigemina* et *hyperici* en grand nombre, et *Chrysolina rossia*. Une autre espèce particulièrement intéressante, le Dasytide *Aplocnemus coeruleatus*, propre au département du Var, a été trouvé en deux stations en compagnie d'*Oedemera crassipes* qui est assez localisée sur le littoral provençal.

La prospection des hémiptères et odonates a permis d'inventorier respectivement 34 et 12 espèces supplémentaires. Ces espèces n'appellent pas de commentaires particuliers, toutes les espèces de libellules inventoriées étant communes à assez communes dans le Midi de la France. On peut simplement signaler que *Libellula quadrimaculata*, espèce d'étang avec roselière dense, était assez inattendue sur le Reyran.

Remerciements. – Nous remercions J.-P. Thélot pour avoir renouvelé son invitation de 2010, M. Abba, garde du littoral, et tous les autres participants I. de Dinechin, D. Grand, H. Labrique, B. Mouvant et J.-C. Zeddami pour leur contribution à ce compte rendu. Nous remercions également R. Allemand pour son aide à l'identification de nombreuses espèces et la relecture de cet article.

COLÉOPTÈRES			Stations		
			1	4	6
Attelabidae	Attelabus	nitens		4	
Anthicidae	Microhoria	plumbea			6
Buprestidae	Anthaxia	fulgurans		4	
Buprestidae	Ptosima	undecimmaculata		4	
Cantharidae	Cantharis	pallida		4	
Cantharidae	Rhagonycha	femoralis	1		
Carabidae	Agonum	nigrum	1		
Carabidae	Agostenus	vestitus		4	
Carabidae	Anchomenus	dorsalis	1		
Carabidae	Bembidion	varius	1		
Carabidae	Clivina	collaris	1		
Carabidae	Diachromus	germanus		4	
Cerambycidae	Clytus	arietis		4	
Cerambycidae	Dinoptera	collaris		4	
Cerambycidae	Phytoecia	caerulea		4	
Cerambycidae	Phytoecia	icterica	1		
Cetoniidae	Oxythyrea	funesta	1		
Cetoniidae	Tropinota	squalida			6
Chrysomelidae	Chrysolina	haemoptera	1		
Chrysomelidae	Chrysolina	fuliginosa		4	
Chrysomelidae	Chrysolina	quadrigemina		4	
Chrysomelidae	Chrysolina	hyperici	1	4	
Chrysomelidae	Chrysolina	rossia		4	
Chrysomelidae	Cryptocephalus	flavipes		4	
Chrysomelidae	Galeruca	pomoniae		4	
Chrysomelidae	Hispella	atra		4	
Chrysomelidae	Labidostoma	taxicornis		4	
Chrysomelidae	Oulema	melanopa			6
Chrysomelidae	Smaragdina	salicina		4	
Cicindelidae	Cicindela	campestris		4	
Cicindelidae	Cicindela	maroccana		4	
Cicindelidae	Cylindera	paludosa	1		
Cicindelidae	Lophyra	flexuosa	1		6
Cleridae	Tilloidea	unifasciata		4	
Coccinellidae	Coccinula	14 pustulata		4	
Coccinellidae	Exochomus	quadripustulatus			6
Coccinellidae	Hyperaspis	reppensis	1		

Coccinellidae	Hippodaxia	variegata		4	
Coccinellidae	Oenopia	conglobata	1		
Coccinellidae	Psyllobora	vigintiduopunctata	1		
Curculionidae	Dorytomus	longimanus		4	
Curculionidae	Larinus	planus	1	4	6
Curculionidae	Lignyodes	enucleator	1		6
Curculionidae	Lixus	pulverulentus	1		
Curculionidae	Peritelus	sphaeroides			6
Curculionidae	Phyllobius	viridaeris			6
Drilidae	Drilus	flavescens	1	4	6
Elateridae	Athous	haemorrhoidalis		4	
Elateridae	Cardiophorus	biguttatus		4	
Histeridae	Hololepta	plana	1		
Melandryidae	Conopalpus	brevicollis		4	
Melyridae	Dasytes	plumbeus	1		
Oedemeridae	Oedemera	crassipes	1	4	
Pyrochroidae	Pyrochroa	coccinea		4	
Scarabaeidae	Furcouthontophagus	furcatus		4	
Scarabaeidae	Ontophagus	grossepunctatus		4	
Scraptiidae	Anaspis	maculata	1		
Staphylinidae	Philonthus	laminatus		4	
Tenebrionidae	Bioplanes	meridionalis		4	
Tenebrionidae	Gonodera	luperus		4	
Tenebrionidae	Nalassus	dryadophilus		4	
Tenebrionidae	Pimelia	bipunctata			6

NÉVROPTÈRES					
Ascalaphidae	Libelloides	coccajus		4	
Chrysopidae	Nothochrysa	capita		4	

DERMAPTÈRES					
Labiduridae	Labidura	riparia	1		

DIPTÈRES					
Asilidae	Neioitamus	cyanescinctus			6
Asilidae	Stenopogon	sabaudus			6
Asilidae	Rhadiurgus	variabilis		4	

HÉMIPTÈRES					
Alydidae	Camptotus	lateralis		4	
Alydidae	Micrelytra	fossularum	1		
Coreidae	Coreus	marginatus		4	
Coreidae	Enoplops	scapha		4	
Coreidae	Haploprocta	sulcicornis		4	
Lygaeidae	Lygaeus	equestris		4	
Lygaeidae	Peritrechus	graeilicornis			6
Lygaeidae	Rhyparochromus	vulgaris		4	
Lygaeidae	Xanthochilus	quadratus	1		
Miridae	Capsodes	flavomarginatus		4	
Miridae	Capsus	ater	1		
Miridae	Hadrodemus	m-flavum		4	
Miridae	Horistus	orientalis	1		
Miridae	Pachytomella	passerinii			6
Pentatomidae	Aelia	rostrata		4	
Pentatomidae	Carpocoris	fuscispinus	1		
Pentatomidae	Carpocoris	mediterraneus (atlanticus)	1		6
Pentatomidae	Dolycoris	baccarum		4	
Pentatomidae	Eurydema	ornata	1		
Pentatomidae	Eurydema	ventralis	1		
Pentatomidae	Graphosoma	italicum	1	4	
Pentatomidae	Holcostethus	strictus		4	
Pentatomidae	Neotiglossa	leporina	1		
Pentatomidae	Neotiglossa	pusilla	1		
Pentatomidae	Sciocoris	sulcatus	1		
Pentatomidae	Staria	lunata	1		
Scutelleridae	Eurygaster	austriaca		4	
Stenocephalidae	Dicranocephalus	albipes		4	
Stenocephalidae	Dicranocephalus	agilis	1		
Tingidae	Dictyla	echii	1		

HYMÉNOPTÈRES					
Formicidae	Camponotus	piceus		4	
Tanthredidae	Macrophya	montana		4	

ODONATES					
Lestidae	Sympecma	fusca		4	
Coenagrionidae	Pyrrhosoma	nymphula		4	6
Coenagrionidae	Ischnura	elegans	1	4	6
Coenagrionidae	Ischnura	pumilio		4	
Coenagrionidae	Coenagrion	puella		4	
Coenagrionidae	Enallagma	cyathigerum		4	
Aeshnidae	Anax	imperator		4	
Aeshnidae	Anax	parthenope		4	
Libellulidae	Libellula	depressa	1	4	6
Libellulidae	Libellula	quadrifasciata		4	
Libellulidae	Orthetrum	cancellatum		4	
Libellulidae	Sympetrum	fonscolombii		4	

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- ALLEMAND R., PRUDHOMME J.-C. & PONEL Ph., 2011. – Compte rendu faunistique de la sortie entomologique à Fréjus (Var) (29-30 mai 2010) : les étangs de Villepey et le vallon du Reyran. Premières citations pour la France de *Philonthus diversiceps* Bernhauer (Coleoptera Staphylinidae). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 80 (5-6) :131-142.
- AUDRAS G., 1937. – Chasse aux insectes dans les débris végétaux sur la plage de Fréjus. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 6 (7) :105-108.

ANALYSE D'OUVRAGE

Pierre BERGER, 2012 – *Coléoptères Cerambycidae de la faune de France continentale et de Corse. Actualisation de l'ouvrage d'André Villiers, 1978*. Supplément à R.A.R.E., tome XXI. A.R.E. (Association Roussillonnaise d'Entomologie), Perpignan. 663 p., photos couleurs et figures [prix de vente 90 €].

Les Cerambycidae constituent indubitablement la famille de Coléoptères la plus prisee puisque l'ouvrage proposé par Pierre Berger est la sixième faune de France jamais publiée ; la première, rédigée par E. Mulsant, date de 1839 et constitue le premier volume de la fameuse série de l'*Histoire naturelle des Coléoptères de France* éditée à Lyon.

Depuis cette époque, la connaissance de ce groupe attachant a beaucoup progressé et notre faune s'est enrichie de nombreuses espèces. Cette évolution se confirme encore actuellement, grâce notamment aux nombreuses faunes récentes des pays limitrophes qui ont attiré l'attention sur des espèces méconnues. Des espèces introduites se sont acclimatées ; d'autres, restées confondues sous le même taxon, ont pu être séparées ; enfin, quelques-unes très localisées et passées inaperçues ont été découvertes. La dernière faune, publiée par A. Villiers en 1978 (Ed. Lechevalier), est donc devenue insuffisante en raison de l'absence de ces espèces « nouvelles » ; elle comporte également quelques espèces signalées à tort de notre territoire ; enfin, la nomenclature a subi un certain nombre de modifications qu'il était nécessaire de préciser.

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33, rue Bossuet, F-69006 LYON

Tél. et fax : +33 (0)4 78 52 14 33

<http://www.linneenne-lyon.org> — email : societe.linneenne.lyon@wanadoo.fr

Groupe de Roanne : Maison des anciens combattants, 18, rue de Cadore, F-42300 ROANNE

Rédaction : Marie-Claire PIGNAL – Directeur de publication : Bernard GUÉRIN

Conception graphique de couverture : Nicolas VAN VOOREN



Tome 81 Fascicule 5-6 Mai-Juin 2012

SOMMAIRE

Dodelin B. – Situation en Corse de <i>Clamoris crenata</i> (Mulsant) (Coleoptera Tenebrionidae).....	83 - 85
Béguinot J. – Investigations sur la faune cécidogène d'altitude dans le Parc National des Ecrins	87 - 116
Denninger C. et Van Maanen M. – Plantes observées sur un bras de la Saône à Saint-Germain-au Mont-d'Or (Rhône, France).....	117 - 118
Pierotti H. et Rouault E. – Peritelini nouveaux ou intéressants de la faune méditerranéenne occidentale. XVI. <i>Peritelus subsetosus</i> Rey 1894 du sud de la France, espèce valide appartenant au genre <i>Pseudomeira</i> Stierlin 1882 (Coleoptera Curculionidae)	119 - 121
Guérin B. – Compte rendu faunistique de la sortie entomologique à Fréjus (Var) (7-8 mai 2011) : les Esclamandes et le vallon du Reyran	123 - 127
Brunet-Lecomte P. – Présence de la musaraigne de Miller <i>Neomys anomalus</i> Cabrera 1907 (<i>Soricomorpha</i> , <i>Soricidae</i>) dans l'Isle Crémieu (Isère, France).....	129 - 131

Couverture : En herborisant au printemps dans les gorges d'Imbros (Crète), une endémique crétoise *Campanula tubulosa* Lam. Crédit : B. Berthet-Grelier

CONTENTS

Dodelin B. – Status of <i>Clamoris crenata</i> (Mulsant) in Corsica (Coleoptera Tenebrionidae).....	83 - 85
Béguinot J. – Survey of the gall-inducing fauna of uplands in the "Parc National des Ecrins" (French Alps).....	87 - 116
Denninger C. et Van Maanen M. – Vegetation found along a side stretch of the Saône River, near Saint-Germain-au Mont-d'Or (Rhône department, France).....	117 - 118
Pierotti H. et Rouault E. – New and interesting Peritelini of the Western Mediterranean fauna. XVI. <i>Peritelus subsetosus</i> Rey 1894 from Southern France, valid species included in the genus <i>Pseudomeira</i> Stierlin 1882 (Coleoptera Curculionidae).....	119 - 121
Guérin B. – Faunistical report of the field entomological trip at Fréjus (Var) (May 7-8 2011).....	123 - 127
Brunet-Lecomte P. – Presence of Miller's water shrew <i>Neomys anomalus</i> Cabrera 1907 (<i>Soricomorpha</i> , <i>Soricidae</i>) in Isle Crémieu (Isère, France).....	129 - 131

Prix 10 euros

ISSN 0366-1326 • N° d'inscription à la C.P.P.A.P. : 1114 G 85671

Imprimé par Imprimerie Brailly, 69564 Saint-Genis-Laval Cedex

N° d'imprimeur : V0001XX/00 • Imprimé en France • Dépôt légal : mai 2012

Copyright © 2012 SLL. Tous droits réservés pour tous pays sauf accord préalable.