

Bulletin mensuel
de la
**SOCIÉTÉ LINNÉENNE
DE LYON**



ODONATES					
Lestidae	Sympecma	fusca		4	
Coenagrionidae	Pyrrhosoma	nymphula		4	6
Coenagrionidae	Ischnura	elegans	1	4	6
Coenagrionidae	Ischnura	pumilio		4	
Coenagrionidae	Coenagrion	puella		4	
Coenagrionidae	Enallagma	cyathigerum		4	
Aeshnidae	Anax	imperator		4	
Aeshnidae	Anax	parthenope		4	
Libellulidae	Libellula	depressa	1	4	6
Libellulidae	Libellula	quadrifasciata		4	
Libellulidae	Orthetrum	cancellatum		4	
Libellulidae	Sympetrum	fonscolombii		4	

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- ALLEMAND R., PRUDHOMME J.-C. & PONEL Ph., 2011. – Compte rendu faunistique de la sortie entomologique à Fréjus (Var) (29-30 mai 2010) : les étangs de Villepey et le vallon du Reyran. Premières citations pour la France de *Philonthus diversiceps* Bernhauer (Coleoptera Staphylinidae). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 80 (5-6) :131-142.
- AUDRAS G., 1937. – Chasse aux insectes dans les débris végétaux sur la plage de Fréjus. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 6 (7) :105-108.

ANALYSE D'OUVRAGE

Pierre BERGER, 2012 – *Coléoptères Cerambycidae de la faune de France continentale et de Corse. Actualisation de l'ouvrage d'André Villiers, 1978*. Supplément à R.A.R.E., tome XXI. A.R.E. (Association Roussillonnaise d'Entomologie), Perpignan. 663 p., photos couleurs et figures [prix de vente 90 €].

Les Cerambycidae constituent indubitablement la famille de Coléoptères la plus prisee puisque l'ouvrage proposé par Pierre Berger est la sixième faune de France jamais publiée ; la première, rédigée par E. Mulsant, date de 1839 et constitue le premier volume de la fameuse série de l'*Histoire naturelle des Coléoptères de France* éditée à Lyon.

Depuis cette époque, la connaissance de ce groupe attachant a beaucoup progressé et notre faune s'est enrichie de nombreuses espèces. Cette évolution se confirme encore actuellement, grâce notamment aux nombreuses faunes récentes des pays limitrophes qui ont attiré l'attention sur des espèces méconnues. Des espèces introduites se sont acclimatées ; d'autres, restées confondues sous le même taxon, ont pu être séparées ; enfin, quelques-unes très localisées et passées inaperçues ont été découvertes. La dernière faune, publiée par A. Villiers en 1978 (Ed. Lechevalier), est donc devenue insuffisante en raison de l'absence de ces espèces « nouvelles » ; elle comporte également quelques espèces signalées à tort de notre territoire ; enfin, la nomenclature a subi un certain nombre de modifications qu'il était nécessaire de préciser.

Pierre Berger, ami et collaborateur d'A. Villiers, et régulièrement en relation avec d'autres spécialistes français et européens de longicornes, a mené ce projet d'une nouvelle faune de France. Malgré son sous-titre faisant référence à une actualisation, cet ouvrage se présente comme une monographie classique et complète qui se suffit à elle-même. Elle est bâtie sur le modèle de celle d'A. Villiers dont elle est en quelque sorte une réédition corrigée, augmentée et actualisée.

Par rapport à cette faune, le choix de l'auteur s'est porté sur une adaptation fidèle en forme d'hommage, ce qui explique l'importance du volume alors que l'on aurait pu imaginer une version plus courte et plus ciblée. Certaines parties ont été allégées, en particulier les généralités sur le groupe mais aussi les descriptions des taxons supra-génériques ; par contre les descriptions des genres et espèces sont détaillées bien que le texte soit illustré de photos de toutes les espèces et de certaines variétés majeures. Ces photos d'excellente facture sont de taille très inégale et il est regrettable que certaines soient trop réduites limitant ainsi leur intérêt.

La classification et la nomenclature ont été actualisées, avec la réhabilitation de certaines sous-familles et la suppression de plusieurs genres. Cette mise à jour s'accompagne d'une adaptation des clés, sans doute plus faciles à utiliser, malgré une illustration souvent déficiente. La discussion sur les taxons supprimés ou nouveaux pour la faune constitue un des points forts du travail ; les variations subsécifiques sont résumées à l'essentiel, avec abandon des tableaux dichotomiques et de la nomenclature détaillée pour les variétés. Ce choix est tout à fait justifié car l'approche variétiste paraissait excessive chez Villiers et ne méritait pas d'être reproduite.

L'aspect novateur et personnel du travail apparaît également dans les parties traitant de la biologie et de la répartition géographique où les erreurs sont corrigées et les observations sont actualisées à partir de récoltes nouvelles (matériel vérifié) ou de quelques citations récentes fiables. Des données biologiques personnelles, mais aussi des anecdotes de terrain viennent compléter les informations plus classiques.

La formulation des répartitions reste cependant souvent assez vague et confuse. Ce défaut qui avait été reproché à A. Villiers n'est pas totalement réglé, d'autant que le parti pris de l'auteur de citer en priorité des données personnellement vérifiées fait apparaître des lacunes regrettables. Lors de l'édition du catalogue des Cérambycides de Rhône-Alpes en 2009, il avait été montré que, depuis une quinzaine d'années, plus de la moitié des régions de France avaient fait l'objet de catalogues critiques et fiables. Toutes ces informations patiemment recueillies auraient mérité d'être rappelées de façon à rendre compte au mieux de la répartition. L'auteur assume ce choix mais, malgré tout, on aurait aimé trouver une analyse des peuplements de Cérambycides s'inspirant de celles réalisées par les auteurs des faunes ou catalogues récents. L'origine exacte des informations est souvent imprécise et il faut souhaiter que le projet de cartographie prévu soit rapidement réalisé pour pouvoir enfin disposer d'une synthèse fiable et moderne.

Au final, la faune française compte 246 espèces dont une douteuse, 17 ont été ajoutées et 8 ont été supprimées par rapport à la faune de 1978. Ces chiffres montrent l'évolution rapide des connaissances et il est certain qu'ils n'ont rien de définitif. L'auteur lui-même souligne que certains choix peuvent être remis en cause, comme la suppression de *Brachypteroma ottomanum* alors que cette espèce alpine a été conservée dans le catalogue de Rhône-Alpes. C'est tout l'intérêt d'un tel ouvrage : rendre facilement accessible ce groupe au plus grand nombre et aussi stimuler de nouvelles prospections. Il faut féliciter P. Berger pour ce travail qui deviendra vite la référence pour l'étude des longicornes de France.

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33, rue Bossuet, F-69006 LYON

Tél. et fax : +33 (0)4 78 52 14 33

<http://www.linneenne-lyon.org> — email : societe.linneenne.lyon@wanadoo.fr

Groupe de Roanne : Maison des anciens combattants, 18, rue de Cadore, F-42300 ROANNE

Rédaction : Marie-Claire PIGNAL – Directeur de publication : Bernard GUÉRIN

Conception graphique de couverture : Nicolas VAN VOOREN



Tome 81 Fascicule 5-6 Mai-Juin 2012

SOMMAIRE

Dodelin B. – Situation en Corse de <i>Clamoris crenata</i> (Mulsant) (Coleoptera Tenebrionidae).....	83 - 85
Béguinot J. – Investigations sur la faune cécidogène d'altitude dans le Parc National des Ecrins	87 - 116
Denninger C. et Van Maanen M. – Plantes observées sur un bras de la Saône à Saint-Germain-au Mont-d'Or (Rhône, France).....	117 - 118
Pierotti H. et Rouault E. – Peritelini nouveaux ou intéressants de la faune méditerranéenne occidentale. XVI. <i>Peritelus subsetosus</i> Rey 1894 du sud de la France, espèce valide appartenant au genre <i>Pseudomeira</i> Stierlin 1882 (Coleoptera Curculionidae)	119 - 121
Guérin B. – Compte rendu faunistique de la sortie entomologique à Fréjus (Var) (7-8 mai 2011) : les Esclamandes et le vallon du Reyran	123 - 127
Brunet-Lecomte P. – Présence de la musaraigne de Miller <i>Neomys anomalus</i> Cabrera 1907 (<i>Soricomorpha</i> , <i>Soricidae</i>) dans l'Isle Crémieu (Isère, France).....	129 - 131

Couverture : En herborisant au printemps dans les gorges d'Imbros (Crète), une endémique crétoise *Campanula tubulosa* Lam. Crédit : B. Berthet-Grelier

CONTENTS

Dodelin B. – Status of <i>Clamoris crenata</i> (Mulsant) in Corsica (Coleoptera Tenebrionidae).....	83 - 85
Béguinot J. – Survey of the gall-inducing fauna of uplands in the "Parc National des Ecrins" (French Alps).....	87 - 116
Denninger C. et Van Maanen M. – Vegetation found along a side stretch of the Saône River, near Saint-Germain-au Mont-d'Or (Rhône department, France).....	117 - 118
Pierotti H. et Rouault E. – New and interesting Peritelini of the Western Mediterranean fauna. XVI. <i>Peritelus subsetosus</i> Rey 1894 from Southern France, valid species included in the genus <i>Pseudomeira</i> Stierlin 1882 (Coleoptera Curculionidae).....	119 - 121
Guérin B. – Faunistical report of the field entomological trip at Fréjus (Var) (May 7-8 2011).....	123 - 127
Brunet-Lecomte P. – Presence of Miller's water shrew <i>Neomys anomalus</i> Cabrera 1907 (<i>Soricomorpha</i> , <i>Soricidae</i>) in Isle Crémieu (Isère, France).....	129 - 131

Prix 10 euros

ISSN 0366-1326 • N° d'inscription à la C.P.P.A.P. : 1114 G 85671

Imprimé par Imprimerie Brailly, 69564 Saint-Genis-Laval Cedex

N° d'imprimeur : V0001XX/00 • Imprimé en France • Dépôt légal : mai 2012

Copyright © 2012 SLL. Tous droits réservés pour tous pays sauf accord préalable.