

Bulletin mensuel
de la
**SOCIÉTÉ LINNÉENNE
DE LYON**



Contribution à l'étude de divers genres d'Araneidae (Araneae) de Guyane française

Michaël Dierkens

21 rue du Garet, 69001 Lyon – michael.dierkens@cegetel.net

Résumé. – De nouvelles données relatives à onze genres d'Araneidae de Guyane française sont présentées. Quatre genres et huit espèces sont signalés pour la première fois de ce département.

Mots-clés. – Guyane française, Araneae, Araneidae, *Aculepeira*, *Bertrana*, *Dubiepeira*, *Epeiroides*, *Hingstepeira*, *Larinia*, *Manogea*, *Metazygia*, *Micrepeira*, *Ocrepeira*, *Spilasma*.

Contribution to the study of some genera of Araneidae (Araneae) from French Guyana

Abstract. – New data about eleven genera of Araneidae are provided from French Guyana. Four genera and eight species are recorded for the first time from this area.

Keywords. – French Guyana, Araneae, Araneidae, *Aculepeira*, *Bertrana*, *Dubiepeira*, *Epeiroides*, *Hingstepeira*, *Larinia*, *Manogea*, *Metazygia*, *Micrepeira*, *Ocrepeira*, *Spilasma*.

Cet article est le deuxième d'une série de contributions destinées à améliorer la connaissance des Araneidae de la Guyane française. Il a été élaboré à partir du matériel récolté par l'auteur en février et mars des années 2010 et 2011 et sur la base des données issues de la bibliographie. Les Gasteracanthinae (genres *Gasteracantha* Sundevall, *Micrathena* Sundevall et *Chaetacis* Simon) ont été traités dans DIERKENS (2011).

A la différence de la précédente note, les genres retenus dans la présente publication ne correspondent pas à un ensemble homogène et ont plutôt été regroupés pour des raisons pratiques. Certains genres contiennent en effet des espèces nouvelles pour la science, espèces qu'il aurait fallu décrire, ce qui sort du cadre d'une note traitant de faunistique. De plus, quelques genres complexes, tels que le genre *Eustala* Simon, ne peuvent pas être traités dans des délais raisonnables du fait de l'absence de révision d'ensemble récente. D'autres nécessitent la capture de matériel complémentaire pour pouvoir être valablement étudiés. C'est notamment le cas du genre *Alpaida* O.-P. Cambridge, dont les espèces présentent une forte variabilité sur leur aire de répartition. C'est également le cas par exemple du genre *Scoloderus* Simon, dont l'identification fiable nécessite d'examiner des individus mâles. Enfin, la classification des Araneidae fait encore débat et il n'existe pas à l'heure actuelle de classification d'ensemble faisant l'unanimité. Le choix des genres retenus dans la présente note découle donc directement de l'avancée des identifications. Ils contiennent des espèces nouvellement citées pour la Guyane française ou bien déjà connues mais de peu de localités, les araignées de Guyane française ayant été très peu étudiées.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les spécimens ont été récoltés par fauchage, battage ou examen direct des toiles. Ils sont déposés à Lyon au Centre de Conservation et d'Étude des Collections du Musée des Confluences (CCEC, collection M. Dierkens).

Pour chaque espèce est mentionnée la liste des captures réalisées dans le cadre de cette étude. La rubrique « répartition » renvoie selon le cas à l'ensemble des données connues de Guyane française (espèces déjà signalées), à la répartition sur le plateau des Guyanes (espèces nouvellement citées) ou éventuellement dans d'autres pays proches (espèces non signalées des Guyanes). Il ne s'agit donc pas d'une répartition exhaustive. Les synonymies utilisées pour réaliser la synthèse de ces travaux sont celles retenues dans les différentes publications de Levi. Les espèces non signalées de Guyane française mais connues de l'Amapá ou du Suriname sont mentionnées afin d'attirer l'attention sur elles en vue d'éventuelles récoltes. Les photographies des *habitus* sont systématiquement fournies afin de faciliter les identifications.

Les photos ont été prises au CCEC à l'aide d'un appareil photo numérique monté sur une loupe binoculaire. Réalisées à différents niveaux de profondeur de champ, elles ont ensuite été assemblées par le logiciel CombineZ5 pour améliorer leur netteté. Les spécimens sont photographiés sous alcool, stabilisés par des billes de verre. Les photos ont été réalisées à partir des spécimens récoltés en Guyane française dans le cadre de cette étude. Sauf mention contraire, les épigynes sont représentées en vue de dessous.

Les genres et espèces qui semblent être nouveaux pour la Guyane française sont précédés du signe *.

RÉSULTATS

****Aculepeira* Chamberlin et Ivie**

Le genre *Aculepeira* est bien caractérisé par la structure des pièces copulatrices. Les espèces néotropicales ont été révisées par LEVI (1991). D'après PLATNICK (2011), une seule espèce néotropicala a été décrite depuis ce travail : *Aculepeira angeloi* (ALVAREZ *et al.*, 2005), du Brésil.

****Aculepeira travassosi*** (Soares et Camargo, 1948) : fig. 1 et 33

Matériel : Saint-Laurent-du-Maroni, forêt de Saint-Jean (1 femelle, n°3357).

Variation : LEVI (1991) mentionne que la tache blanche abdominale en forme de U est souvent absente. C'est le cas de notre exemplaire.

Répartition : largement répandue du Mexique à l'Argentine. Non signalée du plateau des Guyanes.

****Bertrana* Keyserling**

Genre contenant douze espèces, identifiables sur la base de la coloration et de l'examen des pièces copulatrices.



fig. 1



fig.2



fig. 3



fig. 4



fig. 5



fig. 6



fig. 7



fig. 8



fig. 9



fig. 10



fig. 11



fig. 12



fig. 13

Fig. 1 : *Aculepeira travassosi* (Soares et Camargo, 1948), habitus femelle

Fig. 2 : *Bertrana elinguis* (Keyserling, 1883), habitus mâle

Fig. 3 : *Bertrana elinguis* (Keyserling, 1883), habitus femelle

Fig. 4 : *Dubiepeira dubitata* (Soares et Camargo, 1948), habitus femelle

Fig. 5 : *Dubiepeira neptunina* (Mello-Leitão, 1948), habitus femelle

Fig. 6 : *Dubiepeira dubitata* (Soares et Camargo, 1948), habitus femelle

Fig. 7 : *Dubiepeira neptunina* (Mello-Leitão, 1948), habitus femelle

Fig. 8 : *Epeiroides bahiensis* (Keyserling, 1885), habitus mâle

Fig. 9 : *Hingstepeira folisecens* (Hingston, 1932), habitus mâle

Fig. 10 : *Hingstepeira folisecens* (Hingston, 1932), habitus femelle

Fig. 11 : *Larinia directa* (Hentz, 1847), habitus mâle

Fig. 12 : *Manogea porracea* (C. L. Koch, 1838), habitus mâle

Fig. 13 : *Manogea porracea* (C. L. Koch, 1838), habitus femelle



fig. 14



fig. 15



fig. 16



fig. 17



fig. 18



fig. 19



fig. 20



fig. 21



fig. 22



fig. 23




fig. 24

- Fig. 14 : *Metazygia goeldii* Levi, 1995, habitus femelle
 Fig. 15 : *Metazygia gregalis* (O. P.-Cambridge, 1889), habitus mâle
 Fig. 16 : *Metazygia gregalis* (O. P.-Cambridge, 1889), habitus femelle
 Fig. 17 : *Metazygia laticeps* (O. P.-Cambridge, 1889), habitus femelle
 Fig. 18 : *Metazygia tanica* Levi, 1995, habitus mâle
 Fig. 19 : *Metazygia yucumo* Levi, 1995, habitus mâle
 Fig. 20 : *Micrepeira tubulofaciens* (Hingston, 1932), habitus femelle
 Fig. 21 : *Ocrepeira albopunctata* (Taczanowski, 1879), habitus mâle
 Fig. 22 : *Spilasma duodecimguttata* (Keyserling, 1879), habitus mâle
 Fig. 23 : *Spilasma duodecimguttata* (Keyserling, 1879), habitus femelle
 Fig. 24 : *Epeiroides bahiensis* (Keyserling, 1885), mâle, hanche 3

**Bertrana elinguis* (Keyserling, 1883) : fig. 2, 3 et 25

Matériel : Régina, 12 km après le pont de Régina, layon d'accès à la savane-roche Virginie (1 femelle, n°4627) ; Saint-Laurent-du-Maroni, forêt de Saint-Jean (1 mâle et 1 femelle, n°4246 et 4715).

Variation : une seule des 2 femelles récoltées présente des lignes transverses rouges sur l'abdomen (cf. fig. 3). Les épigynes ont une forme légèrement différente de celle figurée par LEVI (1989). La capture d'un mâle a permis de confirmer l'identification.

Répartition : espèce connue au Brésil des états de Para et Amazonas. Le genre est nouveau pour la Guyane française.

****Dubiepeira Levi***

En 1991, Levi créait le genre *Dubiepeira* pour des espèces dont le placement était incertain. Les femelles ressemblent aux femelles d'*Araneus* sp. mais leur céphalothorax et leur abdomen présentent une apparence glabre. L'abdomen est de forme ovale ou sphérique. Les pièces copulatrices des deux sexes présentent une structure caractéristique. Le genre comprend cinq espèces, que l'on peut identifier d'après LEVI (1991). Les deux espèces présentées ci-dessous se distinguent facilement par leur coloration.

**Dubiepeira dubitata* (Soares et Camargo, 1948) : fig. 4, 6 et 34

Matériel : Saint-Georges-de-l'Oyapock, chemin allant de Pied Saut au Saut Maripa (1 femelle, n°3384).

Répartition : largement répandue en Amérique du Sud. Signalée du Suriname par LEVI (1991).

**Dubiepeira neptunina* (Mello-Leitão, 1948) : fig. 5, 7 et 35

Matériel : Régina, montagne de Kaw (1 femelle, n°4199).

Répartition : décrite du Guyana (MELLO-LEITÃO, 1948, *sub Neosconella neptunina*).

Epeiroides Keyserling

Genre monotypique, caractérisé par la structure des pièces copulatrices et par les tubercules de la troisième hanche chez le mâle (fig. 24). L'espèce est identifiable d'après LEVI (1989).

Epeiroides bahiensis (Keyserling, 1885) : fig. 8, 24 et 26

Matériel : Mana, route de Cormoran (1 mâle, n°4633).

Répartition : espèce signalée pour la Guyane française de Charvein (CAPORACCO, 1954).

Hingstepeira Levi

Ce genre regroupe des espèces de petite taille (< 1 cm) caractérisées par leur abdomen allongé, élargi postérieurement et dépassant largement les filières en arrière. Les quatre espèces connues sont identifiables d'après LEVI (1995b).

Hingstepeira folisecens (Hingston, 1932) : fig. 9 et 10

Matériel : Saint-Georges-de-l'Oyapock, chemin allant du Saut Maripa à Pied Saut (1 femelle, n°4240) ; Mana, PK8 route de l'Acarouany, de nuit, forêt (1 femelle, n°4227) ; Saint-Laurent-du-Maroni, forêt de Saint-Jean (2 mâle, n°3488 et 4243).

Répartition : espèce décrite du Guyana, connue en Guyane française de la montagne de Kaw, près de camp Caïman (LEVI, 1995b).

Hingstepeira isherton Levi, 1995 a été décrite du Guyana. Elle possède une coloration très différente de l'espèce précédente, rappelant celle des *Metazygia*.

****Larinia* Simon**

Les espèces de ce genre sont caractérisées par leur abdomen allongé présentant une pointe en avant, la présence d'une ou deux barres blanches longitudinales sous l'abdomen et la structure des pièces copulatrices. Ce genre, à large répartition, contient dix espèces néotropicales identifiées d'après LEVI (1975) et HARROD *et al.* (1990).

**Larinia directa* (Hentz, 1847) : fig. 11 et 27

Matériel : Régina (1 mâle, n°4528).

Répartition : signalée du Suriname et de l'Amapá par HARROD *et al.* (1990). Genre nouveau pour la Guyane française.

***Manogea* Levi**

Genre néotropical décrit par LEVI (1997), regroupant des espèces caractérisées par une forme allongée, des yeux postérieurs en ligne droite ou procurvée, des pattes élancées, une constriction à l'avant du céphalothorax et un système de coloration particulier. Il contient trois espèces dont une déjà connue de Guyane française.

Manogea porracea (C. L. Koch, 1838) : fig. 12 et 13

Matériel : Régina, route de l'Est, layon d'accès à la savane-roche Virginie (1 femelle, 1 immature, n°3938) ; Régina, route de Kaw, entre camp Caïman et le dégrad de Kaw (1 femelle, n°3924) ; Mana, PK8 route de l'Acarouany, de nuit, forêt (1 mâle, 1 femelle, n°4226) ; Saint-Laurent-du-Maroni, forêt de Saint-Jean (1 mâle, 1 femelle, n°4120).

Répartition : Charvein (CAPORACCO, 1954, *sub Meta berlandi*) ; montagne de Kaw, près de camp Caïman ; mont Cabassou (LEVI, 1997) ; Cayenne (LEVI, 1997, par mise en synonymie de *Zilla guyanensis* Keyserling).

***Metazygia* F. O.-P. Cambridge**

Le genre *Metazygia* regroupe des espèces à céphalothorax ayant une apparence glabre et des yeux médians postérieurs très rapprochés. L'abdomen est ovale et présente sa plus grande largeur au milieu. D'après PLATNICK (2011), le genre comprend quatre-vingt-dix espèces, essentiellement néotropicales. Depuis la révision de LEVI (1995a), qui présente quatre-vingt-six espèces dont soixante huit nouvelles, deux espèces ont été rajoutées au genre pour la faune néotropicale. La première, *Metazygia silvestris* (Bryant, 1942), est une espèce portoricaine transférée du genre *Cyclosa* lors de la révision de ce genre par LEVI (1999). La seconde, *Metazygia levii*, a été décrite du Brésil par SANTOS (2003).

**Metazygia goeldii* Levi, 1995 : fig. 14 et 36

Matériel : Mana, PK8 route de l'Acarouany, forêt, de nuit (1 femelle, n°4229).

Répartition : décrite du Brésil (Pará).

Metazygia gregalis (O. P.-Cambridge, 1889) : fig. 15, 16, 28 et 37

Matériel : Sinnamary, route de l'Anse, de nuit (1 mâle, 2 immatures, n°4204) ; Iracoubo, sortie ouest, RN1 (1 mâle, 2 femelles, n°3472).

Répartition : Saint-Laurent-du-Maroni (LEVI, 1995a).

Metazygia laticeps (O. P.-Cambridge, 1889) : fig. 17 et 38

Matériel : Roura, PK62 route de l'Est, layon forestier au début de la route du dégrad Corrèze (1 immature, n°4606) ; Régina, route de Kaw, entre camp Caïman et le dégrad de Kaw (1 femelle, 2 immatures, n°3450) ; Kourou, route de Petit Saut, forêt de la crique Eau Claire (1 immature, n°3525) ; Sinnamary, route de Saint-Elie, alentours du PK16 (1 immature, n°3439) ; Saint-Laurent-du-Maroni, forêt de Saint-Jean (2 immatures, n°3486).

Répartition : Montagne de Roura, Placer Trésor ; Matoury, près de Sautero (LEVI, 1995a).

**Metazygia tanica* Levi, 1995 : fig. 18 et 29

Matériel : Roura, montagne de Roura (1 mâle, n°4189) ; Mana, RD22, forêt sur sable blanc (1 mâle, n°4173).

Répartition : décrite du Guyana (LEVI, 1995a).

**Metazygia yucumo* Levi, 1995 : fig. 19 et 30

Matériel : Iracoubo, sortie ouest, RN1 (1 mâle, n°3474).

Répartition : connue de Bolivie, du Pérou et de Colombie (LEVI, 1995a).

Autres espèces potentielles (localités issues de LEVI, 1995a) :

M. jamari Levi, 1995 : Suriname

M. pallidula (Keyserling, 1864) : signalée de Guyane française (Saint-Laurent-du-Maroni)

M. uraricoera Levi, 1995 : Suriname

M. yobena : Uassa (Brésil, Amapá)

Micrepeira Schenkel

Genre regroupant de très petites espèces (< 5 mm) caractérisées par leur sternum en dôme, leur abdomen subsphérique et leur système de coloration. Les sept espèces connues sont identifiables d'après LEVI (1995b).

Micrepeira tubulofaciens (Hingston, 1932) : fig. 20 et 39

Matériel : Iracoubo (2 femelle, n°4251).

Répartition : espèce décrite du Guyana. Déjà signalée de Guyane française (LEVI, 1995b) : Saül, crique Limonade ; Montagne de Kaw, près de camp Caïman.

Micrepeira hoeferi Levi, 1995 est également connue de Guyane française (LEVI, 1995b) : Saül, crique Limonade ; Montagne de Kaw, près de camp Caïman.

Micrathena smithae Levi, 1995 a été décrite du Suriname.

***Ocrepeira* Marx**

Genre caractérisé par la structure des pièces copulatrices et la forme de la région oculaire du céphalothorax. Il a été révisé par LEVI (1993).

Ocrepeira albopunctata (Taczanowski, 1879) : fig. 21 et 31

Matériel : Régina, 12 km après le pont de Régina, layon d'accès à la savane-roche Virginie (1 mâle, n°4218) ; Roura, route de l'Est, près de Coralie, bords de mares (1 mâle, n°4169).

Répartition : espèce connue de Guyane par une femelle provenant de Charvein (CAPORIACCO, 1954, sub « *Araneus* » *trigonellus*).

Ocrepeira covillei (Levi, 1993) a été signalée du Suriname.

***Spilasma* Simon**

Le genre *Spilasma* regroupe des espèces caractérisées par une forte constriction à l'avant du céphalothorax (à la manière des *Cyclosa*), un abdomen ovale ayant sa plus grande largeur au milieu, des pattes non annelées et l'absence de *folium* abdominal. Les trois espèces du genre peuvent être identifiées d'après LEVI (1995b). Une seule d'entre elles est connue de la région traitée.

Spilasma duodecimguttata (Keyserling, 1879) : fig. 22, 23 et 32

Matériel : Roura, PK62 route de l'Est, début de la route du dégrad Corrèze, layon forestier (1 femelle, n°4236) ; Rémire-Montjoly, sentier du Rorota (1 mâle, n°3396) ; Iracoubo, route forestière de Counamama (1 femelle, n°4252) ; Mana, PK8 route de l'Acarouany, de nuit, forêt (1 femelle, n°4230).

Variation : le bulbe copulateur de cette espèce étant variable, nous donnons une illustration de celui du mâle récolté en Guyane (fig. 32).

Répartition : connue en Guyane française de la montagne de Kaw, camp Caïman (LEVI, 1995b).

CONCLUSION

Cet article fait le point sur des récoltes de onze genres d'Araneidae effectuées en Guyane française par l'auteur. Quatre genres (*Aculepeira*, *Bertrana*, *Dubiepeira* et *Larinia*) et huit espèces (*A. travassosi*, *B. elinguis*, *D. dubitata*, *D. neptunina*, *L. directa*, *M. goeldii*, *M. tanica* et *M. yucumo*) sont signalés pour la première fois de ce département. La répartition des espèces déjà connues de Guyane (souvent par uniquement une ou deux données) a été complétée par de nouvelles données de capture. Deux espèces, *Metepeira pallidula* et *Micrepeira hoeferi* n'ont pas été retrouvées dans le cadre de la présente étude.

Remerciements. – L'auteur tient à remercier Cédric Audibert (CCEC) pour son aide dans la réalisation des photographies, ainsi que Jean-Claude Ledoux et Roland Allemand pour leur relecture de l'article.



fig. 25




fig. 26



fig. 27



fig. 28



fig. 29



fig. 30



fig. 31



fig. 32

- Fig. 25 : *Bertrana elinguis* (Keyserling, 1883), bulbe copulateur
 Fig. 26 : *Epeiroides bahiensis* (Keyserling, 1885), bulbe copulateur
 Fig. 27 : *Larinia directa* (Hentz, 1847), bulbe copulateur
 Fig. 28 : *Metazygia gregalis* (O. P.-Cambridge, 1889), bulbe copulateur
 Fig. 29 : *Metazygia tanica* Levi, 1995, bulbe copulateur
 Fig. 30 : *Metazygia yucumo* Levi, 1995, bulbe copulateur
 Fig. 31 : *Ocrepeira albopunctata* (Taczanowski, 1879), bulbe copulateur
 Fig. 32 : *Spilasma duodecimguttata* (Keyserling, 1879), bulbe copulateur



fig. 33



fig. 34



fig. 35



fig. 36



fig. 37



fig. 38



fig. 39

Fig. 33 : *Aculepeira travassosi* (Soares et Camargo, 1948), épigyne
 Fig. 34 : *Dubiepeira dubitata* (Soares et Camargo, 1948), épigyne
 Fig. 35 : *Dubiepeira neptunina* (Mello-Leitão, 1948), épigyne
 Fig. 36 : *Metazygia goeldii* Levi, 1995, épigyne
 Fig. 37 : *Metazygia gregalis* (O. P.-Cambridge, 1889), épigyne
 Fig. 38 : *Metazygia laticeps* (O. P.-Cambridge, 1889), épigyne
 Fig. 39 : *Micrepeira tubulofaciens* (Hingston, 1932), épigyne, vue postérieure

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- ÁLVARES É. S. S., LOYOLA R. D. et MARIA M. DE, 2005. A new species of the spider genus *Aculepeira* Chamberlin & Ivie (Araneae: Araneidae) found in nests of *Trypoxylon* (*Trypargilum*) *lactitarse* Saussure (Hymenoptera: Sphecidae) from Minas Gerais, Brazil. *Lundiana*, 6 (supplement) : 55-57.
- CAPORACCIO L. DI, 1954. Araignées de la Guyane Française du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. *Pontificia Academia Scientiarum - Commentationes*, 16 : 45-193.
- DIERCKENS M., 2011. Contribution à l'étude des Araneidae de la Guyane française. I : Gasteracanthinae. Les Cahiers du Musée des Confluences. Études Scientifiques, n°2 : 99-108.
- HARROD J. C., LEVI H. W. et LEIBENSPERGER L. B., 1990. The Neotropical orbweavers of the genus *Larinia* (Araneae: Araneidae). *Psyche*, 97 : 241-265.
- LEVI H. W., 1975. The American orb-weaver genera *Larinia*, *Cercidia* and *Mangora* north of Mexico (Araneae, Araneidae). *Bulletin of the Museum of comparative Zoology*, 147 : 101-135.
- LEVI H. W., 1989. The Neotropical orb-weaver genera *Epeiroides*, *Bertrana* and *Amazonpeira* (Araneae: Araneidae). *Psyche*, 96 : 75-99.
- LEVI H. W., 1991. The Neotropical and Mexican species of the orb-weaver genera *Araneus*, *Dubiepeira*, and *Aculepeira* (Araneae: Araneidae). *Bulletin of the Museum of comparative Zoology*, 152 : 167-315.
- LEVI H. W., 1993. The Neotropical orb-weaving spiders of the genera *Wixia*, *Pozonia*, and *Ocrepeira* (Araneae: Araneidae). *Bulletin of the Museum of comparative Zoology*, 153 : 47-141.

- LEVI H. W., 1995a. The Neotropical orb-weaver genus *Metazygia* (Araneae: Araneidae). *Bulletin of the Museum of comparative Zoology*, 154 : 63-151.
- LEVI H. W., 1995b. Orb-weaving spiders *Actinosoma*, *Spilasma*, *Micropeira*, *Pronous*, and four new genera (Araneae: Araneidae). *Bulletin of the Museum of comparative Zoology*, 154 : 153-213.
- LEVI H. W., 1997. The American orb weavers of the genera *Mecynogea*, *Manogea*, *Kapogea* and *Cyrtophora* (Araneae: Araneidae). *Bulletin of the Museum of comparative Zoology*, 155 : 215-255.
- LEVI H. W., 1999. The Neotropical and Mexican Orb Weavers of the genera *Cyclosa* and *Allocyclosa* (Araneae: Araneidae). *Bulletin of the Museum of comparative Zoology*, 155 : 299-379.
- MELLO-LEITÃO C. F. DE, 1948. Contribuição ao conhecimento da fauna araneológica das Guianas. *Anais da Academia brasileira de Ciencias*, 20 : 151-196.
- PLATNICK N. L., 2011. The world spider catalog, version 12. American Museum of Natural History, online at <http://research.amnh.org/iz/spiders/catalog/INTRO1.html>
- SANTOS A. J., 2003. *Metazygia levii*, a new species of orb-weaving spider from Brazil (Araneae, Araneidae). *The Journal of Arachnology*, 31 : 151-153.



Le n°3 des *Mémoires de la Société linnéenne de Lyon* vient de sortir.
Il présente des planches inédites de champignons de l'herbier du Dr Riel.
Ce premier volet concerne les Pezizales (les autres groupes de champignons seront traités ultérieurement).
Cet ouvrage de 96 pages, tiré à 100 exemplaires, reproduit 43 planches en couleurs, accompagnées des notes du Dr Riel et d'une révision taxonomique. Il est disponible au prix de 20 € (16 € pour les linnéens), frais de port en sus.

Rappelons le n°1 des Mémoires, consacré aux Cerambycidae de Nouvelle-Calédonie (Sudre *et al.*, 2010) et le n°2, The Spiders of Europe (Le Péro, 2011).

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33, rue Bossuet, F-69006 LYON

Tél. et fax : +33 (0)4 78 52 14 33

<http://www.linneenne-lyon.org> — email : societe.linneenne.lyon@wanadoo.fr

Groupe de Roanne : Maison des anciens combattants, 18, rue de Cadore, F-42300 ROANNE

Rédaction : Marie-Claire PIGNAL – Directeur de publication : Bernard GUÉRIN

Conception graphique de couverture : Nicolas VAN VOOREN



Tome 81 Fascicule 1-2 Janvier-Février 2012

SOMMAIRE

Ledoux G. et Roux P. – Descriptions de neuf nouveaux taxons chinois des genres Archastes et Nebria (Coleoptera Nebriidae)	3 - 16
Van Vooren N. – Code international de nomenclature botanique : ce qui va bientôt changer	19 - 22
Dierkens M. – Contribution à l'étude de divers genres d'Araneidae (Araneae) de Guyane française	23 - 33
Dodelin B. – Note sur <i>Oxylaemus variolosus</i> , <i>O. cylindricus</i> et <i>Bothrideres bipunctatus</i> (Coleoptera Bothrideridae) en région Rhône-Alpes	35 - 36

Couverture : Savane – roche Virginie (Guyane française). Crédit Michaël Dierkens

CONTENTS

Ledoux G. et Roux P. – Descriptions of nine new Chinese taxa of the genus Archastes and Nebria (Coleoptera Nebriidae)	3 - 16
Van Vooren N. – International code of botanical nomenclature : what will soon change	19 - 22
Dierkens M. – Contribution to the study of some genera of Araneidae (Araneae) from French Guyana	23 - 33
Dodelin B. – Note on <i>Oxylaemus variolosus</i> , <i>O. cylindricus</i> and <i>Bothrideres bipunctatus</i> (Coleoptera Bothrideridae) in the Rhône-Alpes region	35 - 36

Prix 10 euros

ISSN 0366-1326 • N° d'inscription à la C.P.P.A.P. : 1114 G 85671

Imprimé par Imprimerie Brailly, 69564 Saint-Genis-Laval Cedex

N° d'imprimeur : V0001XX/00 • Imprimé en France • Dépôt légal : Janvier 2012

Copyright © 2012 SLL. Tous droits réservés pour tous pays sauf accord préalable.