

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE LYON

TOME XXXVII (1912)

NOTES ET MÉMOIRES

COMPTES RENDUS DES SÉANCES

— 1912 —

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

II II II II II II
LYON

M. VIVIAND-MOREL dit que cette plante a cependant donné des variations bien nettes, par exemple dans la coloration des fleurs (blanches ou jaune pâle).

M. VIVIAND-MOREL fait une communication sur la plante décrite par Jordan sous le nom de *Typha gracilis*.

Cette forme, minutieusement décrite par Jordan, n'est qu'un « lusus » de *Typha minima*. Elle se reproduit toutes les fois que cette espèce reste submergée au printemps ; la floraison est retardée et la structure de diverses parties de la plante se trouve modifiée.

Cependant, on trouve encore ce « lusus » mentionné dans beaucoup de flores sous le nom de *Typha gracilis* Jord.

M. le D^r Ant. MAGNIN, à l'occasion de la publication d'une notice biographique sur Claude Martin (*Ann. de la Soc. Bot. de Lyon*, t. XXIV, p. 13 à 14), avait déjà appelé l'attention des botanistes sur le polymorphisme que présente cette espèce, suivant la profondeur plus ou moins grande de l'eau au moment de la floraison de la plante.

M. ABRIAL présente une description détaillée du *Daphne Cneorum* récolté au « Mont », au-dessus du lac de Nantua, par M. Pcillod, pharmacien à la Cluze.

La séance est levée à 9 h. 1/2.

Séance du 4 Juin 1912.

La séance est ouverte à 8 heures, sous la présidence de M. PRUDENT.

M. VIVIAND-MOREL ajoute un renseignement à la communication qu'il a faite à la séance précédente sur le *Typha gracilis* de Jordan. Cette plante a été cultivée en baquets pendant plus

de vingt ans dans le jardin de Jordan. C'est ainsi qu'il a constaté que cette forme n'est qu'un « *lusus* » de *T. minima*.

M. Nisius Roux donne lecture d'une lettre personnelle que lui a adressée M. Lutz, secrétaire général de la Société Botanique de France, et dans laquelle celui-ci lui fait connaître que les membres de la Société Botanique de Lyon sont invités à prendre part à la session extraordinaire que la Société Botanique de France tiendra dans le Vercors, à la fin de juillet et au commencement d'août. Ils bénéficieront des mêmes avantages et réductions que les membres de la Société Botanique de France.

M. Nisius Roux signale que le *Bulletin de l'Association Pyrénéenne* considère le *Narcissus Bernardi* Hénon comme un hybride de *Narcissus sylvestris* × *Narcissus radiiflorus*, et non comme un hybride de *N. poeticus* × *N. pseudo-Narcissus*.

M. N. Roux présente un joli plant d'*Alyssum corsicum*, cultivé par M. Lavenir, à qui il l'a envoyé de Corse. Alors que, dans son pays d'origine, la plante a ses feuilles couvertes de poils blanchâtres, le spécimen présenté en est dépourvu.

M. LAVENIR fait remarquer que, dans les cultures, les jeunes plantes sont couvertes d'un tomentum qui disparaît au fur et à mesure que les tiges s'allongent.

M. Nisius Roux présente un grand nombre d'échantillons, en herbier, d'espèces qu'il a récoltées en Corse. Plusieurs de ces plantes sont particulières à ce pays. Voici la liste de ces plantes ;

Solanum sodomium L. — Commun autour de Bastia.

Asplenium marinum L. — Sous la citadelle de Bastia.

Pteris cretica L. — Rochers ombragés sur les bords des ruisseaux du cap Corse depuis Pietranera.

Helleborus corsicus Willd. — Commun entre Pietranera et San-Martino.

Anemone stellata G. G. — Tout le cap Corse dès février.

Fraxinus Ornus L. — Bois entre Pietranera et San-Martino ; commun en Corse.

Pæonia Russi D. C. — Maquis à Tralunca où elle est très commune.

Bellium belliioides L. — Rochers humides entre Pietranera et San-Martino.

- Brassica insularis* Moris. — Localité classique de Caporalino.
Alnus elliptica Req. — Pentes humides du cap Corse.
Alnus suaveolens Req. — Pentes du Rotondo.
Seriola ætnensis L. — Champs à Pietranera.
Arum muscivorum L. — Rochers près de la gare d'Omessa.
Scilla peruviana L. — Sables maritimes à Porto-Vecchio.
Ceralonia siliqua L. — Cultivé et sur les rochers maritimes du cap.
Arabis verna R. et Br. — Commun sur les talus entre Pietranera et San-Martino.
Phyllirea angustifolia. — Espèce très polymorphe ; les feuilles varient même sur le même individu.
Succeda fruticosa Forsk. — Marécages du port de Saint-Florent.
Trifolium nigrescens Vir. — Champs de Pietranera
Asterolinum stellatum Link. — Maquis à Porto-Vecchio et Pietranera.
Hymenocarpus circinatus Savi. — Talus à Pietranera.
Briza minor. — Champs à Pietranera.
Briza maxima. — Champs à Pietranera.
Geranium lucidum. — Commun sur les rochers humides près Bastia.
Trifolium stellatum. — Talus à Pietranera.
Ficaria calthæfolia G. G. — Tous les lieux humides autour de Bastia.
Lotus ornithopodioides L. — Champs à Pietranera.
Orobis variegatus Ten. — Maquis humides du cap Corse.
Orchis papilionaceus L. — Tout le maquis du cap Corse.
Crepis bulbosa Cas. — Sables maritimes à Porto-Vecchio.
Urtica pilulifera L. — Talus à Porto-Vecchio.
Lupinus angustifolius Ait. — Commun dans les friches du cap Corse.
Allium triquetrum L. — Tout le cap Corse au premier printemps.
Allium neapolitanum Cyril. — Talus au-dessus de Bastia.
Narcissus Tazetta L. — Lieux humides autour de Bastia.
Evax pynæa. — Sables maritimes sous Porto-Vecchio.

M. ABRIAL présente des tiges d'*Urtica dioeca*, portant des feuilles à stipules concrescentes deux à deux, offrant ainsi, à titre d'anomalie, la disposition qui est normale chez le Houblon (*Humulus Lupulus*).

M. ABRIAL présente ensuite un jeune pied de *Quercus pedunculata*, à trois cotylédons. Les exemples de cette sorte étaient nombreux auprès d'un même arbre, tandis que les jeunes individus développés sous les arbres du voisinage n'avaient que le nombre typique de deux cotylédons.