

Tome 62

fascicule 1

Janvier 1993

Abonnement 150 F — Le numéro 25 F

ISSN 0366-1326

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33 rue Bossuet, F 69006 LYON

Rédaction : R. ALLEMAND

GROUPE DE ROANNE :

PROGRAMME

CONFÉRENCES :

Lundi 11 janvier : Un pays peu connu dans l'Himalaya : Le Ladakh ou Petit Thibet par le docteur POPINET.

Lundi 8 février : Le Pérou et la Bolivie par le docteur LANNES.

BIBLIOTHÈQUE :

Le deuxième lundi de chaque mois à 18 heures, salle n° 27, Centre Mendès-France.

SÉANCES MYCOLOGIQUES :

Le premier lundi de chaque mois à 18 h 30, salle n° 27, Centre Mendès-France.

SÉANCES ORNITHOLOGIQUES :

Le deuxième mercredi de chaque mois à 18 h 30, salle n° 27, Centre Mendès-France.

COMPTE RENDU MYCOLOGIQUE DE LA 63^e EXPOSITION (1992)

Le relevé du nombre des espèces de champignons présentées ces dix dernières années nous a donné une moyenne de 332 espèces avec 2 extrêmes : 399 en 1986 et 230 en 1985, année célèbre due à une sécheresse exceptionnelle. Nous pouvons donc en déduire que l'influence du mauvais temps précédant nos expositions est toujours heureusement compensée par un effort accru des organisateurs. Cette année 1992, avec 335 espèces, rentre vraiment dans la moyenne mais avec peu de nouveautés, sinon chez les cortinaires dont le nombre ne cesse d'augmenter.

Voici d'ailleurs la liste des espèces rares ou critiques, ou n'ayant jamais été présentées :

Cortinarius tomentosus Hry. (section *Opimi*). — Un seul exemplaire assez gros, avec un chapeau de 50 à 60 mm de diamètre, feutré tomenteux, brun ocre foncé, un stipe claviforme blanchâtre mais lilacin à la base et des lames brun jaune rouillé.

Cortinarius speciosissimus Kühn. et Romagn. : var. *julii* Moën-Loc. et Reum. — Deux exemplaires de 4 à 5 cm de diamètre avec un stipe allongé, fusiforme et tordu. Ils diffèrent du type par le chapeau moins conique, convexe-plan, les lames à arête serrulée et un stipe très allongé (8,5 cm) concolore au chapeau. Sous conifères.

Cortinarius claricolor var. *immissus* Schlapfer. — Trois petits spécimens bien caractérisés par le chapeau roux-orangé, ridé à la marge, le stipe trapu, dur, blanchâtre, couvert de grosses mèches ocracées et des lames violet lilacin pâle.

Cortinarius amigochrous Kühn. — Cinq petits *Variecolores* à chapeau brun noisette uniforme, à marge presque enroulée portant des lames espacées brunes, pied à peine bulbeux blanc lilacin comme la chair.

Cortinarius polychrous Hry. (section *Purpurascetes*). — Deux échantillons de 5 à 6 cm de diamètre, brunâtre olivacé, à marge jaunâtre, portant des lames lilacines à arête jaune-verdâtre. Stipe olivâtre, élancé, légèrement bulbeux. Chair blanchâtre dans le chapeau et le bulbe mais bleuâtre dans le milieu du pied. Coloration en brun-verdâtre avec la soude.

Clitocybe gibba var. *catina* (Fr.) Maire. — Exemplaire unique caractérisé par son chapeau presque blanc.

En terminant ce compte rendu, je veux remercier tous les amis qui nous ont apporté leurs récoltes ainsi que les linnéens qui pendant trois jours ont fait un effort louable pour renouveler les espèces exposées. Grand merci aussi aux responsables des sociétés amies venues nous aider dans la détermination des espèces litigieuses, à savoir : MM. GAIGNON et FAURITE-GENDRON de la Société Linnéenne de Lyon, M. et Mme REYNAUD de la Société de Feurs, MM. AYL et FORGE de la Société de Saint Etienne. Des amis mycologues, parfois très éloignés étaient également présents : M. JOASSON de Chauffailles, MM. GOULINET et BARRIQUAND de Belmont, Mme RUIZ de Cublize, M. et Mme LANGIOT de Montceau-les-Mines.

A. POPIER.