

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE LYON

Paraissant tous les trois mois

TOME XXI (1896)

NOTES ET MÉMOIRES

COMPTES RENDUS DES SÉANCES



SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

AU PALAIS-DES-ARTS, PLACE DES TERREAUX

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38.

1896



**Liste des Champignons récoltés pendant l'excursion
faite par la Société botanique de Lyon, le 25 mai
1896, à Poleyrieu, Creys et Arandon (Isère), par M. le
D^r RIEL.**

*Les espèces marquées d'un astérisque ont été déterminées par M. E. BOUDIER.

GARE DE POLEYRIEU.

**Ecoascus Pruni*. Cette espèce produit une altération remarquable des fruits de *Prunus spinosa*. Ceux-ci deviennent d'un blanc jaunâtre, sont comprimés, irrégulièrement ridés, et présentent dans leur intérieur une grande excavation vide. Ils atteignent à l'état adulte la taille d'une amande verte avec sa coque. Cette espèce est assez rare aux environs de Paris (E. Boudier). Elle nous a paru être très répandue dans toute la région lyonnaise.

Æcidium Euphorbiæ, sur *Euphorbia cyparissias*.

Puccinia graminis, à l'état d'écidiole et d'écide sur *Berberis vulgaris* et à l'état d'urède sur le Blé.

Hypholoma fasciculare, sur souche d'*Alnus glutinosa*.

Coriolus versicolor, sur Chêne.

Phellinus Evonymi, sur Fusain.

Placodes pomaceus, sur *Prunus spinosa*.

LE DEVIN.

**Septoria Ficariæ*, sur les feuilles de la Ficaire.

Hypoxylon fuscum, sur branche morte.

**Venturia circinans*, sur les feuilles de *Geranium rotundifolium*. Cette espèce est très intéressante. M. Saccardo la place dans le genre *Venturia* à cause de ses périthèces poilus, mais elle est certainement plus voisine du genre *stigmatea* par ses spores. C'est un *stigmatea* à périthèce poilu (E. Boudier).

Auricularia tremelloides, sur souche.

Hirneola auricula-Judæ, sur *Acer campestre* (M. Convert).

Stereum hirsutum, sur souche de Charme.

Leptoporus adustus, sur tronc abattu.

Inodermus hispidus, sur Noyer.

CREYS.

Ustilago segetum, sur Blé.

**Uromyces scutellatus*, sur la face inférieure des feuilles d'*Euphorbia verrucosa*. Cette dernière espèce, attaquée par le parasite, a les tiges raides et dressées, d'une taille beaucoup plus élevée qu'à l'état normal.

Tricholoma Georgii, au pied d'une haie, au bord d'un chemin.

LA GORGE.

Tulostoma mammosum, sur terre, au bord d'un chemin.