

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE LYON

TOME XXXV (1910)

NOTES ET MÉMOIRES

COMPTES RENDUS DES SÉANCES

— 1910 —

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

1, PLACE D'ALBON, 1

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38

1911



SÉANCE DU 7 JUIN 1910

PRÉSIDENTE DE M. VIVIAND-MOREL

M. ABRIAL, de la part de M. Faucheron, annonce que M. le professeur Gérard dirigera une herborisation à la Grande-Chartreuse, les samedi 11 et dimanche 12 juin.

Le Secrétaire donne lecture du compte rendu de l'excursion du 16 mai, dans la vallée du Doux, compte rendu fait par M. Revol (voir aux Notes et Mémoires).

A propos de ce compte rendu, M. RIEL fait remarquer qu'il a récolté *Orchis provincialis* à Saint-Etienne-de-Valous, près d'Andance.

M. N. ROUX l'a trouvé aussi entre Moras et Lens-Lestang (Drôme).

M. VIVIAND-MOREL émet des doutes sur la détermination du *Ranunculus flabellatus*, et dit que le *Capsella gracilis* signalé n'est qu'un état maladif du *Capsella bursa pastoris*.

M. Cl. ROUX dit qu'il est illogique de déterminer la limite de dispersion d'une espèce par une limite administrative. Il est bien préférable de prendre des limites naturelles, une vallée, par exemple, les divisions administratives ne correspondant à rien à ce point de vue.

M. N. ROUX estime que le département de l'Ardèche est, sous ce rapport, une division bien naturelle. M. Cl. ROUX fait remarquer que, dans cette région, il n'y a pas moins de trois contrées bien distinctes.

M. F. MOREL présente des plantes d'*Orchis papilionacea*, provenant de Saint-Maurice-de-Gourdans.

A ce sujet, M. VIVIAND-MOREL fait remarquer que M. Fiard,

de Meximieux, avait découvert ladite station, et que cette station se maintient depuis fort longtemps. Il a eu l'occasion de cultiver cette espèce et a pu faire des observations intéressantes. Son centre de dispersion semble être l'Algérie, où elle fleurit en mars et présente de grandes fleurs, de grandes inflorescences. La plante de Bonifacio, qui fleurit en avril, est déjà plus réduite dans ses fleurs et ses inflorescences. La plante de Saint-Maurice, qui fleurit vers le 5 juin, est réduite à quelques fleurs seulement. Il semble qu'il s'est créé des races locales, maintenant bien fixées.

M. F. MOREL présente aussi, de la même station, *Pulsatilla rubra* et *Trifolium alpestre*. Il montre aussi de magnifiques échantillons, provenant de ses cultures, de *Saxifraga longifolia* et *pyramidalis*, des Pyrénées, ainsi que le *S. aizoon*.

M. VIVIAND-MOREL fait remarquer que les Saxifrages en question, qu'on trouve rarement fleuries dans leurs stations naturelles, fleurissent assez facilement dans les cultures. Il cite l'opinion de Lapeyrouse, qui dit avoir vu des *S. pyramidalis* ayant des inflorescences hautes de 2 centimètres, à côté d'autres qui atteignaient près de 1 mètre.

M. VIVIAND-MOREL présente :

Viola permixta Jord. Cette sorte passe pour un hybride des *V. hirta* et *multicaulis*. Elle ne se reproduit et ne donne de graines que sur des fleurs cléistogames.

Dictamnus fraxinella, quatre variétés fixées, différentes entre elles par leur coloration et quelques autres menues différences.

Linum campanulatum, abondant à Rochemaure (Drôme), belle espèce, très ornementale, se reproduisant seule dans les jardins.

Cyanus lugdunensis (*Centaurea*), à fleurs bleues et à fleurs roses, forme cespiteuse du *C. montana*, et plus tardive.

Fruits du *Xanthoceras sorbifolia*.

M. COLLEUR présente le *Peziza coccinea*, provenant de la Grande-Chartreuse, et récolté par M. Faucheron. Il montre aussi un cas de virescence du *Valerianella olitoria*.

M. BIDOLLET montre le *Boletus pachypus* de Dardilly, et M. FAVRIN, de beaux exemplaires de *Psalliota arvensis*, de Chaponost.

SÉANCE DU 24 JUIN 1910

PRÉSIDENTE DE Mlle M. RENARD.

ADMISSION

M. BATTETTA Victor, 15, rue de l'Alma, présenté, à la dernière réunion, par MM. Laurent et Riel, est admis membre de la Société.

M. le D^r RIEL annonce qu'il dirigera une herborisation cryptogamique à Charbonnières, le dimanche 26 juin.

M. ABRIAL donne ensuite lecture de la note suivante :

Buplevrum protractum Link. et Hoffm. — Le *Buplevrum protractum*, d'après les auteurs des nombreuses flores que nous avons consultées (1), semble n'être qu'une forme méridionale du *Buplevrum rotundifolium*.

Cette espèce se rencontre en France, dans le Centre, le Midi, où elle remonte jusqu'au niveau de Valence, à l'est jusqu'à Gap, et adventice en Normandie.

Elle est très commune en Corse et en Algérie.

Son aire géographique s'étend dans l'Europe méridionale, Asie mineure, Syrie, Palestine, Mésopotamie, Perse, Afrique septentrionale, et de l'Égypte à Madère.

L'échantillon que je vous présente a été cueilli assez loin de la station la plus septentrionale : il a été cueilli à Lyon-

(1) *Flore de l'Algérie*, de Battandier et Trabut. — *Flores françaises et de la Corse* : Bonnier et de Layens, Gilet et Magne, Acloque, Grenier et Godron, abbé Coste, Rouy et Foucaud. — *Flore du Bassin moyen de la Loire et du Rhône et des Alpes*, abbé Cariot, 8^e édition.