

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE LYON

TOME XXXV (1910)

NOTES ET MÉMOIRES

COMPTES RENDUS DES SÉANCES


— 1910 —

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

1, PLACE D'ALBON, 1

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38

1911



M. GIRAUD présente le *Pleurotus ulmarius* provenant d'une cave où il l'observe depuis plusieurs années.

M. AGNIEL montre le *Pholiota destruens* et l'*Hydnum erina-ceum*.

Mlle M. RENARD présente le *Geoglossum hirtum*, trouvé dans un endroit tourbeux, au pied de la Roche d'Ajoux, vers 900 mètres d'altitude. Il y était en société avec *Wahlenbergia hederacea* et *Drosera rotundifolia*. La *Wahlenbergia* était très abondante dans cette région, ainsi que l'*Impatiens nolitangere* dans les forêts, où elle présentait une taille assez élevée.

M. MEYRAN fait remarquer que la *Wahlenbergia* est plus abondante et moins rare qu'on ne le croit généralement. Seulement, il arrive fréquemment qu'on ne la trouve pas parce qu'elle fleurit relativement tard et qu'on herborise le plus généralement dans les régions qu'elle habite vers le 14 juillet. Il rappelle que, en août 1879, on l'avait trouvée en grande quantité à Pierre-sur-Haute, tandis que, lors de la dernière excursion, au mois de juillet, on n'en a trouvé que quelques rares échantillons.

M. N. ROUX donne quelques détails sur la session de la Société Botanique de France, qui a eu lieu dans les Alpes-Maritimes. Il en présentera un compte rendu à une prochaine séance.

M. le D^r RIEL annonce qu'il dirigera une herborisation, le 16 octobre, à Sainte-Colombe-lès-Vienne.

SÉANCE DU 25 OCTOBRE 1910

PRÉSIDENCE DE Mlle M. RENARD

M. Cl. ROUX annonce le décès de notre savant collègue, M. le D^r X. GILLOT, d'Autun, survenu le 20 courant. La Société dé-

cide de prier M. PROTHIÈRE de lui consacrer une notice nécrologique pour notre *Bulletin*.

M. V. FREHSE présente les champignons suivants : *Tricholoma amethystinum*, *Clitocybe cerussala*, *Collybia butyracea*, *Mycena galericulata*, *Lepiota clypeolaria*.

M. PRUDENT, à propos de la couleur du *Tricholoma amethystinum*, a remarqué, qu'après des pluies importantes, cette couleur devient très pâle. La même remarque s'applique au *T. panaeolum*.

M. le D^r BRETIN a fait la même observation et a trouvé des *T. amethystinum* presque entièrement décolorés, où la coloration caractéristique n'était guère visible qu'à la partie inférieure du pied.

M. N. ROUX présente un certain nombre de plantes qu'il a rapportées de ses récentes herborisations dans les Alpes-Maritimes. Ce sont :

<i>Vincetoxicum dumetecolum.</i>	<i>Moehringia dasyphylla.</i>
<i>Iberis ciliata.</i>	<i>Asperula longiflora.</i>
<i>Senecio aurantiacum</i> var. <i>lanuginosa</i>	<i>Oreochloa pedemontana.</i>
<i>Draba carinthiaca.</i>	<i>Geranium macrorrhizum.</i>
<i>Hieracium glaciale.</i>	<i>Coralliorhiza innata.</i>
<i>Potentilla pedemontana.</i>	<i>Listera cordata.</i>
<i>Centaurea axillaris.</i>	<i>Silene cordifolia.</i>
<i>Forma Triumfetti.</i>	<i>Asperula heaphylla.</i>
<i>Hieracium lantoscanum.</i>	<i>Micromeria pierita.</i>
<i>Festuca varia.</i>	<i>Herminium monorchis.</i>
<i>Primula marginata.</i>	<i>Pirola uniflora.</i>
<i>Ononis striata.</i>	<i>Eritrichium nanum.</i>
<i>Dianthus liburnicus.</i>	<i>Trifolium Thalii.</i>
<i>Phyteuma Balbisii.</i>	— <i>Balbisianum.</i>
<i>Oxytropis cyanea.</i>	<i>Galeopsis sulfurea.</i>
<i>Alsine lanceolata.</i>	<i>Viola valderia.</i>
<i>Campanula macrorrhiza.</i>	<i>Dianthus furcatus</i> , etc., etc.

M. MEYRAN fait remarquer que l'*Ononis striata* remonte jusque dans la vallée de l'Ubaye, où il est localisé dans les reboisements, en particulier entre les Gleizolles et Meyronnes, à la Rochaille. L'*Eritrichium nanum*, que M. Roux a trouvé très abondant, se rencontre également en grande quantité à Belle-donne, Taillefer, au Goléon, etc. Il semble moins fréquent dans les Alpes de Barcelonnette.