



ANNALES
DE LA
SOCIÉTÉ BOTANIQUE
DE LYON

TOME XXXVI (1911)

NOTES ET MÉMOIRES

COMPTES RENDUS DES SÉANCES

— 1911 —

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

1, PLACE D'ALBON, 1

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38

1912

est cultivé. Les horticulteurs avisés ne craignent pas de multiplier les plus profitables, soit par les rejets, la marcotte ou la greffe. Les plus recherchées sont celles à floraison précoce et à plus grandes fleurs.

Il ajoute que l'*Acacia dealbata* est calcifuge ; pour cette raison, dans les jardins de Nice à terrains calcaires, on est tenu de la greffer sur des sortes indifférentes à la nature du sol, notamment sur l'*Acacia floribunda*.

MM. CHIFFLOT et DES GAYETS ont envoyé une note sur une nouvelle localité du *Clathrus cancellatus*, à Saint-Germain-Lespinnasse (Loire), dans un jardin.

M. RIEL fait ressortir l'intérêt de cette nouvelle localité d'un champignon rare et se trouvant seulement dans des endroits cultivés.

M. BEAVERIE dit qu'un médecin militaire, revenant du Congo, a rapporté à M. CHIFFLOT avoir trouvé dans ces régions des *Clathrus* de gros volume, dont les indigènes emploient le suc pour empoisonner leurs flèches.

M. Cl. Roux fait quelques observations sur le « Catalogue des plantes de l'Ardèche », de M. REVOL, paru dans nos publications, et sur la façon dont l'auteur y a compris les espèces jordaniennes. Un certain nombre d'espèces ont été réduites au rang de variétés, tandis que d'autres ont conservé leur importance. M. Roux fait remarquer la difficulté qu'on éprouve quand on veut faire de la statistique en géologie botanique, lorsqu'on se trouve en présence de diverses listes dont les auteurs ont une compréhension différente de la valeur des espèces.

SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1911

PRÉSIDENTE DE M. BEAVERIE

M. VIVIAND-MOREL présente trois formes de *Smilax aspera* dont l'une correspond au *S. mauritanica* D. C.

L'espèce linnéenne, seule admise par certains auteurs, est en réalité constituée par des formes nombreuses à fleurs et fruits semblables, et ne différant guère que par les feuilles.

M. le professeur BEAUVISAGE rappelle que, sur un même pied, on peut aussi voir des différences foliaires bien marquées.

M. VIVIAND-MOREL présente, en outre, *Chimonanthus fragrans* en fleurs et des échantillons fleuris d'*Eranthis hiemalis* ; ce dernier donne de nombreuses formes, dont une, du Monestier de Briançon, à fleurs très petites.

M. le D^r BRETIN présente les espèces suivantes, dont la plupart en fleurs, provenant de la campagne de Nice :

<i>Lamium amplexicaule</i> , var. <i>cryptanthum</i> .	<i>Erica arborea</i> .
<i>Juniperus oxycedrus</i> .	<i>Acacia dealbata</i> .
<i>Fumaria capreolata</i> .	— <i>Farnesiana</i> .
— <i>officinalis</i> .	— <i>floribunda</i> .
<i>Stachelina dubia</i> .	— <i>cultriformis</i> .
<i>Erybothria japonica</i> .	<i>Polygonum capitatum</i> .
<i>Alyssum maritimum</i> .	<i>Lavandula Stoechas</i> .
<i>Erigeron canadense</i> .	<i>Arabis hirsuta</i> .
<i>Centaurea cyanus</i> .	<i>Quercus Suber</i> .
<i>Calendula arvensis</i> .	<i>Schinus molle</i> .
<i>Laurus nobilis</i> .	<i>Daucus Carota</i> .
<i>Salix caprea</i> ♂	<i>Ficaria ranunculoides</i> .
<i>Lopezia coronata</i> .	<i>Reseda Phyteuma</i> .
<i>Arum Arisarum</i> .	<i>Cistus monspeliensis</i> .
<i>Bambusa viridis</i> .	<i>Rhamnus alaternus</i> .
	<i>Scabiosa maritima</i> .

SÉANCE DU 7 MARS 1911

PRÉSIDENCE DE M. BEAUVÉRIE

M. BEAUVÉRIE présente deux mémoires au nom de M. CHIFFLOT :

1° Sur les feuilles ascidiées du *Lycaste aromatica* Ldl ;

2° Sur la tératologie des chatons mâles d'*Alnus viridis* D. C.