



ANNALES
DE LA
SOCIÉTÉ BOTANIQUE
DE LYON

TOME XXXVI (1911)

NOTES ET MÉMOIRES

COMPTES RENDUS DES SÉANCES

— 1911 —

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

1, PLACE D'ALBON, 1

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38

1912

Il annonce que M. REVOL est un des organisateurs de la session extraordinaire de la Société Botanique de France en 1912, dans le Vercors.

M. BEAUVERIE communique ses observations sur la présence d'un *Cladophora* dans les eaux du Rhône, près du pont de l'Université. Il pense que c'est peut-être en raison des eaux extrêmement basses en cette saison, que cette Algue s'est ainsi développée d'une façon considérable à cet endroit.

SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1911

PRÉSIDENTE DE M. BEAUVERIE

M. le Dr Ant. MAGNIN, à propos d'un article de M. de Boissieu, signalé dans les ouvrages reçus, et concernant les Narcisses du Poizat (Ain), dit qu'il a lui-même fait des observations sur ces mêmes Narcisses, ainsi que dans l'herbier d'Hénon, et qu'il en fera l'objet d'une communication à la prochaine séance.

M. Nisius Roux présente un certain nombre de plantes de Corse, entre autres :

Mesembryanthemum crystallinum.
Thymus herba barona.
Helychrysum frigidum.
Anthyllis Hermanniae.
Sedum caeruleum.
Phagnalon Tenorii.
Centaurea napifolia.
Ornithogalum exscapum.
Scrofularia ramosissima.
Crupina Morisii.
Kentrophyllum caeruleum.

Astragalus beaticus.
Erica stricta.
Matthiola incana.
Ruta corsica.
Armaria leucocephala.
Paëonia corsica.
Mentha Requienii.
Ophrys tenthredinifera.
Clematis cirrhosa, var. *balearica* et *semitriloba*, etc.

A propos du *Clematis cirrhosa*, M. VIVIAND-MOREL dit que cette espèce n'est pas aussi simple qu'on le croit générale-

ment. M. Jordan en avait dans ses cultures au moins trente formes différentes.

M. le D^r Ant. MAGNIN présente des photographies prises au cours des herborisations faites dans le Doubs, le Haut-Jura et les Vosges en 1911, en particulier au Chasseron, aux Aiguilles et au Suchet. Il donne des renseignements sur cette partie des hautes chaînes jurassiennes, et signale les particularités intéressantes de dispersion de certaines espèces.

Notre collègue donne aussi des détails sur l'excursion qu'il a dirigée dans ces régions les 4 et 5 juin 1911, et qui avait réuni quarante-trois personnes. Il insiste sur l'intérêt qu'il y aurait pour la Société Botanique de Lyon à faire cette herborisation, qui pourrait s'effectuer en deux jours ; il se met à la disposition de ses confrères pour l'organiser s'il y a lieu.

M. LAURENT présente des échantillons de *Senecio leucophyllus* du Mezenc, et signale dans cette région la présence de l'*Euphrasia minima*. Il fait aussi certaines remarques sur le *Drosera rotundifolia*, dont il n'a pas pu rencontrer de fleurs ouvertes, et sur le *Veratrum album*, qu'il a rencontré portant des fleurs hermaphrodites et des fleurs mâles.

Il présente des feuilles de Tilleul portant des ascidies bien caractérisées.

M. V. FREHSE montre des échantillons d'un produit vendu dans le département de la Drôme comme poivre en grains. A côté de quelques grains de poivre (13 % environ) de poussières et de débris de graines avariées (8,5 %), le reste se composait de grains présentant les caractères du Piment de la Jamaïque, Poivre anglais, Poivre girofle. Toute épice, Epice nouvelle, Myrte piment, fruit du *Pimenta officinalis* Lindl. (*Myrtus pimenta* L.), petit arbre de la famille des Myrtacées, et originaire des Indes.

Ces grains présentent les caractères suivants : baie sèche, globuleuse, de 4 à 7 millimètres de diamètre, surface gris brun ou brun rouge, rugueuse. Cette baie porte à son sommet un style court qui est inséré dans une dépression, entourée par quatre lobes desséchés du calice ou les petites cicatrices que

ceux-ci ont laissé en tombant. Le péricarpe friable est formé de deux loges contenant chacune une graine d'un brun noir ayant une face plane ou concave appliquée contre la cloison et une face convexe et un bord circulaire échancré vers le haut.

Ce fruit possède une odeur qui rappelle celle du clou de girofle et de la cannelle et une saveur piquante et aromatique.

SÉANCE DU 24 OCTOBRE 1911

PRÉSIDENTE DE M. BEAUVERIE

M. H. DUVAL présente de nombreux cas de tératologie des espèces suivantes : *Solanum dulcamara*, à feuilles laciniées ; *Cichorium Intybus* et *Anthemis tinctoria*, à tiges fasciées ; *Muscari comosum*, à fleurs avortées et pédoncules allongés ; *Tragopogon pratense* à capitules coalescents ; *Scolopendrium officinale*, à feuilles bifurquées ; *Phieum nodosum* à épis bifurqués, etc., etc.

A propos des feuilles bifurquées du *Scolopendrium*, M. le Dr Ant. MAGNIN fait remarquer que ces bifurcations se présentent assez fréquemment dans les Fougères et qu'on les rencontre facilement quand on y apporte un peu d'attention.

M. LAURENT fait remarquer que les Scolopendres à limbe bifurqué, ou même plus découpé, ne sont pas rares en Normandie (environs de Caen).

M. le Dr MAGNIN fait une intéressante communication sur les Narcisses de Poizat et en particulier sur le *Narcissus Bernardi*. Il donne d'intéressants détails historiques sur Bernard et Hénon, et montre des échantillons provenant de l'herbier Hénon.

M. VIVIAND-MOREL rappelle que le Jardin Hénon était situé rue Corne-de-Cerf. Jordan a cultivé le *Narcissus Bernardi* et il