

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 9 AOÛT 1937
des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON. D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES
et de leurs GROUPES RÉGIONAUX : ROANNE, VALENCE, etc

Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6^{me})Trésorier : M. H. BONVALLET, 20, rue Molière, Lyon (6^e).

ABONNEMENT ANNUEL : France et Union	10 F	— C.C.P. Lyon 101-98
Etranger	11 F	
Scolaires	5 F	

N.B. — Les virements à notre C.C.P. doivent être adressés au nom
de la SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

♀. Antennes ne dépassant pas le milieu des élytres. Elytres mats, épipleures et élytropleures luisantes, tous les intervalles costiformes, fortement convexes. Pattes minces.

Cette espèce s'éloigne de toutes les autres connues actuellement du Vénézuëla, de Colombie et de Panama par son thorax à peu près impunctué sur le disque et par le fort dimorphisme sexuel des élytres et des pattes antérieures.

Vilhenaltica picturata n. sp.

Brésil, Mato Grosso : Chapada dos Guimarães, 5-II-1961 (J. et B. BECHYNÉ, Mus. Goeldi).

Long. 3,2 mm. ♀ inconnue.

Testacé pâle, antennes sensiblement rembrunies vers l'extrémité ; élytres ornés d'une tache irrégulière rouge brun, marginée en partie de noir. Si l'on désigne la couleur fondamentale des élytres obscure, le tiers apical, réuni à la suture avec une tache rhomboïdale commune centrale, se continuant en avant étroitement à la suture vers la base, la base extrême ainsi que tout le quart extérieur du disque dans toute la moitié antérieure réuni aux élytropleures étroitement avec la partie apicale testacés.

Outre la coloration très particulière, cette espèce nouvelle se distingue de *V. dibolosoma* Bech. et Bech.⁴ par le front aussi large que le diamètre transversal d'un œil, par les sillons oculaires bien moins dilatés (chacun occupant environ 1/4 de la largeur totale du front), par le sillon transverse antébasal du thorax entier et sinué avant l'écusson et par les élytres fortement ponctués (points visibles déjà sous le grossissement de 5-8 ×).

4. 1964, Rev. Fac. Agron. Maracay 3, 3, p. 101, fig. 14.

**COMPTE RENDU ORNITHOLOGIQUE SEMESTRIEL.
DONNEES SUR LA MIGRATION PRENUPTIALE
ET LA SAISON DE NIDIFICATION 1965
DANS LA REGION RHONE-ALPES** (suite et fin).

— G. musicienne *T. philomelos* : premières migratrices le 31-1 à Valence (S.M.), le 7-2 en Dombes (P.L.) ; un individu capturé le 28-2 à Valence avait été bagué le 15-8-64 dans le canton de Vaud, Suisse.

Chanteurs en avril-mai à Lyon-St-Just (H.Ta.) ; nicheuse au Parmelan (Haute-Savoie) (C.O.R.A.) ; abondante le 27-6 près de Lamastre (Ardèche) (B.C.) ; notée le 9-7 à la Cluse de l'Albarine, Jura méridional (Ain) (G.H.).

— Merle à plastron *T. torquatus* : une ♀ les 15 et 17-2 à Tain-l'Hermitage (Drôme) (J.N.) ; une centaine d'individus le 15-4 au pied du Parmelan (Haute-Savoie) (B.C.), plusieurs le 18-4 à Bajin près d'Allevard (Savoie) (M.B.). Stations de nicheurs : Samoëns (J.C.), Parmelan (B.C.) (Haute-Savoie), Mont-Revard (Savoie) (M.B.), Grand Crêt d'Eau, Jura (Ain), plateau de Retord, Jura méridional (Ain) (4 œufs couvés le 21-5) (B.F.), Charmant Som, Chartreuse (Isère) (J.T.), lac de Tignes (Isère) (J.R.).

— M. roir *T. merula* : à Izieux (Loire), stabilité des effectifs : 54 captures de la mi-mars à la fin-août 65, contre 53 pour la même période de 1964 (H.B.) ; à Chalamont, Dombes, 5 jeunes voletant le 22-4 (R.L.) ; le 21-5, au plateau de Retord, Jura méridional (Ain), un nid à 4 œufs est situé à 25 m d'un nid de Merle à plastron.

— M. de roche *Monticola saxatilis* : 2 individus le 25-7 au Col de l'Iseran, vers 2 500 m (Isère) (B.C.).

— Traquet motteux *Oe. oenanthe* : premiers migrateurs le 4-4 en Dombes (P.L.). Stations de nicheurs : Samoëns (Haute-Savoie) (J.C.), col du Galibier (J.R.), col de l'Iseran (B.C.), lac de Tignes (J.R.), Villars-d'Arène (Isère) (P.L.), Châteaubourg (Ardèche) (J.N.).

— Tr. pâtre *Saxicola torquata* : un le 7-2 à Servas, Dombes, hivernant ou migrateur très précoce ? (D.Dv.) ; premiers le 26-2 à Valence (S.M.), le 12-3 à Optevoz (Ain) (R.M.), le 13-3 à Izieux (Loire) (H.B.), le 14-3 en Forez (J.F.), tardif.

— Tr. tarier *S. rubetra* : seule citation de nicheur en plaine : les Echets, Dombes (B.C.). En altitude : commun à Samoëns (Haute-Savoie) (J.C.) ; à Villaz, Parmelan (Haute-Savoie) (B.C.) ; Mont-Revard (Savoie) (M.B.) ; Hotonnes, Valromey (Ain) (S.H.) ; St-Hilaire-du-Touvet (Isère) (M.L.) ; le Grand-Bois, Pilat (Loire) (H.B.).

— Rougequeue à front blanc *Ph. phoenicurus* : premiers le 28-3 à Tournon (Ardèche) (C.O.R.A.), le 30-3 à Izieux (Loire) (H.B.) et à Jonage (Isère) (B.C.), le 4-4 à Poliat (Ain) (D.B.).

— R. noir *Ph. ochruros* : premiers le 13-2 à Valence (S.M.), le 14-3 en Dombes (R.L.) ; moins abondant à Izieux qu'en 1964 (5 captures contre 19) (H.B.).

— Rossignol *Luscinia megarhynchos* : le 5-4 à Bissy près Chambéry (B.Cou.), le 6-4 aux Echets, Dombes (B.C.), assez précoce ; le 12-4 en Forez (J.F.).

— Gorgebleue *L. svecica* : un individu au plastron entièrement bleu est noté au Marais des Echets le 1-4, revu au même endroit le 25-4 mais pas par la suite (B.C.).

— Rougegorge *Erithacus rubecula* : passage aux Echets du 28-3 au 15-4 (B.C.).

SYLVIDÉS.

— Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* : chanteur le 25-4 à St-Nazaire-les-Aymes (Isère) (M.B.), le 29-5 à Goncelin (Isère) (J.T.).

— Locustelle tachetée *Locustella naevia* : nicheuse aux Echets (B.C., J.R.).

— L. luscinoïde *L. luscinioides* : premières le 1-4 aux Echets (B.C.), le 4-4 à Poliat (Ain) (D.B.) ; notée le 1-5 en Forez (J.F.), en juin à La Valbonne (P.G.), les 8 et 10-6 à l'étang de Chavanne (Drôme) (J.N.).

— Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus* : premières le 19-4 à Tournon (Ardèche) (J.N.), le 24-4 en Forez (J.F.) ; un individu repris le 20-5 à Grenoble avait été bagué le 7-8-64 en Württemberg, Allemagne de l'Ouest.

Stations en mai : lac d'Aiguebelette (Savoie), lac St-André (Isère) (J.T.), lac de Paladru (Isère) (M.B.), étang de Courtenay, près Crémieu (Isère) (J.C.), étang à Tournon (Ardèche) (J.N.).

— R. effarvatte *A. scirpaceus* : première le 10-4 à Tournon (Ardèche) (J.N.), le 25-4 en Dombes (D.Dv.) ; présente le 16-5 au Bourget-du-Lac

(M.B.), le 21-5 à l'étang de Moras, près Crémieu (Isère) (J.C.) ; nid à un œuf le 1-7 à Billième près Yenne (Savoie) (H.T.).

— Phragmite des joncs *A. schoenobaenus* : dès le 28-3 en Dombes (B.C.) ; le 24-4 près de Feurs (J.F.) ; chant nuptial le 19-6 à l'étang de Méximieux (Ain), nicheur ? (P.G.).

— Hypolaïs polyglotte *Hippolaïs polyglotta* : premier le 2-5 à Valence (S.M.), le 9-5 à Tournon (Ardèche) (J.N.).

— Fauvette orphée *Sylvia hortensis* : à Izieux (Loire), capture le 4-5 et chant le 1-7, nicheuse probable (H.B.) (cf. capture le 4-8-64).

— F. des jardins *S. borin* : première le 25-4 aux Echets (B.C.), le 3-5 à Izieux (Loire) (H.B.).

— F. à tête noire *S. atricapilla* : hivernantes ou migratrices précoces : un ♂ le 31-1 à Valence (S.M.), une ♀ le 4-2 à Izieux (Loire) (H.B.), une ♀ le 6-2 à Millery/Rhône (Rhône) (J.B.). Premiers chants : le 14-3 à Tournon (Ardèche) (J.N.), le 20-3 à Bissy près Chambéry (B.Cou.), le 21-3 à Millery (Rhône) (J.B.), Cours (Rhône) (R.M.) et à Izieux (Loire) (H.B.).

— F. grisette *S. communis* : arrivée précoce : le 1-4, une aux Echets (B.C.), le 4-4 à Plat (Ardèche) (J.N.) et à Villars-lès-Dombes (au moins 3 chanteurs) (P.L.), le 8-4 en Forez (J.F.).

— F. babillarde *S. curruca* : première le 18-4 en Dombes (P.L.) ; nicheuse commune aux Echets (B.C., P.L.) et citée en plusieurs points de la Dombes en avril-mai (P.L.) ; chanteur le 11-7 à Villars-d'Arène (altitude 1 600 m) (Isère) (P.L.).

— Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* : un hivernant ou migrateur précoce le 31-1 à Montéler (Drôme) (S.M.) ; premiers le 27-2 à Billième près Yenne (Savoie) (H.T.), puis le 17-3 à Jonage (Isère) (B.C.), le 20-3 en Forez (commun) (J.F.), le 21-3 en Dombes (P.L.). Jeunes récemment éclos le 27-5 dans les Monts du Lyonnais (H.B.).

— P. fitis *Ph. trochilus* : premiers le 28-3 à Tournon (Ardèche) (C.O.R.A.), le 1-4 aux Echets, Dombes (B.C.), le 2-4 à Servas, Dombes (D.Dv.), le 8-4 en Forez (J.F.) ; chanteur le 5-6 à Port-Galland (Ain) (P.L.).

— P. siffleur *Ph. sibilatrix* : le 24-4 en Dombes-Est (R.L.), le 1-5 à St-Pancrasse (Isère) (M.L.), le 9-5 à St-Maximin (Isère) (M.B.), le 11-5 à Servas, Dombes (D.Dv.) ; noté un individu apparemment cantonné les 13-5, 15-5 et 18-6 au Parc de Lyon (J.C.).

— P. de Bonelli *Ph. bonelli* : le 8-5 au Grand-Bois, Pilat, près St-Etienne (Loire) (H.B.) ; nombreux le 15-5 au barrage de Couzon, Pilat (M.B.) ; cri noté le 26-7 à St-Cyr-les-Vignes (Loire) (P.L.). Dans le Jura méridional (Ain), en mai : Innimond (B.C.), et en juillet : sources de l'Addoux et cours du Groin (S.H.), cluse de l'Alabarine (G.H.) ; le 16-5 à La Chambotte, Lac du Bourget (Savoie) (M.B.). Le 26-5, noté à Servas, Dombes (D.Dv.). Nicheur (un couple) près de Valence, comme en 1964 (S.M.).

ROITELETS.

— Roitelet huppé *R. regulus* : le 2-5 à Cize-Bolozon (Ain) (D.B.) ; le 20-6 au Parmelan (Haute-Savoie) (C.O.R.A.).

— R. triple-bandeau *R. ignicapillus* : — migrateurs : un le 1-4 aux Echets (B.C.), un le 4-4 à Chalamont, Dombes (R.L.) ; — nicheurs : le 16-5 au Revard (Savoie) (M.B.), le 20-6 au Parmelan (C.O.R.A.).

GOBEMOUCHES.

— Gobemouche gris *Muscicapa striata* : premier le 13-5 au Parc de Lyon (J.C.) et à Izieux (Loire) (contrôle d'un individu bagué loco en 1963 et 1964) (H.B.), le 14-5 aux Echets (J.R.).

Un nid de 4 œufs le 6-6 à Cusy, Bauges (Savoie) (B.C.) ; deux nids de 3 et 4 poussins les 25 et 29-6 à Chambéry (B.Cou.) ; nicheur à Valence (S.M.) ; noté le 26-6 à Nandax près Roanne (Loire) (J.L.) ; le 29-7, un individu à la Faculté de Lyon, passage précoce ou nicheur proche ? (P.L.).

— G. noir *Ficedula hypoleuca* : le 27-4 près de Grenoble (M.L.), le 30-4 à Billième près Yenne (Savoie) (H.T.), le 1-5 à Izieux (Loire) (H.B.), le 9-5 à Ste-Eusèbe (Savoie) (nicheurs comme en 1964 ?) (B.C.), les 11 et 13-5 aux Echets (B.C.). Nicheur près de Valence comme en 1964 (S.M.) ; 3 couples cantonnés le 27-6 près de Lamastre (Ardèche) dans un massif de Châtaigniers (B.C.).

ACCENTEURS.

— Accenteur mouchet *Prunella modularis* : le 2-4 à St-Hilaire-du-Touvet (Isère) (M.L.) ; le 20-6 au Parmelan (Haute-Savoie) (C.O.R.A.).

— A. alpin *P. collaris* : 6 individus le 18-4 à Bajin près d'Allevard (Savoie) (M.B.) ; au moins 5 individus le 20-6 au sommet du Parmelan (C.O.R.A.).

MOTACILLIDÉS.

— Pipit rousseline *Anthus campestris* : en Forez, 5 individus le 22-4 à Feurs et 4 le 9-5 à Arthun (J.F.).

— P. des arbres *A. trivialis* : stations en mai-juin : Samoëns (J.C.), Parmelan (P.L.), Plateau des Glières (B.C.) (Haute-Savoie) ; Bajin près d'Allevard (Savoie) (M.B.) ; St-Innimond, Jura méridional (Ain) (nid de 3 œufs le 15-5) (B.C.) ; St-Maximin (M.B.) et Charmant Som, Chartreuse (J.T.) (Isère) ; Chatelus, Monts du Lyonnais (Rhône) (H.B.) ; Bonzieux, Pilat (Loire) (H.B.) ; Lamastre (Ardèche) (B.C.) ; soit essentiellement stations d'altitude et de mi-altitude.

— P. farlouse *A. pratensis* : passage à Valence en février (S.M.) ; plusieurs le 11-3 aux Echets, Dombes (B.C.).

— P. spioncelle *A. spinoletta* : passage abondant en février à Valence (S.M.).

— Bergeronnette grise *Motacilla alba* : passage régional entre le 27-2 (mais déjà 5 individus le 11-2 à Valence (S.M.) et le 7-4 (D.B., H.B., P.L., J.C., J.F., R.L., R.M., M.L., H.T.) ; notée en mai-juin à Beynost (Ain) (P.L.) et le 26-6 à Nandax près Roanne (Loire) (J.L.).

— B. des ruisseaux *M. cinerea* : nicheuse commune le long du Fier à Digny-St-Clair (Haute-Savoie) (B.C.) ; nicheuse à Izieux (Loire) (H.B.) ; notée le 26-6 à Nandax près Roanne (Loire) (J.L.).

— B. printanière *M. flava* : premières le 28-3 à Tournon (Ardèche) (cris) (P.L.), le 11-4 à Blyes (Ain) (P.L., M.B.) ; plusieurs individus le 16-5 à Valence (S.M.).

PIES-GRIÈCHES.

— Pie-grièche grise *Lanius excubitor* : en Forez, un individu le 25-4 à Montrond-les-Bains et un le 7-6 à Ste-Foy-St-Sulpice (J.F.) ; en Dombes, un individu à Villars les 6-6 et 14-7 (P.L.) ; un le 3-7 en Valbonne

(P.G.) ; 3 individus en juillet et mi-août à Lompnieu-en-Valromey (Ain) (S.H.).

— P.-g. à poitrine rose *L. minor* : en juin à St-Jean-de-Niost (Ain) (P.G.).

— P.-g. à tête rousse *L. senator* : le 9-5 à Jasseron (Ain) (D.B.) et à St-Igny-de-Roche (Saône-et-Loire) (H.Ta.), le 10-5 à Valence (S.M.).

Au moins 3 couples cantonnés en juillet à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie) (B.C.) ; un individu le 5-6 peu au N. de Vienne (Isère) (S.H.) ; un à Pont-de-Jons (Isère) le 16-6 (B.C.) ; un individu le 15-6 à Loyettes (Ain) (J.R.) ; un couple en Valbonne le 3-7 (P.G.). Présente le 26-6 à Nandax près Roanne (Loire) (J.L.) ; un individu le 7-6 à Ste-Foy-St-Sulpice, Forez (Loire) (P.L.). Un individu le 23-5 à Vernoux (Ardèche) (H.B.).

— P.-g. écorcheur *L. collurio* : pas de dates avant le 16-5, Dombes (P.L.) ; un ♂ migrateur le 21-5 à la Faculté de Lyon (P.L.).

ETOURNEAUX.

— Etourneau *Sturnus vulgaris* : passage de quelques individus le 28-3 au Col de l'Escrinet (Ardèche) (C.O.R.A.). 5 jeunes quittant le nid le 9-5 à Ste-Eusèbe (Haute-Savoie) (B.C.) ; augmentation des nicheurs à Izieux (Loire) (H.B.) et à Billième près Yenne (Savoie) (H.T.).

FRINGILLES.

— Gros-Bec *C. coccothraustes* : un ♂ capturé le 30-3 à Izieux (Loire) (H.B.) ; noté à Nandax près Roanne (Loire) le 26-6 (H.B.).

— Verdier *Carduelis chloris* : à Izieux (Loire), 28 captures de mai à août contre 16 l'année précédente (H.B.).

— Chardonneret *C. carduelis* : à Izieux, 19 bagués contre 43 en 1964 (H.B.).

— Tarin *C. spinus* : 2 individus le 16-4 à Ste-Hélène-du-Lac (Savoie), hivernants attardés ? (M.B.) ; un le 8-5 à St-Hilaire-du-Touvet (Isère) (M.L.).

— Linotte *C. cannabina* : une dizaine d'individus le 15-3 à Valence (S.M.) ; un chanteur le 29-4 à Vaux-en-Bugey (Ain) (D.Dv.) ; nicheur à Billième près Yenne (Savoie) (H.T.) ; un individu le 11-7 à Villars-d'Arène (Isère) (P.L.).

— Sizerin flammé *C. flammea* : petites bandes le 26-6 dans les aulnaies à Samoëns et Praz-de-Lys (Haute-Savoie) (J.C.).

— Venturon *C. citrinella* : une quarantaine le 20-4 à Annecy-le-Vieux (B.C.) ; au Parmelan le 20-6 (C.O.R.A.) ; un couple cantonné le 21-5 au Grand Crêt d'Eau (Ain) (B.F.) ; à Samoëns (Haute-Savoie) le 26-6 (J.C.) ; à Charmant Som, Chartreuse (Isère) le 27-6 (J.T.).

— Serin cini *C. serinus* : retour en masse à Valence dès la mi-février (S.M.), mais premiers le 27-3 seulement à Beynost (Ain) (P.L.) et le 29-3 à Izieux (Loire) (H.B.).

— Bouvreuil *P. pyrrhula* : le 16-4 à Ste-Hélène-du-Lac (Savoie) (M.B.) ; régulier à Entraigues (Savoie) à la fin juillet (D.A.) ; le 20-6 au Parmelan (Haute-Savoie) (C.O.R.A.) ; noté le 25-4 à Pontcharra et le 9-5 à St-Maximin (Isère) (M.B.) ; nicheur (pour la première fois) à Izieux (Loire) où 6 individus ont été capturés durant la belle saison, dont un couple le 1-5 (H.B.). Noté le 7-7 en Valbonne (Ain) (G.H.), nicheur proche ?

— Pinson des arbres *Fringilla coelebs* : premier chant le 23-2 à Izieux (Loire) (H.B.).

BRUANTS.

— Bruant proyer *Emberiza calandra* : chanteurs le 30-5 à Pouilly-les-Nonains, peu à l'ouest de Roanne (Loire) (P.L.) ; nicheur commun à l'Hôpital-le-Grand, Forez (Loire) (J.F., P.L.).

— B. jaune *E. citrinella* : un ♂ chanteur le 27-5 à Villars-lès-Dombes est la seule citation de basse altitude (P.L.) ; noté en Savoie : Bajin près d'Allevard (M.B.), St-Jean-d'Arvey (D.A.), col de Plaimpalais, Bauges (J.M.), Billième près Yenne (H.T.), Haute-Savoie : Annecy (J.R.), Isère : Pontcharra, Paladru (M.B.), Villars-d'Arène (P.L.), Loire : Bonzieux-en-Pilat (H.B.), Haute-Loire : St-Bonnet-le-Froid, Haut-Vivaraire (B.C.).

— B. zizi *E. cirrus* : noté dans l'Ain : Simandre (D.B.), la Haute-Savoie : Annecy-le-Vieux (B.C.), la Savoie : Ste-Hélène-du-Lac (M.B.), la Loire : Nandax près Roanne (J.L.), la Saône-et-Loire : St-Igny-de-Roche (H.Ta.), l'Ardèche : Tournon (C.O.R.A.), Lamastre (B.C.), en milieu « colinéen ».

— B. ortolan *E. hortulana* : 3 migrants le 29-4 à Sandrans, Dombes (P.L., M.B.). Plusieurs couples en Valbonne (B.C., C.C., J.R.) ; nicheur à Billième près Yenne (Savoie) (H.T.) ; chanteurs le 26-5 à Montagny (Rhône) (P.L.), le 30-5 à St-Martin-de-Boissy, ouest de Roanne (Loire) (P.L.) ; un ♂ cantonné le 5-6 peu au N. de Vienne (Isère) (S.H.).

— B. fou *E. cia* : plusieurs les 16-4, 21-4 et 2-5 à Cize-Bolozon (Ain) (D.B., D.Dv.) ; un ♂ cantonné le 3-7 à Preveyzieu près Contrevoz (S.H.) et chanteur le 9-7 entre Ordonnaz et Contrevoz, Jura méridional (Ain) (P.L.). Nicheur clairsemé (noté en mars et juin) au Parmelan ; le 30-7 au plateau des Glières (Haute-Savoie) (B.C., J.R.). Un le 9-5 à Poleymieu, Monts du Lyonnais (Rhône) (R.M.). Nicheur commun autour de Lamastre (Ardèche) (B.C.).

— B. des roseaux *E. schoeniclus* : en avril-mai, noté à Poliat (Ain) (D.B.), au Bourget-du-Lac et à Ste-Hélène-du-Lac (Savoie), à Pontcharra et au Lac de Paladru (Isère) (M.B.) ; 2 nids de 5 jeunes les 21 et 22-5 au Marais des Echets, Dombes (B.C., J.R.).

MOINEAUX.

— Niverolle *Montifringilla nivalis* : un le 11-7 à Villars-d'Arène (Isère) (P.L.).

— Moineau domestique *Passer domesticus* : dortoir urbain dans des arbres à Lyon jusqu'à la mi-avril (M.B.) ; dès le 12-8 de même (avec M. friquets) à St-Chamond (Loire) (H.B.).

— M. friquet *P. montanus*.

BIBLIOGRAPHIE

G.M. VAN HILEGHEM (1965). — La Dombes in juli 1965. *De Wielewaal* (Belg.), 31, n° 10 : 257-270.

Ph. LEBRETON (1966). — Actes de la Réserve biologique de Dombes pour 1964-65. Compte rendu ornithologique. *Bull. Soc. Natur. Archéol. Ain*, n° 80 : 21-39.

F. et P. NICOLAS (1965). — Observations ornithologiques le long de la Saône. *Terre vive*, (Bull. Soc. Hist. Nat. Préhist. Mâcon), n° 3 : 173-177.

Rédaction : Ph. LEBRETON et J.-M. FAURE.