

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE LYON

Paraissant tous les trois mois

TOME XXXII (1907)

NOTES ET MÉMOIRES

COMPTES RENDUS DES SÉANCES

1-2 1907



SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

1, PLACE D'ALBON, 1

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38.

1907



SEANCE DU 7 MAI 1907

PRÉSIDENCE DE M. VIVIAND-MOREL.

M. MEYRAN présente une courte analyse de l'ouvrage sur le vignoble de Côte-Rôtie que notre collègue Cl. Roux a offert à la Société.

M. NIS. ROUX présente et distribue les espèces suivantes provenant de son jardin : *Myosotis alpestris*, *Geranium pyrenaicum*, *Daphné Cneorum*, *Vesicaria utriculosa*, *Geum montanum*, *Endymion nutans*, *Asperula odorata*, *Ajuga reptans*, etc.

Cette présentation donne lieu de la part de M. Viviani-Morel à quelques observations, notamment à propos du *Geum montanum* qui présente une physionomie particulière.

A propos du *Cytisus Adami*, M. Viviani-Morel rappelle qu'il a été obtenu par un horticulteur nommé Adam, en greffant le *C. purpureus* sur le *C. laburnum*. Il fut très étonné de trouver quelque temps après chez Bertin, à Versailles, les trois sortes de fleurs sur un même pied. Il s'agissait en réalité dans ce cas, d'un hybride de greffe.

M. NIS. ROUX signale les différences considérables que présente le *Fedia cornucopiae* suivant les conditions de sol, d'exposition et d'altitude dans lesquelles il croît.

M^{lle} ALBESSARD présente de beaux échantillons du *Morchella rotunda*.

M. PRUDENT fait part des observations qu'il a faites sur *Morchella semilibera* et *Verpa digitiformis*. Il a remarqué que, au début de l'apparition, quand l'herbe est courte, les sujets se présentent avec un pied grêle et un chapeau développé. Plus tard quand l'herbe est plus haute et touffue, le chapeau est plus petit et le pied par contre très développé.

M. le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL dépouille la correspondance et analyse les publications reçues.

A propos d'une communication présentée à la Société botanique de France par M. Chabert, sur les acclimatations voulues de plantes dans la région de Chambéry, une discussion s'engage entre MM. Saint-Lager, Viviant-Morel et Roux. Nos confrères signalent de nombreux cas d'apparition de nouvelles espèces pour une flore donnée, sans qu'on puisse incriminer la bonne foi de personne.

M. VIVIAND-MOREL insiste plus particulièrement sur la difficulté que l'on a à acclimater des espèces nouvelles. Il rappelle les essais infructueux qu'il a faits, notamment celui d'introduire un *Paeonia* dans le Mont-d'Or lyonnais.

SÉANCE DU 28 MAI 1907

PRÉSIDENCE DE M. VIVIAND-MOREL.

ADMISSION

M. Hippolyte DUVAL, professeur au Lycée Saint-Rambert, 13, rue Vaubecour, présenté à la précédente séance par MM. Viviant-Morel et D^r Blanc est admis membre titulaire de la Société.

COMMUNICATIONS.

M. le D^r RIEL présente les champignons suivants : *Diatrype disciformis*, *Puccinia caricis*, *Puccinia phragmitis*, *Polyporus squamosus*, *Morchella rigida*.

M. BRETIN expose qu'il a planté en septembre 1905 un pied de *Rosa spinosissima* provenant de Bretagne qui lui avait été remis comme à fleurs rouges et qui a fleuri cette année avec des corolles entièrement blanches. Il demande s'il faut croire à

une erreur de la personne qui a recueilli ce rosier, ou si le changement de climat a pu amener cette modification de couleur.

M. VIVIAND-MOREL ne croit pas que l'influence du climat ait pu changer la fleur primitivement rouge en une fleur blanche. Il croit plutôt qu'il s'agissait d'une race à fleur normalement blanche qui avait échappé à l'observation.

M. F. MOREL cite le cas du *Saxifraga coespitosa* à fleurs roses, provenant d'Orléans, et qui a fleuri à Lyon entièrement blanc. Il attribue cette variation à l'influence du sol, ainsi d'ailleurs que le fait a été constaté pour les hortensias bleus.

M. NIS. ROUX présente les espèces suivantes : *Fumaria parviflora*, *Mercurialis annua*, *Oxalis stricta*, *Centaurea montana* et *lugdunensis*, *Geranium sanguineum*, *Phalangium liliago*, *Allium Moly*, *A. Neapolitanum*, *Horminum pyrenaicum*, *Salvia officinalis*.

A propos de cette dernière espèce, M. Viviani-Morel fait remarquer que dans tous les jardins où on la cultive, ce n'est pas le vrai *Salvia officinalis*, mais plutôt le *S. cretica*. Les paysans appellent la véritable sauge officinale : Petite sauge.

M. NIS. ROUX présente ensuite les plantes suivantes en échantillons d'herbier : *Cystopteris fragilis* en deux formes. *Polygala alpina*, *Filago neglecta*, *Aster brumalis*, *Galium dumetorum*, *Lychnis pyrenaica*, *Silene hispida*, *Alsine cerasitifolia*, *Daphne Verloti*, *Thesium humile*, *Th. humifusum*, *Glyceria Borreri*, etc.

M. F. MOREL signale une très abondante station de *Daphné Cneorum* au dessous du viaduc de Cize-Bolozon.
