

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE LYON

Paraissant tous les trois mois

TOME XXXII (1907)

NOTES ET MÉMOIRES

COMPTES RENDUS DES SÉANCES

1-2 1907



SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

1, PLACE D'ALBON, 1

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38.

1907



SÉANCE DU 9 JUILLET 1907

PRÉSIDENCE DE M. VIVIAND-MOREL.

M. Cl. Roux présente et analyse un mémoire de M. d'Alverny, sur les hautes chaumes du Forez ; la flore de Pierre-sur-Haute y est étudiée par associations : la lande, la tourbière, etc.

M. Cl. Roux présente une notice biographique de Dechamps, botaniste. (Voir aux *Notes et Mémoires*.)

Sur la demande de M. Nis. Roux, il fait connaître que l'herbier Dechamps est aux mains de la Société des Sciences et Arts de Tournus.

A propos du Pin à crochets, signalé à Pierre-sur-Haute par M. d'Alverny, M. F. MOREL rappelle qu'il a été trouvé lors de notre dernière herborisation au Pilat dans les rochers de l'Œillon où il a l'air spontané. Toutefois, c'est souvent une espèce semée par les forestiers.

M. Cl. Roux fait remarquer que le boisement de Pierre-sur-Haute est naturel et non artificiel.

M. Nis. Roux signale aux environs de Thoissey des *Primula officinalis* à fleurs violet pâle.

Il présente ensuite les plantes suivantes provenant de Gap :

Anemone Halleri.
Globularia cordifolia.
Leuzea conifera.
Ononis cenisia.
Cytisus sessilifolius.
— alpinus.
Astragalus incanus.
Ranunculus gramineus.
Allium ursinum.

Ribes alpinum.
Anemone alpina.
Crocus vernus.
Valeriana dioeca.
Senecio doronicum.
Salix repens.
Narcissus poeticus.
Gentiana Kochiana.
Primula farinosa.

<i>Gentiana angustifolia.</i>	<i>Muscari comosum.</i>
<i>Berberis vulgaris.</i>	<i>Pulmonaria azurea.</i>
<i>Paronychia capitata.</i>	<i>Symphytum tuberosum.</i>
<i>Salix incana.</i>	<i>Erysimum helveticum.</i>
<i>Phalangium liliago.</i>	<i>Pedicularis comosa.</i>
<i>Bulbocodium vernum.</i>	<i>Astragalus onobrychis.</i>
<i>Plantago argentea.</i>	

et les espèces suivantes provenant d'Algérie et de Tunisie :

<i>Convolvulus tricolor.</i>	<i>Ceterach officinarum.</i>
<i>Viburnum Tinus.</i>	<i>Selaginella denticulata.</i>
<i>Silene gallica.</i>	<i>Juniperus phœnicea.</i>

M. DUVAL présente un pied de *Daucus Carota* ayant poussé sous les sapins du parc du lycée de Saint-Rambert; l'involucre et les involucrelles sont plus grands que les rayons de l'ombelle et des ombellules, l'ombelle est acaule, les feuilles étalées sur le sol et les fruits sont avortés.

SÉANCE DU 23 JUILLET 1907

PRÉSIDENCE DE M. VIVIAND-MOREL.

M. le D^r RIEL présente les champignons suivants sur lesquels il donne d'intéressants détails :

Oidium erysiphoides, provenant des cultures de M. F. Morel.
Pholiota mutabilis, *Lentinus tigrinus*.

M. MEYRAN montre le *Paxillus atrotomentosus*, provenant de Saint-Appollinaire (Rhône).

M. VIVIAND-MOREL montre les espèces suivantes en fleurs :

Thymus hybride entre le *T. mastichina* et le *T. vulgaris*,
Lavandula latifolia et *angustifolia*. Il insiste sur les caractères qui permettent de distinguer les deux espèces. *Daphne*

Verloti, *Lactuca Chaixii*, *Artemisia austriaca*, *Achillea ageratum*, *Teucrium polium*, *T. flavum*, *Gentiana septemfida*, *Achillea lanata*, etc.

M. N. Roux présente le *Digitalis purpurascens* des environs d'Yzeron, ainsi que ses deux parents : *D. purpurea* et *D. parviflora*.

M. VIVIAND-MOREL fait remarquer, à propos de cet hybride, qu'on peut reconnaître la mère à ce fait que c'est elle qui donne les caractères végétatifs.

M. N. Roux montre ensuite un certain nombre d'espèces qu'il a récoltées au Mézenc. Ce sont :

Orchis viridis, *Antennaria dioeca*, *Pulsatilla vernalis*, *Geum rivale*, *Menyanthes trifoliata*, *Sarothamnus purgans*, *Luzula spicata*, *Petasites albus*, *Sorbus aucuparia*, *Viola palustris*, *Saxifraga hypnoides*, *Salix repens*, *Biscutella arvernensis*, *Vaccinium rubrum*, *Arbutus urva-ursi*, *Vaccinium myrtillus*, *Saxifraga stellaris*, *Trollius europaeus*, *Tulipa celsiana*, *Meum athamanticum*, etc.

M. le D^r BLANC propose que l'on s'entende avec le Syndicat des horticulteurs qui nous loue notre salle, afin qu'il nous permette d'aménager et de fermer la moitié du placard pour y loger le fonds Debat.

Après discussion, la Société se rallie à cette proposition.

M. le D^r Blanc montre une galle du *Papaver dubium* produite par un Cynips, l'*Aulax papaveris*. Ces échantillons ont été envoyés par notre collègue, M. Richard.

Il rappelle à ce sujet que seuls les *Papaver Rheas* et *dubium* présentent des galles et que ces galles sont les mêmes sur les deux espèces. Les autres *Papaver* n'en montrent pas.

A ce sujet, M. VIVIAND-MOREL rappelle que les Roses moussues sont des productions tératologiques dues à une déformation produite primitivement par la piqure d'un insecte, et fixées par la culture. Il est probable qu'un certain nombre de variétés horticoles ont une origine analogue.