

BULLETIN
DE LA
SOCIÉTÉ BOTANIQUE
DE LYON

COMPTES RENDUS DES SÉANCES

SECONDE SÉRIE

II

1884



SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
AU PALAIS-DES-ARTS, PLACE DES TERREAUX

GEORG, Libraire, rue de la République, 65.

1884

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1884.

PRÉSIDENTENCE DE M. SARGNON

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. THERRY fait part du décès de M. Dailly, un des membres fondateurs de notre Société. M. Dailly était dessinateur pour les étoffes de soie et avait acquis une grande habileté dans le dessin des plantes. C'est à ce titre qu'il s'intéressait vivement à nos travaux.

COMMUNICATIONS.

M. VUILLIOT rend compte d'une excursion qu'il a faite le matin même dans les serres de la ville de Lyon. Il a récolté 11 espèces dont 6 Agarics, 3 Polypores, 1 Auriculariée, 1 Hyphomycète, savoir : *Collybia semitalis*, *Pleurotus ostreatus* (flétri), *Galera tenera*, *Hypholoma appendiculatum*, *Psathyrella disseminata*, *Coprinus micaceus*, *Polyporus versicolor*, *Polyp. medulla panis*? *Fomes conchatus*, *Corticium*..., *Ozonium auricomum*.

M. Vuilliot met en regard du *C. semitalis* les dessins d'un autre *C. semitalis* récolté en Bourgogne au mois de septembre ; ce sont pour lui deux espèces distinctes ; les spores sont très différentes, en forme de pépin dans le premier, rondes dans le second. La chair et les lames de celui-ci noircissent, l'autre reste immaculé, son pied seul est brun à la base. Ces deux espèces seront l'objet d'un nouvel examen.

Quant à l'*Ozonium*, M. Vuilliot rappelle que certains observateurs l'ont signalé comme étant la phase première d'un Coprin (*Coprinus stercorarius*). Dans des récoltes précédentes, il a trouvé, au voisinage de cet *Hyphomycète*, des Coprins, mais n'ayant aucune connexion avec lui.

M. THERRY pense qu'on ne peut pas rattacher les Coprins à l'*Ozonium* ; M. Vuilliot déclare n'avoir rien observé qui permette ce rapprochement.

Les espèces mentionnées ci-dessus ont été récoltées : les Agarics sur la tannée et la terre (moins le *Pleurotus ostreatus* déve-

loppé dans une bille de Peuplier servant de support), les autres Champignons sur des billes d'Ormes ou de Saules.

M. DEBAT lit la note suivante sur une *Mousse nouvelle pour le bassin du Rhône*.

L'espèce que je présente m'a été envoyée par M. Guinet et a été trouvée dans les environs de Genève sur des pierres au bord du Rhône, par M. Rome, qui crut, à tort, y reconnaître le *Zygodon Nowellii*. Examen fait, je retrouvai cette Mousse dans mon herbier sous les deux rubriques suivantes : *Didymodon sinuosus*, *Barbula sinuosa*. C'est sous le premier nom qu'elle a été décrite dans le *Synopsis* et indiquée en Angleterre. Plus tard elle fut rattachée aux *Barbula*. M. Gravet la découvrit, pour la première fois, sur le continent en Belgique ; un peu plus tard M. Cardot la signala dans les environs de Stenay (Meuse). Bien que la station indiquée par M. Rome ne soit peut-être pas française, elle est cependant très rapprochée de nos limites et comprise dans le bassin du Rhône. Les Bryologues ne sont pas d'accord sur la valeur spécifique de ce *Barbula*. Juratzka et d'autres y ont vu une variété intéressante de *Barb. cylindrica*. C'est aussi l'opinion exprimée par M. Boulay dans son récent ouvrage : *Les Muscinées de France*. La Mousse se montre toujours stérile. En l'examinant avec soin, j'ai aperçu à côté des fleurs femelles bien développées des fleurs avortées que je soupçonne appartenir au sexe mâle. La stérilité pourrait donc être due à des causes spéciales, puisque la Mousse serait monœque. Mais j'avoue concevoir encore de nombreux doutes. Je me borne à insister sur l'importance de la découverte de M. Rome et à remercier mon aimable correspondant, M. Guinet, du zèle qu'il met à me transmettre ses intéressantes trouvailles.

Le Secrétaire,
J. NICOLAS.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1884.

PRÉSIDENCE DE M. SARGNON.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

COMMUNICATIONS.

M. DEBAT fait le compte rendu d'un article publié par M. Philibert dans le tome XI, nos 4 et 5 de la *Revue bryologique*, sous