



ANNALES
DE LA
SOCIÉTÉ BOTANIQUE
DE LYON

Paraissant tous les trois mois

TOME XXVIII (1903)

NOTES ET MÉMOIRES



SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
AU PALAIS-DES-ARTS, PLACE DES TERREAUX

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38.

1903

séances de la session tenue à Montauban au mois de septembre 1902 par l'Association française pour l'avancement des sciences, un mémoire concernant l'histoire botanique de l'arbre appelé par les Grecs *Agallochon*, par les Hébreux *Ahalot*, et dont le bois était employé pour les fumigations aromatiques dans les temples ainsi que pour l'embaumement des cadavres.

Par une inadvertance que M. Paul Vignon, auteur d'un récent ouvrage sur « le Linceul du Christ » doit déplorer plus qu'aucun autre, les grammairiens qui ont traduit en grec puis en latin la Bible et les Evangiles ont écrit *Aloe* au lieu de *Ahalot* ou de son synonyme grec *Agallochon*.

En terminant sa lettre M. L. Braemer se plaît à constater que sur cette question il est en parfait accord avec notre collègue M. Saint-Lager.

M. L. Blanc présente des Oranges contenant à l'intérieur des oranges rudimentaires. Cette sorte de prolifération se produit plus fréquemment chez les Oranges appelées sanguines à cause de leur couleur rouge.

SÉANCE DU 24 FÉVRIER 1903

PRÉSIDENCE DE M. P. PRUDENT.

La Société a reçu :

Odessa : Club alpin de Crimée ; Bull. 1903, 1-3. — Firenze : Soc. botan. ital. *Bulletino* 1903, 1-3 ; *Nuovo Giornale botan.* X, 2. — New-York : Torrey botan. Club ; Bull. XXX, 1-2. — Marseille : Soc. hort., bot. ; *Revue d'hortic.* XLIX, 582-583. — Dr Gillot : *Race alpine de Carduus nutans* ; *Suc des Champignons comme Antidote, Alchimilla Marceillouorum*, *Excursion au Parc de Baleine, Excursion à Alise Sainte-Renne et à Flavigny*.

COMMUNICATIONS.

M. O. MEYRAN donne un compte rendu des « Notes floristiques sur la chaîne des Aravis et les environs de la Clusaz (Haute-Savoie) » publiées par M. E. G. Camus dans le n° 4-1902 de la *Revue savoisienne* (29 pages avec 2 planches et 1 carte).

La chaîne des Aravis, située près du village de la Clusaz, s'étend du Sud-Ouest au Nord-Est sur une longueur de plus de 35 kilomètres et présente une succession de crêtes déchiquetées dont la hauteur s'élève de 2000 m. à 2750 mètres. Son ossature est constituée par une série de terrains appartenant, à la base, au jurassique moyen et supérieur, puis vers les sommets aux étages crétacés (néocomien, urgonien) alternant avec les strates tertiaires du flysch.

M. Camus énumère les nombreuses espèces qu'il a observées au cours de six excursions et dont il donne, à la fin de son Mémoire, la liste avec l'indication précise des localités. Un chapitre spécial est consacré aux *Cirsium* hybrides qu'il a récoltés, notamment : *Cirsium oleraceum* $\times$ *acaule* et *acaule* $\times$ *oleraceum* qu'on réunit sous la dénomination de *Cirsium rigens*, puis *C. erysilhales* $\times$ *acaule* et *C. erysilhales* $\times$ *rivulare*. Ces deux derniers *Cirsium* sont représentés en deux grandes et belles planches. Les botanistes qui désirent explorer cet intéressant pays auront grand profit à consulter les « Notes floristiques » de M. E.-G. Camus.

M. SAINT-LAGER donne connaissance d'une Note de notre collègue, M. Edm. Bonnet sur « quelques plantes trouvées dans les nécropoles d'Antinoé ». Les tombes fouillées sous la direction de M. Gayet ne remontent pas, comme beaucoup d'autres, à une antiquité reculée. Deux sont du III^e siècle, une autre du IV^e siècle de l'ère chrétienne, mais elles offrent un intérêt spécial parce qu'elles nous fournissent des renseignements précis sur un usage consistant à entourer la tête des momies d'une couronne de fleurs mêlées à des feuilles de Cédratier, de Dattier, d'Olivier, de Vigne et à des chaumes de Graminées. Une de ces momies, celle de Thaïs, portait, en outre, sur la poitrine un bouquet d'Immortelle (*Helichrysum luteoalbum*) et dans la main une Rose de Jéricho (*Anastatica hierochuntica*). Le reste du corps était entouré de feuilles de Dattier artistement entrelacées.

Dans une seconde Note, M. Em. Bonnet énumère 27 espèces qui n'avaient pas encore été signalées au Maroc et qui (avec 103 autres déjà indiquées) ont été rapportées en 1901 de ce pays par M. R. de Segonzac, officier de Spahis.

Sur ces 27 espèces, 16 sont plus ou moins répandues dans les

autres régions du bassin méditerranéen, 6 habitent l'Algérie et la Tunisie, 4 sont spéciales à la péninsule ibérique, enfin une dernière, *Astragalus Boissieri*, est localisée dans quelques parties des montagnes de l'Espagne, de la Sicile et au mont Parnasse de la Grèce.

En raison des difficultés qu'ont les Européens à voyager dans l'Empire Marocain, à cause de la méfiance et du fanatisme des populations qui l'habitent, on ne peut que féliciter M. de Se-gonzac pour l'importante contribution qu'il a apportée à l'histoire naturelle et à la géographie de ce pays inhospitalier, sans cesse agité par des discordes intestines.

M. le D^r L. BLANC montre, au moyen de projections lumineuses, une collection de coupes de divers bois. Ces coupes ont été préparées par M. Prudent.

SÉANCE DU 10 MARS 1903

PRÉSIDENCE DE M. BERTIN.

La Société a reçu :

Malpighia, XVII, 1-3. — New-York : Torrey botan. Club ; Bull. XXX, 1-3. — Limoges : Soc. botan. ; Revue scient. XI, 121-133. — Chalon-s-S. : Soc. sc. natur. ; Bull. IX, 1-3. — Paris : Soc. mycologique Fr. ; Bull. XIX, 1-3. — Annecy : Soc. florimontane ; Revue Savoie. XLIV, 1.

COMMUNICATIONS.

M. NIS. ROUX montre des spécimens de plusieurs espèces distribuées cette année par l'Association pyrénéenne pour l'échange des plantes ; les plus remarquables sont les suivantes :

Iris lutescens, *Colchicum neapolitanum*, *Narcissus biflorus*, *Fritillaria involucrata*, *Allium neapolitanum*, *Ophrys lutea*, *Orchis coriophorus*, *Dioscorida pyrenaica*, *Salicornia radicans*, *Amarantus patulus*, *Plantago Wulfeni*, *Nepeta latifolia*, Pri-