



ANNALES
DE LA
SOCIÉTÉ BOTANIQUE
DE LYON

Paraissant tous les trois mois

TOME XXVIII (1903)

NOTES ET MÉMOIRES



SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
AU PALAIS-DES-ARTS, PLACE DES TERREUX

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38.

1903

autres régions du bassin méditerranéen, 6 habitent l'Algérie et la Tunisie, 4 sont spéciales à la péninsule ibérique, enfin une dernière, *Astragalus Boissieri*, est localisée dans quelques parties des montagnes de l'Espagne, de la Sicile et au mont Parnasse de la Grèce.

En raison des difficultés qu'ont les Européens à voyager dans l'Empire Marocain, à cause de la méfiance et du fanatisme des populations qui l'habitent, on ne peut que féliciter M. de Segonzac pour l'importante contribution qu'il a apportée à l'histoire naturelle et à la géographie de ce pays inhospitalier, sans cesse agité par des discordes intestines.

M. le D^r L. BLANC montre, au moyen de projections lumineuses, une collection de coupes de divers bois. Ces coupes ont été préparées par M. Prudent.

SÉANCE DU 10 MARS 1903

PRÉSIDENCE DE M. BERTIN.

La Société a reçu :

Malpighia, XVII, 1-3. — New-York : Torrey botan. Club ; Bull. XXX, 1-3. — Limoges : Soc. botan. ; Revue scient. XI, 121-133. — Chalon-s-S. : Soc. sc. natur. ; Bull. IX, 1-3. — Paris : Soc. mycologique Fr. ; Bull. XIX, 1-3. — Annecy : Soc. florimontane ; Revue Savoie. XLIV, 1.

COMMUNICATIONS.

M. NIS. ROUX montre des spécimens de plusieurs espèces distribuées cette année par l'Association pyrénéenne pour l'échange des plantes ; les plus remarquables sont les suivantes :

Iris lutescens, *Colchicum neapolitanum*, *Narcissus biflorus*, *Fritillaria involucrata*, *Allium neapolitanum*, *Ophrys lutea*, *Orchis coriophorus*, *Dioscorida pyrenaica*, *Salicornia radicans*, *Amarantus patulus*, *Plantago Wulfeni*, *Nepeta latifolia*, Pri-

mula viscosa, Erythraea littoralis, Echium pustulatum, Pirola media, Erica Watsoni, Fragaria collina, Aronia rotundifolia, Geranium argenteum, Alchimilla microcarpa, Dianthus subcaulis, D. atrorubens, D. brachyanthus, Lychnis laeta, Silene campanula, Alsine glandulosa (Bauhinorum), Spergularia macrorrhiza, Acer Martini.

M. SAINT-LAGER rappelle, à propos de l'Érable de Martin, que lorsqu'il eut examiné attentivement un grand nombre de rameaux rapportés des environs de Moutiers (Savoie) par notre collègue M. G. Coutagne, et remarqué l'extrême variabilité de la forme des feuilles de ces rameaux dont quelques-uns avaient été coupés sur le même arbre, il conjectura que les botanistes qui seraient informés de ce polymorphisme foliaire constateraient l'existence de la variation appelée par Jordan *Acer Martini*, dans la plupart des localités où croît l'Érable de Montpellier. Cette prévision a reçu dernièrement un commencement de réalisation.

M. Gust. Cabanès a trouvé entre Junas et Aubais (Gard) des Erables portant sur le même arbre, quelquefois sur le même rameau, des feuilles trilobées sans aucune dentelure marginale, des feuilles à trois lobes plus ou moins profondément dentés et quelques feuilles à cinq lobes inégaux et dentés (Bull. Soc. d'étude des sc. natur. de Nîmes XXIX, p. 33-35).

C'est en 1852 que Jordan a décrit dans le Pugillus son *Acer Martini*. Il a donc fallu attendre un demi-siècle pour qu'on reconnaisse enfin que cette prétendue espèce est simplement un cas, à joindre à tant d'autres, du polymorphisme des feuilles d'un arbre.

M. VIVIAND-MOREL montre une curieuse fasciation d'un rameau de *Fraxinus oxyphylla* provenant des environs de Marseille.

M. le Dr L. BLANC présente des Citrons multicornus cueillis dans les îles d'Hyères.

M. VIVIAND-MOREL dit que ce cas tératologique est connu depuis longtemps, car il a été figuré dans l'Histoire des Oranges, publiée par Ferrari en 1646.

M. NIS. ROUX présente les deux premiers fascicules d'une « Revue de botanique systématique et de géographie botanique » publiée par M. G. Rouy.