

BULLETIN BI-MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

Abonnement
annuel } 10 francs.SIÈGE SOCIAL A LYON :
33, Rue Bossuet (Immeuble Municipal)

1753 MEMBRES

MULTA PAUCIS

Chèques Postaux
c/c Lyon, 101-98**PARTIE ADMINISTRATIVE****ORDRE DU JOUR**

DE LA

Séance générale du Lundi 12 Mars 1923, à 20 heures**1^o Vote sur la candidature de :**

MM. Hassler, Ducarre, Bérard, Romanetto, Duray, Montet, Perret-Valorge, Chevalier et de M. Grosel (Jos.), 15, rue Burdeau Lyon, parrains MM. Bonnamour et Nicod. — M. Casanove (F. de), professeur au Lycée de Brest (Finistère). — M. Guillon (Jean-Baptiste), gardien de la paix, 97, rue Molière, Lyon, parrains MM. Ravinet et Nicod. — M. Vacher de Lapouge (D^r), bibliothécaire à l'Université, 18, quai Claude-Bernard, Lyon, *Physiologie*, parrains MM. Couvreur et Nobécourt. — M. Glick (Perry A.), Research Entomologist, Post office box 348, Phoenix, Arizona (U. S. A.), *Lépidoptères*, parrains MM. Clerc et Riel. — M. Tompkins de Garnett (Richard), 583, Merrimac Street, Oakland, California (U. S. A.), *Coléoptères, spécialement Cicindélides, Carabiques, Buprestides, Cérambycides et Scarabaeides*. — M. Frison (D^r René), Rouillé (Vienne), *Botanique*, parrains MM. Riel et Pétrequin. — M. Léorat (D^r Gaston), 7, rue de Tournon, Annonay (Ardèche). — M. Nicolas (Albert), directeur d'Ecole, Saint-Vallier (Drôme), parrains MM. Damians et Riel. — M. Porter (Prof. D^r Carlos E.), Casilla 2974, Santiago (Chili), parrains MM. Brèthes et Riel. — M. Finet (Eugène), pharmacien, place d'Armes, Romans (Drôme). — M. Gaudet (Joseph), pharmacien, Viriville (Isère), parrains MM. Riel et Nicod.

Bibliographie

Boletín de la Real Sociedad Española de Historia natural, t. XXIII, 1923, n^o 1. — BLÜTHGEN, Nota sobre *Haliictus* de Canarias y España (Hym. Apidae). — FERNANDEZ, Acerca de ciertas novedades entomológicas de España (*Arctia fasciata* Esp. var. *tetrasticha* Navas et *Zyguend fausta* v. *lata*. — RIOJA, Nota sobre algunas especies de los generos *Folliculina* y *Trichodina* de la ría de Pontevedra, 2 fig. (*Folliculina atropurpurea* Wright et *F. elegans* Cl. y L.). — CABRERA, Sobre algunas formas del género *Mustela* (fig. des caractères des *M. erminea*, *numidica* et *nivalis*. — LUELMO, Algunas observaciones sobre el aparato de Golgi en la plantula del garbanzo (1 pl.). — M. DE LA ESCALERA, Sistema de las species del género *Asida* de la Peninsula Ibérica (subgen. *Glabrasida* Esc., sec. IV: cost., 10 sp., 1 var. nov.). — JIMÉNEZ DE CISNEROS, El gran depósito de fósiles liásicos del cerro de la Campana (1 fig. *Terebratula mariae* d'Orb. et *Rhynchonella plicatissima* Quenst. — CEBALLOS, Notas sobre Icnemónidos exóticos. 1. Consideraciones sobre la nueva familia *Labenidae* Viereck. — GARCIA-MERCET, Adiciones a la fauna española de *Encerlidos* (2a nota). Descriptions de *Trichomasthus Cæruleus* n. sp. *T. cyanifrons* Dalm., *Copidosoma brevicauda* n. sp. (fig. ♀), *C. montanum* Mercet, var. *minor* nov.). L'auteur donne les caractères distinctifs comparés de *Copidosoma coleophoræ*, *C. castellanum*, *C. peninsulare*, *C. incertum*, *C. flagellare*, *C. buyssonii*, *C. brevicauda*. — BOLIVAR Y PIETAIN, Description de la larva de un Trechini marino (*Epopsis Robini* Laboulb., 2 fig.).

PH. R.

Bibliographie lépidoptérologique

SAMSON, *Lycena thersites* (Soc. lep. de Genève. V, fasc. 1, nov. 1922). — Les exemplaires, qui ont servi de base à ce travail, ont été récoltés au Mont-Thou, près de Lyon, au mois de mai et août 1908, 1909, 1913, 1914, 1915. La première génération de *thersites* étant plus précoce que celle de *Icarus*, il est facile de s'en procurer en nombre des échantillons authentiques. Ce qui a permis à M. SAMSON de constater que le mâle est bleu violacé, légèrement plus violacé qu'*icarus* et aussi que le caractère le plus constant de *thersites* consiste dans la disposition des deux derniers petits points de la série des ailes antérieures en dessous, qui sont presque toujours l'un audessus de l'autre; quelquefois même, le dernier est plus en dedans. Quant au deuxième point noir du dessous des ailes inférieures, il est, généralement plus rapproché de la seconde tache marginale fauve que dans *icarus*, mais M. SAMSON considère ce caractère comme n'étant pas absolu. Dans la première génération, le fond du dessous des mâles est d'un gris sale uniforme, la base des ailes postérieures est saupoudrée d'écailles bleu-verdâtre assombries par des écailles noires; de même aux antérieures, mais d'une manière moins prononcée. Dans la deuxième génération, le dessous des ailes chez les mâles, est d'un gris plus pur et le semis d'écailles bleu-verdâtre est moins développé.

PH. R.