

BULLETIN BI-MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

Secrétaire gén. : M. P. NICOD, 122, r. St-Georges ; Trésorier : M. F. RAVINET, 11, r. Franklin

Abonnement annuel } 10 francs.	SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, Rue Bossuet (Immeuble Municipal)
2583 MEMBRES	MULTA PAUCIS Chèques Postaux c/c Lyon, 101-98

PARTIE ADMINISTRATIVE

Le « Bulletin » ne paraît pas en Juillet et Août.

Admissions*Ont été admis à la séance du 8 juin :*

M^{mes} Alabernarde, Berger, MM. Rocher, Delfour, Sagnard, Collegium Medicum de Poznan, MM. Jouffray, Tournier, de Bussac, Collin, Bridier, Faure, Vouk, M^{me} Szalanska, MM. Liberak, Minkiewicz, l'Institut national d'Economie rurale de Pulawy, MM. Lion, Loup.

ORDRE DU JOUR

DE LA

Séance générale du Lundi 22 Juin 1925, à 17 heures

1^o *Vote sur l'admission des candidats présentés à la séance du 8 juin auxquels sont ajoutés :*

M^{lle} Morel (Berthe), 7, rue Henri IV, Lyon, parrains MM. Josserand et Thiébaud. — M. Mérit, 45, boulevard Emile-Zola, Oullins (Rhône), parrains MM. Ravinet et Nicod. — M. Bost (Francisque), pharmacien, 160, rue Nationale, Villefranche (Rhône). — M. Callandras, rue d'Alger, Villefranche. — M. Canet (Francisque), légiste, 44, rue de Thizy, Villefranche. — M. Duboule (Georges), restaurant Rollet, 44, rue Paul-Bert, Villefranche. — M. Houny (Rubens), professeur au Collège Claude-Bernard, 2, rue d'Anse, Villefranche. — M. Mercier (Jean), directeur de la tuilerie de la Chartonnière, Gleizé (Rhône), parrains MM. A. Vicard et Boccard. — M^{me} Pellorce, 51, chemin de la Colombière, Lyon, parrains MM. Bacqué et Pouchet.

PARTIE SCIENTIFIQUE

Liste de divers Hyménoptères parasites et de leurs hôtes
observés au cours de l'année 1921 aux environs de Belgrade (Serbie) ^{1 2}

par P. VOJKASSOVITCH

Nom du parasite	Hôtes parasités	Remarques
I. ICHNEUMONIDÆ :		
1. <i>Anilastus ebeninus</i> Thoms.	<i>Pieris brassicæ</i> L. (Les chenilles.)	Assez commun.
2. <i>Bassus lactatorius</i> F.	Plusieurs espèces de <i>Syrphides</i> . (Les larves.)	Le plus fréquent parmi les trois espèces.
3. <i>Promethes pulchellus</i> Holmgr.	— — —	Parasites des <i>Syrphides</i> .
4. <i>Homotropus tarsatorius</i> Panz.	— — —	
II. BRACONIDÆ :		
5. <i>Aphidius rosæ</i> Hal.	Pucerons du Rosier.	Fréquent.
6. — <i>cardui</i> Marsh.	(Pucerons du <i>Chenopodium</i> .)	Très fréquent.
7. <i>Apanteles glomeratus</i> L.	<i>Pieris brassicæ</i> L. (Les chenilles.)	Très rare.
8. — <i>spurius</i> .	<i>Aporia cratægi</i> L. (Les chenilles.)	Très fréquent.
III. CHALCIDIDÆ :		
9. <i>Pachyneuron aphidis</i> Bouché.	Plusieurs espèces du genre <i>Praon</i> et <i>Aphidius</i> . (Les larves et les nymphes.)	Fréquent.
10. <i>Encyrtus æruginosus</i> Dalm.	Plusieurs espèces de <i>Syrphides</i> . (Les larves.)	Il fut obtenu des pupes de <i>syrphides</i> , mais il est possible qu'il soit hyperparasite des mêmes.
11. <i>Tetrastichus vinulæ</i> Ratz.	<i>Anilastus ebeninus</i> ; <i>Apanteles glomeratus</i> . (Les larves)	Fréquent.
12. <i>Pteromalus puparum</i> L.	<i>Pieris brassicæ</i> L. (Les chrysalides.)	Très fréquent. Dans certains endroits 98 % de chrysalides de <i>P. brassicæ</i> furent parasitées.
13. <i>Asaphes vulgaris</i> Walk.	Plusieurs espèces du genre <i>Praon</i> et <i>Aphidius</i> . (<i>A. rosæ</i> ; <i>A. cardui</i> , etc. (Les larves.)	Assez fréquent.
14. <i>Trichogramma evanescens</i> Wstw.	<i>Pieris brassicæ</i> L. ; plusieurs espèces de <i>Syrphides</i> . (Les œufs.)	
IV. PROCTOTRUPIDÆ :		
15. <i>Synopeas rhanis</i> Walk.	<i>Isobremia Kiefferi</i> n. sp. (Les larves.)	
16. <i>Diapria conica</i> F.	<i>Eristalis tenax</i> . (Les larves.)	Fréquent.
17. <i>Trissoleus simoni</i> Mayr.	<i>Eurydema ornatum</i> L. (Les œufs)	Fréquent.
18. <i>Lygocerus testaceimanus</i> Kieff.	Plusieurs espèces du genre <i>Praon</i> et <i>Aphidius</i> .	Assez fréquent.
V. CYNIPIDÆ :		
19. <i>Allotria victrix</i> Wstw.	Plusieurs espèces d' <i>Aphidius</i> . (?)	Rare.

(Laboratoire de l'Institut entomologique de l'Université de Belgrade.)

¹ Les parasites observés ont été obtenus par des élevages artificiels des hôtes parasites.

² Les insectes cités dans cette liste ont été vus et déterminés par M. Ferrière, que je remercie vivement.