

BULLETIN BI-MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

Secrétaire gen. : M. P. NICOD, 122, r. St-Georges ; Trésorier : M. F. RAVINET, 11, r. Franklin

Abonnement annuel	} France et Colonies fr ^{es} Etranger	10 fr.
		15 fr.

SIÈGE SOCIAL A LYON :
33, Rue Bossuet (Immeuble Municipal)

2972 MEMBRES

MULTA PAUCIS

Chèques postaux
c/c Lyon, 101-98**PARTIE ADMINISTRATIVE****Admissions.***Ont été admis à la séance du 10 septembre :*

MM. Guinet, Trondle.

ORDRE DU JOUR

DE LA

Séance générale du Jeudi 26 Septembre 1929, à 17 heures.**1^o Vote sur l'admission des candidats présentés le 10 septembre auxquels est ajoutée :**M^{me} Vernay (Laurence), 5, impasse des Chartreux, Lyon, parrains MM. Riel et Ravinet.**2^o Présentation de :**M. Gusuleac, professeur à l'Université, Gradina Botanica, Cernauti (Roumanie), par M^{lle} Rayss et M. Riel. — M^{me} Juvantin, 1, rue Parmentier, Lyon (7^e), par MM. Gross et Pouchet. — M. Mille (Vincent), 27, rue Rachais, Lyon (7^e), par MM. Deschampt et Denaves. — M. Boutry (Charles), 10, rue Dumont, Lyon (4^e), par MM. Riel et Nicod. — M. Swingle (W. T.), Physiologist in charge of Crop Physiology and Breeding Investigations, Department of Agriculture, Washington, D. C. (U. S. A.), par MM. Reed et Riel.**SECTION BOTANIQUE**

Il n'y aura pas de séance en septembre.

A perdu, en dessus et en dessous, la presque totalité des écailles blanches luisantes caractéristiques du type de *proximus* Conte. Rayures des antérieures beaucoup plus étroites que dans ce dernier, l'externe à peine dissociée en segments internervuraux, l'interne sans rebroussement proximal. Ocelle grand, ovale, à longue pupille triangulaire occupant presque toute la longueur du grand axe de l'iris, qui est gris clair. Rayures abdominales beaucoup plus faibles que dans le type.

AUTOMERIS LEVRATI sp. nov. Un ♂ et une ♀ sans indication de provenance. Envergure du ♂ : 63 millimètres, de la ♀ : 74 millimètres.

Ressemble assez à *basilis* Walk. par la forme générale et l'apex non saillant des antérieures ; mais la rayure externe du dessus de ces dernières est beaucoup plus éloignée de l'apex, la submarginale des postérieures beaucoup plus large et séparée de l'externe par un filet rosâtre ; enfin, l'ocelle est tout autre avec sa pupille qui, chez la ♀, est vague et se perd dans l'iris qui se perd lui-même à son tour dans l'anneau noir, alors que la pupille du ♂ est nette et triangulaire.

Se rapproche davantage de *vinosus* Conte et de *nebulosus* Conte, surtout de la seconde espèce dont elle se distingue au premier abord par le filet rosâtre qui remplace, aux postérieures, le filet jaune ; se distingue également de la première par l'abdomen rosâtre, la rayure submarginale beaucoup plus large du dessus des postérieures et la coloration du dessus des antérieures qui est le chamois au lieu du gris.

Je rapporte à la même espèce une jolie ♀ provenant des parages de Rio Grande do Sul, Brésil.

Dédiée à M. LEVRAT, directeur du Laboratoire d'Etudes de la soie.

SECTION ENTOMOLOGIQUE

Séance du 3 Septembre

Note sur « *Ascalaphus ottomanus* », Germar (1817)

Insecte Névroptère-Planipenne

Par M. J.-L. LACHROIX

Cette espèce, peu commune, est l'*Ascalaphus lacteus*, Brullé (1832) dont le type, de Morée, se trouve au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. — BURMEISTER (1839), RAMBUR (1842), BRAUER (1856) et HAGEN (1860), l'ont nommée *lacteus*, Brullé.

RAMBUR (*Insectes Névroptères*, 1842), l'indique de la Grèce et de la Russie Méridionale. — VAN DER WEELE (*Collections zoologiques du baron de Selys-Longchamps, Ascalaphiden*, 1908), indique : « Italien ?, Dalmatien, Grichenland, Turkei, Sud-Russland und Pontien. » — Le même auteur (*Catalogue des Ascalaphides des Collections du Muséum de Paris*, in *Bull. du Muséum*, 1909, n° 4) indique : « Morée (*A. lacteus*, Brullé, type *A. BRULLÉ*) ; Mont Ventoux (Ch. ALLUAUD, 1906) ; Alpes Pontiques (DEYROLLES, 1869). » — Je l'ai indiquée du Mont Ventoux (*Faune des Planipennes de France. Ascalaphidae* ; in *Bull. Soc. d'Etude des Sc. Nat. d'Elbeuf*, 1922), d'après le Catalogue des Ascalaphides du Muséum, par V. D. WEELE. J'avoue que j'avais, à ce moment-là, quelques doutes au sujet de cette indication d'origine. — Le R. P. NAVAS (*Sinopsis de los Neuropteros de la peninsula iberica* ; in *Memorias de la Sociedad iberica de Ciencias Naturales*, 1924), ne l'indique pas d'Espagne.

J'ai, dans ma collection, deux exemplaires de *Ottomanus* : un ♂, Vallée de

la Vésubie, près de la frontière italienne, 1926 (*dedit* DES ABBAYES) ; une ♀, Saint-Martin-Vésubie, juillet 1910 (*dedit* G. DURAND). Cette espèce fait donc bien partie de la faune de France.

Insectes présentés.

Trechus cuniculorum Méquignon (col. Carabidae). — Cette espèce a été récemment (1921)* séparée de *Tr. quadristriatus* Schrank d'après des individus trouvés à Saint-Jean-des-Monts (Vendée), dans le sable de terriers de lapins, obturés par des touffes d'*Eryngium*. M. J. JACQUET présente deux exemplaires envoyés par M. TEMPÈRE de Bordeaux, qui a capturé l'espèce au Cap Ferret (Gironde), sous des couches un peu épaisses et humides d'aiguilles de pins maritimes. Cet entomologiste ne croit pas qu'elle soit habituellement inféodée aux terriers de lapins ; elle paraît propre au littoral maritime.

Bembidion (Peryplus) modestum F. — M. le Dr BONNAMOUR présente un individu de ce joli Carabide qu'il a capturé en mai 1929 à Vaulx-en-Velin (Rhône). C'est une espèce assez localisée dans le Centre et l'Est de la France et qui se prend rarement dans la région lyonnaise où elle paraît amenée par les inondations du Rhône.

BIBLIOGRAPHIE

Lépidoptères.

BOUVIER (E.-L.) et BRÈTHES (J.), Sur les « Heliconisa » et leurs différences sexuelles (*Revista de la Universidad de Buenos Aires*, 2^e serie, seccion V, tomo I, p. 37, novembre de 1924).

BOUVIER (Prof. E.-L.), *Heliconisa Bedoci* sp. n. (Saturnidae) (*Lepidoptera*, I, fasc. 1, 1^{er} VI 1925, Paris, Lechevalier, fig.).

BOUVIER (E.-L.), Sur la variabilité et les formes des « Bunaea » normaux (*Ann. des Sc. nat., Zool.*, 10^e série, t. IX, 1926, p. 307-337, 1 pl.) ; Sp. nov. : *Bunaea Oberthuri*, *B. Thoiri*.

BOUVIER (E.-L.), Etude sur les Cératocampidés de la collection Charles Oberthür (*Id.*, t. X, 1927, p. 233-288, 3 pl., 6 fig.). Sp. nov. : *Adelocephala brasiliensis*, *A. Hogeï meridionalis* nov. var., *A. brevis pallida* nov. var., *A. minuta*, *A. Catharina*, *A. apicalis*, *A. maroniana*, *A. acuta boliviana* nov. var., *A. polybioides*, *A. Breteuili*, *A. Cananche*, *A. Philipponi*, *Anisota formosa Oberthüri* nov. var., *Citheronia mexicana brasiliensis* nov. var. et *equatorialis* nov. var., *C. Brissoti meridionalis*, *guyanensis* et *centrali-americana* nn. vv.

BOUVIER (Prof. E.-L.), Saturniens du Musée du Congo Belge (*Revue Zoologique Africaine*, vol. XV, fasc. 2, 1927, p. 129-171, 6 fig.). Sp. nov. : *Pseudaphelia Karemii*, *P. Simplex margilutea* nov. var., *Gonimbrasia congolensis*, *Bunaea ferruginea*, *B. Jacksoni rosea* var. nov., *Nudaurelia rubra*, *Lobobunaea paratyrrhena*, *Imbrasia epimethea obscura convexa* et *truncata* nn. ssvar., *Cirina forda orientalis* nov. var., *Gynanisa maia nigra* nov. var., *Eudaemonia Colini*.

BOUVIER (E.-L.), Observations sur le classement et la structure des Saturniens d'Afrique (*Mémoires de l'Académie des Sciences*, t. LIX, 42 p., 15 fig.). Très important mémoire au point de vue de la classification générale des Saturnides. *Cometesia* gen. nov. (type *Mittrei*).

BOUVIER (Professeur E.-L.), Eastern Saturnidae with descriptions of new species (*Bull. Hill Museum*, vol. II, n° 2, 1928, p. 122-141, 6 pl.). Sp. nov. : *Opodiphthera Joiceyi*, *O. Talboti*, *O. intermedia*, *O. ceramensis*, *Syntherata*