

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
RÉUNIES

et de leurs GROUPES de ROANNE, VIENNE et VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Secrétaire général : M. le D^r BONNAMOUR, 49, avenue de Saxe ; Trésorier : M. P. GUILLEMOZ, 7, quai de Retz

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet (Immeuble Municipal)

ABONNEMENT ANNUEL	{	France et Colonies Françaises	15 francs
		Etranger.. . . .	20 —
2.397 Membres		MULTA PAUCIS	Chèques postaux c/c Lyon, 101-97

PARTIE ADMINISTRATIVE

ORDRES DU JOUR

Séance du Conseil d'administration du Mardi 12 Mars, à 20 h. 30

1^o Vote sur l'admission de :

M. Doneaud (Georges), 156, rue Vendôme, Lyon, parrains MM. Guillaud et Duroissay. — M. Dussert (Abel), professeur au lycée, directeur du Musée J.-B. Rames, Aurillac (Cantal), parrains MM. Riel et Guillemoz. — M. Leys, 49, boulevard Léopold, Gand (Belgique), parrains MM. Riel et Jacquet. — M. Maréchal, président de la Société d'Horticulture, Viticulture et Apiculture de Dôle, Azans par Dôle (Jura), parrains MM. Riel et Guillemoz. — M. Latte (Louis), 20, cours Morand, Lyon, parrains MM. L. Chrétien et L. Blandin. — M. Granjard (Henri), professeur au Lycée, Roanne (Loire), parrains MM. Combet et Larue. — M. Navel (A.), 55, rue de Trion, Lyon, parrains MM. Escalier et Josserand. — M. Muller (Victor), 1, rue Beaulieu, Riorges (Loire), parrains MM. Larue et Mury. — M. Brossard (René), 17, rue François-Badot, Toul (Meurthe-et-Moselle), *Stérophographie d'échantillons d'histoire naturelle*, parrains M^{lle} Albessard et M. Josserand. — Fan Memorial Institute of Biology, 3, Wen Tsin Chieh, Peiping (China). — M. Tarnogradsky (Prof. D. A.), 9, rue de Borodine, Orjani Ridsé (U. R. S. S.). *Biologie*. — M. Soyer (Bernard), professeur agrégé d'Histoire naturelle au Lycée, 2, avenue Félix-Faure, Nice (Alpes-Maritimes). *Biologie des Hyménoptères vespiformes*. — M. Patte (Etienne), professeur à la Faculté des Sciences, Poitiers (Vienne),

(8) MARTENS (P.) et CHAMBERS (R.). — Etudes de microdissection, les poils staminaux de *Tradescantia*. (*La Cellule*, XVI, fasc. 2, 1932).

(9) NEUMANN (H.). — Brownsche Molekularbewegung in Pflanzenreich (*Beih. Bot. Centr.*, 40, Abt. I, 1924).

(10) OSTERHOUDT (W. J. V.). — The permeability of protoplasm to ions and the theory of antagonism (*Science*, 35, 1912).

(11) OSTERHOUDT (W. J. V.). — The permeability of living cells to salts in pure and balanced solutions (*Science*, 34, 1911).

(12) RINGER (S.). — *Journal of physiology*, vol. III, p. 380-393 (1882) et vol. IV, p. 29-42 et 221-225 (1883).

(13) RUZICKA (V.). — Ueber tinktorielle Differenzen zwischen lebenden und abgestorbenen protoplasma (*Archiv. ges. Physiol.*, ch. VII, p. 437-531, 1905).

SECTION ENTOMOLOGIQUE

Séance du 20 Février.

Rectification

A la séance du 21 novembre 1934, le D^r E. ROMAN a présenté un exemplaire de *Dorytomus occalescens* Gyll (Col. Curculionides), capturé à Thil (Ain), lors de l'excursion entomologique de la Linnéenne du 22 mai 1932. Dans le compte rendu de cette sortie¹, cet Insecte avait été cité par erreur sous le de *D. affinis* Payk. Cette détermination, confirmée par M. A. HUSTACHE, le distingué spécialiste des Curculionides, révèle une espèce rare et intéressante pour la région lyonnaise. Toutefois, bien que non citée dans le Catalogue de GUILLEBEAU, il est peu probable qu'elle soit nouvelle pour le département ; suivant M. HUSTACHE², elle a été trouvée par ABEILLE au bord de la rivière d'Ain ; il serait extraordinaire que cette indication se rapporte à la partie de la vallée qui arrose le Jura, où les entomologistes n'ont guère chassé.

A propos de « *Julodis onopordi* » F.

Par L. SCHAEFER

Dans ce *Bulletin*, j'ai dit (octobre 1934, p. 128), que la forme française appartenait à la forme typique de Fabricius, suivant en cela DE MARSEUL, KERREMANS et J. OBERBERGER, et se retrouvait en Afrique du Nord.

Cette affirmation a été relevée par A. THÉRY (décembre 1934, p. 160), qui considère que le type doit plutôt être originaire de Barbarie, et qu'en outre aucune race ne saurait être commune à la France et à l'Algérie.

Pour tenter d'éclaircir la question de synonymie, j'ai profité de l'obligeance de M. K.-L. HENRIKSEN pour me faire comparer le *Julodis* de La Couronne avec l'espèce de Fabricius. La collection du Musée de l'Université de Copenhague possède l'exemplaire du type. Il est étiqueté : Tunis (Wahl). FABRICIUS avait donc bien corrigé la localité donnée dans la *Mantissa Insectorum*. Ce type s'accorde bien avec la forme française en ce qui concerne l'aspect des bandes pubescentes, mais les intervalles ne présentent aucune légère côte, alors que chez les exemplaires de La Couronne, comme chez ceux de Saint-Mandrier, ils sont toujours très légèrement, mais distinctement, costiformes. La forme française diffère donc bien du véritable *onopordi* F. ainsi que A. THÉRY l'avait prévu.

¹ *Bulletin mensuel de la Soc. Linn. de Lyon*, 2^e année, n° 5, mai 1933, p. 71.

² Curculionides gallo-rhéniens, 7^e partie in. *Ann. Soc. entomol. France*, vol XCIX, 1930, p. 177.