

# BULLETIN MENSUEL

DE LA

# SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON  
RÉUNIES

et de leurs GROUPES de ROANNE, VIENNE et VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Secrétaire général : M. le Dr BONNAMOUR, 49, avenue de Saxe ; Trésorier : M. P. GUILLEMOZ, 7, quai de Retz

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet (Immeuble Municipal)

|                   |   |                                         |           |
|-------------------|---|-----------------------------------------|-----------|
| ABONNEMENT ANNUEL | { | France et Colonies Françaises . . . . . | 15 francs |
|                   |   | Etranger.. . . .                        | 20 —      |

2.151 Membres

MULTA PAUCIS

Chèques postaux c/c Lyon, 101-98

## PARTIE ADMINISTRATIVE

### ORDRES DU JOUR

#### CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du **Mardi 12 Octobre**, à 20 h. 30

*Vote sur l'admission de :*

M. Ochs (Jean), Villa « Les Abeilles », Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), *Lépidoptères*, *Coléoptères*, spécialement cavernicoles et Lypogés, parrains MM. J. Jacquet et Dr Bonnamour. — M. Matray, pharmacien, Villefranche-sur-Saône (Rhône), *Mycologie*, parrains MM. Le Coarer et Dr Bonnamour. — Mme Corseaux, 13, rue de l'Ancienne-Mairie, Villeurbanne, parrains MM. Pouchet et Boudet. — M. le Dr Mallet-Guy (J.), 8, rue François-Vernay, Lyon, parrains MM. Pouchet et Guillemoz. — M. Scarbotte (Benjamin), 102, rue Corne-de-Cerf, Lyon (3<sup>e</sup>), parrains MM. Raby et Bertholon. — M. Albany (René), 46, cours Vitton, Lyon (6<sup>e</sup>), parrains MM. Guillemoz et Pouchet. — M. Dansard (Pierre-Louis), 8, rue de la Chavanne, Lyon, parrains MM. Régina et Fontanel. — M. Sautot-Vial, 21, cours Lafayette, Lyon, parrains MM. Pouchet et Niolle. — M. Poncin (R.), 5, quai Jean-Jacques Rousseau, Lyon, parrains MM. Pouchet et Niolle.

2<sup>o</sup> Reconnaissance d'utilité publique de la Société.

3<sup>o</sup> Question de la cotisation.

4<sup>o</sup> Question de nos publications.

5<sup>o</sup> Question relative aux excursions.

Pour terminer cette énumération, j'ajouterai que la région de Chanat m'a encore fourni un échantillon fort curieux, dont je ferais volontiers un  $\times \times O. \textit{mascula} \times \textit{Morio} \times \textit{sambucina}$  et dont voici la description :

Plante d'environ 25 centimètres; à tubercules entiers et à tige pleine. Feuilles 5-7 assez semblables à celles d'*O. mascula*, mais un peu plus larges; atteignant la moitié de la tige, non maculées.

Fleurs en épis assez serré, de 7 à 8 centimètres de long, très foncées (violet pourpre), légèrement teintées de jaune à la gorge, à odeur de sureau prononcée. Sépales non connivents, subdressés, obtus. Labelle arrondi ( $12 \times 8$  mm.), entier, mais présentant deux dents à l'endroit où se place la partie médiane dans les *O. mascula* et *Morio* et dont la symétrie rappelle plutôt ce dernier. Eperon gros d'environ 1 centimètre de long sur 3 mm.  $1/2$  de large, obtus à l'extrémité. Sur le labelle, se distinguent nettement quelques papilles analogues à celles d'*O. Morio*.

Cet échantillon tient donc bien :

d'*O. mascula*, par son port, ses feuilles et son inflorescence en épis allongé ;

d'*O. Morio*, par les dents symétriques de la portion médiane du labelle et les papilles de celui-ci ;

d'*O. sambucina*, par l'odeur et la forme de l'éperon ; la couleur très foncée des fleurs fait penser que ce serait la variété *purpuratum* d'*O. sambucina* qui a servi dans la formation de l'hybride elle est en effet très commune dans la région.

## SECTION ENTOMOLOGIQUE

Séance du 16 Juin

### « *Carcinops* : 14 *striatus* » Steph. (Col. Histeridæ) dans la région lyonnaise (Distribution géographique. Cosmopolitisme. Régime)

Par M. L. BOUDET

Pris un exemplaire le 14 juillet 1935, à Décines (Isère), près Lyon, au vol, par une journée chaude. Détermination faite par M. JACQUET, notre collègue coléoptériste, auquel j'adresse mes remerciements. Ce fut lui qui m'engagea à le présenter à la Société comme espèce nouvelle pour notre région.

A été signalé dans notre pays, à :

Seine-et-Marne : *Fontainebleau* (Collect. BONNAIN), aucune indication portant dans Cat. Col. de la forêt de Fontainebleau, par GRUARDET; 1930 ; — Seine-et-Oise : *Le Raincy* et *Saint-Germain* (FAUVEL) ; — Calvados : *Cdén* (FAUVEL), *L'Hôte Chamandel*, hergeries (BEDEL) ; — Seine-Inférieure : *Rouën*. Quelques exemplaires in collection ROBERT, à la Société Linnéenne, portent l'indication : Rouen, navires (sans date) ; — Loire-Inférieure : *La Bernessin* (Ch. BRISOUT), *Le Croisic* (SAINT-CLAIRE DEVILLE) ; — Sarthe : *Crègne-en-Champagne* (MONTGUILLON) ; — Ille-et-Vilaine : *Antrain* (DE LA GODINAIS) ; — Charente-Inférieure : *Ile de Ré* (BONNAIVE), *Ile d'Oléron* (CHAMPENOIS), *Royan* (HOFFMANN) ; — Landes (sans lieu de provenance, par Dr GOBERT) ; — Lot-et-Garonne : *Sas* (BAUDUER) ; — Basses-Pyrénées : *Pau* (LESBORD) ; — Pyrénées-Orientales : *Collioure* (PAMBELLE, REY), *Port-Vendres* : détritüs d'écufie (Valéry MAYET; Cat. Col. des Albères) ; — Aude : *Île de l'Aude* (A. GAVOY), *Plage de la Franqui*, *Capi Leucate* (DE BRUNNIER) (Je n'ai pas trouvé mention de 14 *striatus* dans Col. de l'Aude

de GAVOY, mais seulement de *minimus* Aubé, qui me paraît synonyme) : — Haute-Garonne (Cat. des Col. du Languedoc, in *Bull. Soc. Hist. Nat. de Toulouse* (1923) ; — Gard : *La Bégude-de-Rochefort* (D<sup>r</sup> CHOBAUT) ; — Hérault : *Béziers* (MARQUET) ; *Sète* (DES GOZ.) ; — Vaucluse : *Bédarrides* (DE BUFFÉVANT), *Morières* (D<sup>r</sup> CHOBAUT) ; — Bouches-du-Rhône : *Marseille* (V. MAYET, D<sup>r</sup> CHOBAUT) ; — Var : *Toulon*, *La Seyne* (THOLIN), *Hyères* (REY), *Le Beausset* (SIETTI).

Dans le Nord : A. DE NORGUET, in Cat. des Col. du Département du Nord, Lille, 1863, ne cite que *C. minimus* Aubé, assez commun dans les dunes, bord des mares. *Calais*, *Dunkerque*, *Marly* (Nord) (LEPRIEUR), d'après M. JACQUET). — Dans l'Est : *Nancy* (Meurthe-et-Moselle), avenue de la Malgrange, champignons, en juin (VOCAULT) in Paul SCHERDLIN (Cat. Col. de la Chaîne des Vosges). — Cat. de M. BOURGEOIS (*Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar*, années 1901-1902), « Sous les écorces, assez rare » et (en note) : « Les indications de WINCKLER et SILBERMANN (Cat. Col. d'Alsace et Chaîne des Vosges, 1866), sont les seules que nous possédions sur la capture de ces deux espèces, *minima* Aub. et *14 striata* Steph., de *Carcinops*, dans notre région. Elles demanderaient à être confirmées, et ce n'est que sous toutes réserves que nous les signalons. » (M. JACQUET me communique : *Muizon* (Marne) (DE BUFFÉVANT).

Pour comparaison, distribution de ce genre holarctique sur le globe, in Cat. Winckler (communiqué par M. TESTOUT) :

Genre *Carcinops* De Marseul 1832.]

N<sup>o</sup> 8430. *C. Vaulogeri* Théry, Tunisie ; — n<sup>o</sup> 8431. *C. 14 striata* Steph. Méditerranée Occidentale ; — n<sup>o</sup> 8431a *C. pumilio* Er. ; — n<sup>o</sup> 8432. *C. Mayeti* Mars. Arabie, Egypte ; — n<sup>o</sup> 8433. *C. Sinensis* Lew., Chine.

*Cosmopolitisme.* — L'espèce, comme on le voit, est assez répandue dans notre pays, le genre étant lui-même un habitant des quatre parties du monde. Toutefois plus commun dans nos départements méridionaux et sur le littoral.

*Régime.* — Paraît être originellement la pulpe des amandes de l'Arachide « Cacahuette » « Pistache de terre », cultivée d'abord dans l'Afrique du Nord (Algérie), puis en Espagne. Notre insecte a souvent été signalé dans nos ports marchands, Marseille, Rouen, Sète, parmi les grains d'arachides). Dut ensuite émigrer plus au centre où cette plante ne se cultivant pas, il se mit (par une interversion assez fréquente, dans le régime alimentaire des Hétérides), à hanter les matières végétales et animales en putréfaction, et fut alors signalé dans les fumiers des bergeries, sous les écorces, etc. (A noter que l'Arachide (*Arachis hypogaea*) mûrit ses semences sous terre, ce qui laisse une certaine similitude, entre la vie de l'insecte sous terre et dans les matières stercorales) (Valéry MAYET, Port-Vendres, charognes, excréments, poissons en putréfaction. Cat. Col. de Prov.).

NOTE. — Il est singulier que le catalogue de FAIRMAIRE et J. DU VAL (1860), ne mentionne pas même ce genre, que DE MARSEUIL avait créé en 1832 !... Ce dernier, dans ses *Histeridae* le met en synonymie avec *pumilio* Er. et indique comme localités ou pays : Algérie, France, Amérique Boréale. REITTER (*Cat. Europ.*), indique simplement : Europe Méridionale. WARNIER, *Cat. Faun. Gall. Rhén.* (1901), le mentionne sans indication de localité.

Je tiens à remercier, en terminant, tous les collègues de la Section d'Entomologie, pour l'aide désintéressée qu'il m'ont apportée : M. le D<sup>r</sup> BONNAMOUR, qui voulut bien fouiller pour moi les volumes de notre bibliothèque, M. JACQUET, qui m'envoya des listes de localité et me détermina l'insecte unique, objet de cette note, M. TESTOUT, qui me communiqua la liste du Catalogue Winckler.