

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
RÉUNIES

et de leurs GROUPES de ROANNE, VIENNE et VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Secrétaire général : M. le Dr BONNAMOUR, 49, avenue de Saxe ; Trésorier : M. P. GUILLEMOZ, 7, quai de Retz

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet (Immeuble Municipal)

ABONNEMENT ANNUEL	{	France et Colonies Françaises	15 francs
		Etranger.. . . .	20 —

2.109 Membres

MULTA PAUCIS

Chèques postaux c/c Lyon, 101-98

PARTIE ADMINISTRATIVE

ORDRES DU JOUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Séance du Mardi 9 Février, à 20 h. 30

1^o Vote sur l'admission de :

M. Frankhauser (Bernard), Compagnie Electromécanique, 6, place de la Buire, Lyon (*réintégration*). — M. Roger, professeur agrégé de Sciences naturelles au Lycée du Parc, 20, rue des Jasmins, Lyon, *Paléontologie, Géologie*, parrains MM. Allemand-Martin et Larue. — M. Dehay (Charles), professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Lille (Nord), *Histoire naturelle pharmaceutique*, parrains MM. Mérit et Nétien. — M. Vallacys (Lucien), professeur de Sciences naturelles au Lycée de Valenciennes, 1, rue de la Bibliothèque, Condé-sur-l'Escaut (Nord), parrains MM. Larue et Mérit. — M. d'Abrigean, professeur à l'Ecole de Gibeins, par Mizerieux (Ain), *Entomologie agricole. Coléoptères, Lépidoptères*, parrains MM. Jacquet et Dr Bonnamour. — M. Nannenga (Evephard), Twijnstraat, 15 bis Utrecht (Hollande), *Lichens*. — M. Thienemann (Prof. A.) Direktor der Hydrobiologische Anstalt, Plön Holstein (Allemagne), *Métamorphose des Chironomidae*, parrains MM. Riel et Guillemoz. — M. Régny (Julien), 46, rue Jean-Sarrazin, Lyon (7^e), *Mycologie*, parrains MM. Grange et Perra. — M. Vallier, Hôtel de la Perdrix Rouge, Chamelet (Rhône), parrains MM. Tourrillon et Guillemoz. — Syndicat d'Initiative des Bords de l'Ain, président M. Pissot, pharmacien à Poncin, parrains MM. Maury et Guillemoz.

BIBLIOGRAPHIE

- BONNE (G.). — 1929-1930 : Premier aperçu des Zoocécidies du Lautaret (*Bull. Soc. Scient. du Dauphiné*, t. L (5^e sér., t. IX), p. 245-280).
- COTTE (J.). — 1909 : Cécidies récoltées à Monestier-de-Clermont (Isère). (MARCELLIA. — *Rivista int. di Cecidologia*, Avellino, vol. VIII, p. 150-162.)
1912. — Recherches sur les Galles de Provence (Thèse de Pharmacie), Tours, Impr. Deslis frères, in-8°, LI-240 p., fig. 1-15.
1915. — Une randonnée dans les Basses-Alpes (*Ann. Mus. Hist. Nat. Marseille*, Mém. 3, p. 21).
1917. — Quelques diptéroécidies nouvelles de Provence. (MARCELLIA. — *Rivista int. di Cecidologia*, Avellino, XVI, p. 67-71, 2 fig.)
1924. — Les Cécidies des Alpes-Maritimes et leurs producteurs (*Mém. Soc. Linnéenne de Provence*, n° 3, 56 p., 6 pl., Marseille).
- HOUARD (C.). — 1908-1912 : Les Zoocécidies des Plantes d'Europe et du Bassin de la Méditerranée, 3 vol., p. 1560, 1.566 fig., 2 pl., Paris.
- SALGUES (R.). — 1934 : Catalogue des Cécidies de Basse et Haute-Provence (*Ann. Soc. Hist. nat. de Toulon*, tiré à part, p. 1 à 55).

Description d'une forme nouvelle de *Zophosis* (Coléoptères, « Fenebrionidæ »)

Par M. Pierre LESNE

Zophosis fartula subgemma subsp. n.

Long. circ. 8 mm. — Corpus breve, ovoideum, convexum, postice leviter attenuatum, nigrum, capite sat tenuiter haud confluent punctato, sutura clypeali medio angulum prominentissimum delineante, oculis brevissime appendiculatis, appendice latiore quam longiore, deorsum invisio, antennarum articulis 3-8 elongatis, articulo 2° tertii dimidium superante, tertium fere æquante. Pronoto surdo, integumento nudique densissime microgranulato et tenuissime sparsim punctulato, angulis posticis acutissimis, retrorsum prolongatis, humeros amplectentibus, margine postico bisinuato, sulculo marginali in medio laxo interrupto utrinque notato. Elytris postice leviter gradatim attenuatis, ecostatis, surdis, densissime microgranulatis ac tenuissime punctulatis, lineolis longitudinalibus (præter in lateribus) nullis, spatiis nitidis lævissimis, subprominulis, forma irregulari, in quoque elytro secundum lineis tribus discoïdalibus digestis ornatis, in regionem posticam lateralem granulatis, carinula epipleurali submarginali, pseudepipleuris retrorsum tantum expressis; epipleuris glabris, lineolis longitudinalibus brevibus sparsis notatis. Processu prosternali horizontali, lanceolato, apice acutissimo, medio esulcato, nudique marginato. Mesosterno elongato, usque da apicem fortiter sulcato; metasterno punctato, in dimidium posticum secundum lineam medianam fortiter sulcato. Femoribus intermediis pectinatis, posticis esulcatis; tibiarum calcaribus brunneis.

Cette forme diffère essentiellement du *Z. fartula* typique (cf. CHATANAY in *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1914, p. 573) par la présence, sur chaque élytre de trois séries longitudinales de reliefs lisses et brillants. M. le Dr MONARD l'a recueillie à Bimbi, en octobre et à Ndongo, en mai. Les types sont conservés, l'un dans la collection du Dr MONARD, l'autre au Muséum National de Paris.

On sait que l'espèce était précédemment connue comme étant répandue dans une partie du Territoire du Tanganyika, dans le Nyassaland, la Rhodésie du Nord et le Katanga.