

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

Reconnue d'utilité publique par décret du 9 août 1937.

Secrétaire général : M. le D^r BONNAMOUR, 49, avenue de Saxe ; Trésorier : M. P. GUILLEMOZ, 7, quai de Retz

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet (Immeuble Municipal)

ABONNEMENT ANNUEL	}	France et Colonies Françaises.	25 francs
		Étranger.	50 —

2.030 Membres	MULTA PAUCIS	Chèques postaux c/c Lyon, 101-98
---------------	--------------	----------------------------------

PARTIE ADMINISTRATIVE

ORDRES DU JOUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du Mardi 10 Mai, à 20 h. 30.

1^o *Vote sur l'admission de :*

M. J. CARLES, professeur de Biologie, séminaire des Missions, Vals près Le Puy, Haute-Loire ; *Biologie et Biogéographie végétales*, parrains : MM. Viret et D^r Bonnamour. — M. F. GAILLARD, 5, Cité du Midi, Paris 18^e ; *Entomologie, Lépidoptères, Coléoptères* ; parrains : MM. D^r Pater et Martin (de Paris). — M. Georges DEROZIER, 101 rue Tronchet, Lyon ; *Botanique* ; parrains : MM. Bange et D^r Bonnamour.

2^o *Questions diverses.*

SECTION BOTANIQUE

Séance du 9 Mai, à 20 h. 15.

- 1^o M. MEYRAN. — *Simple notes : deux botanistes lyonnais méconnus ; Stuart-Mill botaniste.*
 2^o M. WAGNER. — *La Vigne et le Vin de raisin dans l'ancienne Chine.*
 3^o M. NÉTIEN. — *La Roche d'Andance et les landes siliceuses des vallées du Rhône.*
 4^o M. CHOISY. — *Présentation de lichens.*
 5^o *Présentation de plantes fraîches.*

SECTION D'ANTHROPOLOGIE, DE BIOLOGIE ET D'HISTOIRE NATURELLE GÉNÉRALE

Séance du Samedi 14 Mai, à 17 heures.

- 1^o M. le D^r ARCELIN. — *Silex solutréens de Forsaint (Tunisie).*
 2^o M. PELOSSE. — *L'état actuel de nos connaissances sur le plankton des lacs alpins et subalpins français.*
 3^o M. le chanoine A. CARPENTIER. — *Remarques sur quelques *Bennettites* du Kimmeridgien du Buguey.*

LISTE DES COLÉOPTÈRES RÉCOLTÉS

Par MM. BATTETTA, D^r BONNAMOUR et LE COARER.

La récolte des Coléoptères se fit dans la première partie de l'excursion c'est-à-dire au cours de la montée de Vaujany (1.253 m.) au Col du Sabot (2.170 m.). Dans la seconde partie, la descente fut trop rapide, trop fertile en incidents pour qu'on puisse songer à récolter quoi que ce soit.

Dans les articles précédents, on a lu les caractères géologiques des différents terrains que nous avons traversés, et les plantes que l'on y a rencontrées. Nous n'avons pas à y revenir.

Nous dirons seulement que notre chasse a consisté soit à faucher les plantes et arbustes qui se trouvaient sur notre passage, soit à explorer minutieusement les abords humides des névés en train de fondre, soit enfin à soulever les nombreuses pierres toujours abondantes dans ces sentiers montagneux et au col lui-même.

Le fauchoir promené sur les herbages le long du sentier nous a donné les espèces floricoles ordinaires ou montagnardes suivantes ¹ : *Anthophagus armiger* Grav. ab. *nivalis* Rey (Bo), *A. jallax* Kiesw. (Bo), *A. alpestris* Heer (LC), *Corymbites virens* Schr., a. *aulicus* Panz. (Bo), et sa var. *signatus* Panz. (LC), *C. aeruginosus* F. (Bo), *C. pectinicornis* L. (LC), *C. cupreus* F. (LC), *C. aeneus* L. (Ba, Bo, LC), *Agriotes obscurus* L., (Bo, LC), *Telephorus tristis* F. (Ba, Bo, LC), *I. nigricans* Mull. (Bo), *T. pellucidus* F. (LC), *T. rufus* L. (LC), *Ancistronycha abdominalis* F. (LC), *Danacea pallipes* Panz. (Bo), *Isomira murina* L. a. *maura* F. (Bo), *Mordella aculeata* L. (Bo), *Lagria atripes* Muls. (LC), *Hoplia argentea* Poda (LC), *Epuraea depressa* Gyll. (Bo), *Evodinus interrogationis* L. a. *ebeninus* Muls. (LC), *Hylotrupes bajulus* L. var. *lividus* (Muls. (Ba), *Brachypterus urticae* F. (Bo), *Bruchidius varius* Ol. (Bo), *Apion varipes* Ger. (LC), *Larinus sturnus* Schall. (Bo), *Polydrosus undatus* F. var. *niveopictus* De Geer (Bo), *Sitones crinitus* Hbst. (Bo), *Phytobius quadricornis* Gyll. (Bo), *Rhinoncus pericarpus* L. (Bo), *Phyllolobius calcaratus* F. (Bo), *Melasoma populi* L. (Bo), *Gastroidea viridula* de Geer (Bo, LC), *Cryptocephalus biguttatus* Scop. (Bo), *Phyllotreta crucifera* Goez. (Bo), *P. variipennis* Boield. (Lc.), *Scymnus ater* Thunb. (LC).

Sur la neige même des névés nous trouvons plusieurs exemplaires de *Phyllopertha horticola* L. (Bo, LC), comme nous en avions déjà trouvé l'an passé à La Bérarde, comme si ces insectes subissaient un attrait particulier pour la blancheur de la neige.

L'examen de quelques bouses et crottins nous a permis de récolter : *Coprimorphus erraticus* L., a. *jumigatus* Muls., *Aphodius obscurus* F. (Bo), *A. alpinum* Scop. (LC), et son a. *rubens* Muls. (Bo), ainsi que son a. *Mulsanti* D. T. (LC), *A. fimetarius* L. (Bo), *A. depressus* Kugel (LC), *A. mixtus* Vill. (LC), *A. ater* De Geer (LC), *A. rufipes* L. (LC), *Onthophagus ovatus* L. (Bo), *O. coenobita* Heb., a. *monticola* Panz. (LC), *Trypocopriss vernalis* L. (LC), *Sphaeridium lunatum* F.

1. Pour abrégé, nous désignerons par leurs initiales les récoltants : (Ba) M. Battetta, (Bo) D^r Bonnamour, (LC) M. Le Coarer.

Dans le chemin même nous récoltons : *Cicinadela gallica* Brul. (Ba), *Byrrhus pilula* L. var. *fasciatus* F. (Bo), *Silpha obscura* L. (Bo), *S. nigrita* Creutz. (Bo, LC), *S. tyrolensis* Laich. (Ba, Bo, LC), si commune dès que l'on dépasse 1.200 m., *Otiorrhynchus fuscipes* Oliv. (Bo, LC).

Le voisinage des névés, dans les prés encore tout humides de la neige fondante, nous permet de prendre : *Bembidium bipunctatum* L. (Ba, Bo, LC.) sa var. *nivale* Heer (Bo), *B. pyrraeneum* Dej. (Ba, Bo, LC) sous sa forme de race alpine déjà signalée par notre collègue J. Jacquet, *B. Redtenbacheri* K. Dan. (Ba), *Ocys striatus* Gyll. (Bo), race alpine qui, à ma connaissance, n'a pas été encore signalée, et *Helephorus glacialis* Vill. (Bo).

Enfin, le soulèvement des pierres nous a fourni un lot important de Carabides : *Carabus intricatus* L. (Bo, LC), au Col du Sabot lui-même, c'est-à-dire à 2.170 m., alors qu'habituellement il ne dépasse pas 1.500 m., *C. auronitens* F. et son a. *nigripes* Heyd. (LC), *C. cancellatus* Ill. (LC), *Pterostichus vulgaris* L. (Ba), *P. Duvali* Dej. a. *niger* Schlsk. (Bo), *P. Baudii* Chd. (Bo), *P. Selmanni* Duft. v. *Prevosti* Dej. (LC), *Amara picea* F. (Bo, LC), *A. nivium* Tschitsch. (Ba), espèce rare, *Poecilus lepidus* F. (Ba, Bo, LC), *P. coerulescens* L. (LC), *Steropus madidus* F. (LC), *Omaseus vulgaris* L. (Bo, LC), *Harpalus latus* F. (Bo, LC), *Loricera pilicornis* F. (Bo), *Calathus melanocephalus* L., v. *obscuricollis* Chd., (Bo, LC), *C. fuscipes* Goeze (LC).

Et quelques Staphylins : *Philonthus rotundicollis* Mén. (Bo), espèce rare, *P. frigidus* Kies., a. *pyrenaicus* Kies. (Bo), espèce spécialement montagnarde, *P. montivagus* Heer (LC), *P. varius* Gyll. (LC), *Aleochara rufitarsis* Heer (Bo, LC), espèce montagnarde et peu commune, *Quedius rufipes* Grav. (LC), *Oxytelus sculpturatus* Grav. (LC) ¹.

LISTE DE LÉPIDOPTÈRES RÉCOLTÉS

Par MM. BATTETTA et DEFAÏSSE.

Une chasse à la lumière, le soir, nous a donné : *Notodonta dromedaria* L., *Cidaria rubidata* Schif., *Boarmia repandata* L.

Un essai de miellée nous a donné : *Procus strigilis* Clerck., *Eurrhypara urtica* L. (micro.), *Pyralis farinalis* L., *Crambus pinellus* L., *Meritis trigrammica* Huf.

En montant de Vaujany au Col du Sabot nous avons pu capturer : *Hypocalcia rubiginella* Treisch., *Synopsia sociaria* Hübn., *Crambus chrysonuchellus* Scop., *Athetis clavipalpis* Scop., *Larentia hastata* L., *L. olivata* Bkh., *L. ferrugata*, Cl., *Acidalia ornata* Scop., *Euproctis chrysorrhea* L. ♂, *Hesperia malvae* L. ?

Et dans la vallée de l'Eau d'Olle : *Polyommatus semiargus* Rott., *Pamphila palaemon* Pall. et *Parnassius apollo* L.

1. Toutes nos déterminations ont été vérifiées et contrôlées par M. Jacquet auquel nous sommes heureux d'adresser ici tous nos remerciements.