

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

Reconnue d'utilité publique par décret du 9 août 1937.

Secrétaire général : M. le Dr BONNAMOUR, 49, avenue de Saxe ; Trésorier : M. P. GUILLEMOZ, 7, quai de Retz

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet (Immeuble Municipal)

ABONNEMENT ANNUEL	France et Colonies Françaises.	25 francs
	Etranger.	50 —

MULTA PAUCIS Chèques postaux c/c Lyon, 101-98

PARTIE ADMINISTRATIVE

ORDRES DU JOUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du Samedi 9 Décembre à 15 h. 30.

1^o Vote sur l'admission de :

M. MARTIGNY D^r, 41, Cours Gambetta, Lyon (réintégration). — M. DEPALLE, 26, chemin de la Favorite, Lyon. — M. POIRRIER, 24, rue Turbil, Lyon. — M. GUERRE Émile, coiffeur, Saint-Priest, Isère ; *Mycologie* ; parrains : MM. Tourillon et Desbrosse. — M. E. COTTEREAU, professeur honoraire, Conflans-sur-Anille par Saint-Calais, Sarthe (réintégration).

2^o Question des cotisations.3^o Questions diverses.

SECTIONS DE BOTANIQUE ET D'ENTOMOLOGIE

Séance du 16 Décembre, à 15 h. 30.

a) BOTANIQUE.

1^o M. QUENEY. — Quelques plantes de Saint-Julien-en-Beauchêne, Hautes-Alpes.2^o M. R. SCHNELL. — Les inhibitions de l'allongement chez les organes végétaux et quelques unes de leurs causes.

b) ENTOMOLOGIE.

1^o M. TESTOUT. — Sur les Coléoptères cavernicoles du Vercors.2^o M. HUSTACHE. — Sur quelques Curculionides de France.

PROCÈS-VERBAL

de la séance du 18 novembre.

M. QUENEY présente les Centaurées suivantes provenant d'Algérie :

Centaurea elegans All. (= *Galactites tomentosa* Moench). — *Centaurea crupina* L. (= *Crupina vulgaris* Cassini). — *Centaurea salmantica* L. (= *Microlonchus salmanticus* DC.). — *Rhaponticum acaule* DC. — *Centaurea africana* Link, var. *Tagana* Brot., *C. pullata* L., *C. sphaerocephala* L., *C. infestans* Coss. et DR., *C. seridis* L. var. *maritima* Lange, *C. algeriensis* Coss. et DR., *C. napiifolia* L. C., *acaulis* Desf., *C. melitensis* L., *C. eriophora* (L.) Desf., *C. sulfurea* Wills., *C. nicaeensis* All., *C. ferox* Desf., *C. furfuracea* Cots. et DR., *C. solstitialis* L.

M. NIOLLE présente sa note. Il synonymise *Cortinarius traganus* Fr. avec ses variété et forme *finitimus* sous le nom de *Inoloma traganum* (Fr.) Ricken, chez lequel il signale la présence d'un double voile ; il démontre que *Cort. hircinus sensu* Konrad et Maublanc est très proche de *I. traganum*, et très éloigné de *Cort. hircinus* (Bolton) Fries, et il conclut que : *Cort. hircinus sensu* K. et M. est : ou *Cort. anethystinus* (Schäffer) Quelet, Bataille, ou une nouvelle espèce (sera publié).

Le D^r BONNAMOUR fait circuler une boîte de Coléoptères que M. SCHAEFER a bien voulu nous envoyer des chasses en 1939 : *Tricodes flavocinctus* Spir., *Sphenoptera parvula* F., *Melanophila cuspidata* Klug., *M. Formaneiki* Jak., *Anthaxia Midas* ssp. *Oberthuri* Schaef., *Anthaxia nitidula* ab. *virata* Schaef., *Anthaxia nigrojubata* Roubal, *Agrilus hastulifer* Ratz., *Leucomigus tessellatus* Fairm., *Acmaeops pratensis* Laich. et *Cryptocephalus Mayeti* Mars.

M. TESTOUT continue l'étude des Lépidoptères Saturnioïdes en montrant une forme nouvelle de *Heliconisa pagenstecheri*, ab. *immaculata*, en signalant une nouvelle localité pour *Lobobunaea pheaz*, et en indiquant la distribution géographique de *Cirina butyrospermi* Vuillet. Il fait passer des cartons contenant un spécimen de ces splendides Papillons (sera publié).

PARTIE SCIENTIFIQUE

SECTION ENTOMOLOGIQUE

Notules entomologiques

Par le D^r BONNAMOUR.

VII. *Saprinus furvus* ER. (COL. HISTERIDAE) INSECTE MÉRIDIONAL CAPTURÉ A LYON.

En septembre 1938 j'avais mis sur ma fenêtre exposée à l'ouest, Avenue de Saxe, quelques pots contenant des champignons afin d'étudier les insectes parasites de ces derniers. L'un de ces pots contenait un pied de *Boletus appendiculatus*, récolté à Poule (Rhône), par M. JOSSERAND, et que, après détermination, notre collègue mycologiste m'avait apporté. Quelques jours après, alors que le bolet commençait à tomber en décomposition et à répandre une légère odeur cadavérique, je trouvai sous le pot et certainement attirés par l'odeur deux exemplaires de *Saprinus furvus* Er. dont la détermination m'a été confirmée par M. JACQUET que je suis heureux de pouvoir ici remercier de son inaltérable complaisance.

Le *Saprinus furvus* a été décrit par Erichson en 1834 ; sa description a été reprise et complétée par de MARSEUL en 1853 ; il en donne les caractères suivants :

« Ovale, court, peu convexe, d'un noir métallique, luisant. Antennes rousses ; scape brun. Front plan, densément pointillé ; strie fine, interrompue derrière l'épistome. Pronotum court, bisinué à la base, courbé et impressionné, le long des côtés, rétréci et échancré en devant, avec les angles obtus, couvert de points fins et serrés dans son pourtour ; strie marginale entière. Écusson très petit. Élytres à peine plus longues que le pronotum, de sa largeur à sa base, dilatées à l'épaule, rétrécies et droites au bout, couvertes d'une ponctuation fine et serrée, rugueuse sur les interstries, ne laissant de libre que l'épaule et un espace mal limité dans le voisinage de l'écusson ; stries dorsales fines, également raccourcies vers le milieu, quatrième recourbée vers la suture ; suturale raccourcie ; subhumérale externe petite ; interne joignant presque l'humérale. Pygidium bombé, uniformé-

ment et densément pointillé. Mésosternum entièrement rebordé, avec des points épars. Prosternum plan, peu élargi ; stries presque parallèles ; un peu divergentes en devant. Pattes ferrugineuses ; jambes antérieures dilatées, garnies de 7-8 petites denticules. »

Saprinus furvus est un insecte purement méridional. On le trouve sous les cadavres d'animaux dans les matières stercorales, dans les matières en décomposition ou, comme le signale MARQUET, sur les terres d'alluvion qui renferment encore des détritiques un peu humides.

Son attirance par un Bolet n'a rien d'étonnant mais sa présence à Lyon est intéressante à signaler ; ce serait très probablement sa limite septentrionale en France.

Sa distribution peut être établie comme suit :

1° tous les départements qui bordent la Méditerranée :

Pyrénées-Orientales (V. Mayet), Port-Vendres (Normand), Collioures (Seriziat).

Aude, étang de Vendres (Marquet, Gavoy).

Hérault.

Gard.

Bouches-du-Rhône (H. Caillol) : Camargue, bois de Rièges (Puel), Aix (Ab., Achard), Marseille (Ab.).

Var (Caillol) : Le Beausset, Saint-Cyr (Boissy), Toulon, La Seyne (Rey), Le Luc, Draguignan, Fréjus (Robert), Saint-Raphaël (Ch., Lombard).

Alpes-Maritimes (Caillol) : Cannes (Goz.), Nice (Perag., C. Bris.), canal de la Vesubie (Dev.).

2° en dehors des bords de la Méditerranée on l'a signalé :

dans la Vaucluse (Caillol) : Avignon (Fab., Rey, Chob.), Morières (Chob.) et les Basses-Alpes (Caillol) : Riez (Taxil), Sisteron (Lombard).

D'après ma capture il faut y ajouter le Rhône alors que je ne crois pas qu'on l'ait encore rencontré dans les départements intermédiaires : Ardèche, Drôme ou Isère ; y a-t-il là une attirance à longue distance ? ou bien cet insecte est-il en train de remonter de plus en plus dans l'intérieur ? seules de nouvelles captures pourront élucider ces questions.

3° En dehors de la Méditerranée, TEMPÈRE le signale sur les côtes de l'Atlantique dans :

la Gironde : Lacanau, Cussac (E. Girard), mais il semble bien moins fréquent que sur les bords de la Méditerranée.

4° En dehors de France il semble bien limité aussi aux côtes soit de l'Atlantique, soit de la Méditerranée puisque de MARSEUL le signale du Portugal, de l'Espagne, d'Alger, de Tripoli, d'Égypte et de Grèce.

BIBLIOGRAPHIE

DE MARSEUL, Essai monographique sur la famille des Histeridae ; *Soc. ent. de France*, 1853, p. 406.

MARQUET, Notice entomologique sur l'étang de Vandres, *Bull. Soc. d'Étude des Sciences naturelles de Léziers*, 1882, p. 9.

GAVOY, Coléoptères de l'Aude, 1900.

V. MAYET, Coléoptères des Albères, 1904.

H. CAILLOL, Catalogue des Coléoptères de Provence, 1913.

G. TEMPÈRE, Les *Saprinus* (Col. Histeridae) de la Gironde ; *Actes de la Soc. Linnéenne de Bordeaux*, 1934, P. V., p. 123.