


	<i>Dictionnaire historique des membres de la société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies</i>
---	---

ROUY Georges Claude Charles

Né le 02 décembre 1851 à Paris.

Décédé le 25 décembre 1924, Asnières.



Archives nationales. Base Léonore.

Biographie

Botaniste.

1875. Secrétaire adjoint du Syndicat de la presse parisienne.

Secrétaire général de la *Caisse des Victimes du Devoir*, reconnue d'utilité publique.

Secrétaire fondateur de l'Association des journalistes Parisiens.

Secrétaire général du Syndicat de la presse parisienne.

1876–1888. Secrétaire de la direction et rédacteur du Journal le *Siècle*.

1874–1890. Membres des bureaux ou comités de toutes les œuvres organisées par la presse française.

Vice-président des comités de souscription en faveur des Algériens.

Membre du Conseil et de la commission des sessions et congrès de la Société botanique de France. Délégué spécial de la Société.

1887. Vice-président du Comité d'honneur du congrès jubilaire de Bruxelles

1903–1904. Editeur scientifique de la Revue de botanique systématique et de géographie botanique. N° 1 (févr. 1903)–n° 24 (janv. 1905). Paris : Les Fils d'Émile Deyrolle, 1903–1905.

Officier d'Académie, 1884.

Chevalier de la Légion d'honneur, 1890.

Sources biographiques

Anonyme 1892. État de l'Académie Internationale de Géographie botanique au 1er janvier 1893. *Le monde des plantes*, 2e année, n°16 : 89–91.

G. Rouy, membre d'honneur, p. 89–90.

- Anonyme 1896. Divers. Flore de France par MM. Rouy et Foucaud. *L'Échange. Revue linnéenne*, 12 (142) : 113–114.
- Anonyme 1897. Flore de France, par MM. Rouy et Foucaud, tome IV, les fils d'Emile Deyrolle, Paris. *L'échange. Revue linnéenne*, 13 (155) : 99–100.
- Baranda Julia 1984. *Georges Rouy (1851–1924), su obra botánica en España*. Madrid, Monografías del Real Jardín Botánico, 196 p.
- Charpin André & Timbal Jean 2007. Liste des membres de la Société botanique de France de son origine (1854) à 2003 (150 ans). *Acta Botanica Gallica*, 154, 3 : 423–492. Rouy Georges, membre 1870, p. 482.
- Gillot 1879. Séance du 7 mars 1878. Note sur une nouvelle localité du *Geum intermedium*. *Ann. Soc. bota. Lyon*, Comptes Rendus des séances, 1877–1878, 6(2) : 132–133.
- Magnin Antoine Dr. 1883. Séance du 23 octobre 1883. Bibliographie. Linares hybrides. Flore des environs de Lus-la-Croix-Haute et à Peyrius, d'après les observations de M. Rouy, etc. *Bull. soc. bota. Lyon*, Comptes rendus des séances 1883 : 129–132.
- Magnin Antoine 1897. Séance du 26 octobre 1897. Inexactitudes dans les indications géographiques données par MM. Rouy et Foucaud. *Ann. Soc. Bota. Lyon*, Comptes rendus des séances, 1897, XXII : 24.
- Malinvaud Ernest 1900. Rapport sur l'herbier de M. Georges Rouy. *Bulletin de la Société botanique de France*, T. XXXVI : CCLXXX–CCLXXXVIII.
- Malinvaud Ernest 1900. Rapport sur l'herbier de M. Georges Rouy,... Lons-le-Saunier, impr. de L. Dectume, 8 p. Extrait des *Actes du congrès international de botanique tenu à Paris, du 1er au 10 octobre*, au Palais des congrès, à l'Exposition internationale de 1900.
- Nétien G. et Quentin A. 1939. Nouvelle station de *Seseli leiocarpum* (Heuff.) dans l'Isère. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1939, 8 (7) : 185.
- Saint-Lager 1901. Séance du 17 décembre 1901. La restitution de l'antique orthographe du mot grec *Onothera* a été adoptée par plusieurs auteurs compétents, notamment par M. G. Rouy dans le tome VII de la Flore de France. *Ann. Soc. bota. Lyon*, Comptes rendus des séances, année 1901, 41.
- Touton J.B. 1939. Nouvelles localités dans l'Isère de *Seseli leiocarpum* Heuff. (Rouy et Cam.). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1939, 8 (7) : 184–185.
- Bulletin de l'Association des journalistes parisiens*, n° 40, 1925, p. 35.

Publications

1875. Description de cinq espèces nouvelles de Roses. *Bull. Soc. Bota. Fr.*, XXII : 295.
- 1875–1876. Note sur quelques localités françaises nouvelles de plantes rares ou peu communes. *Bull. Soc. Bota. Fr.*, 1875, 77–81 ; 1876, 240–241.
1882. Étude des *Diplotaxis* européens de la section *Brassicaria*... *Revue des sciences naturelles*, juin 1882 : 423–436.
1883. Excursions botaniques en Espagne en 1881 et 1882 : Orihuela, Murcia, Velez-Rubio, Hellin, Madrid, Irun. *Revue des sciences naturelles*, 87 p.
- 1893–1913. *Flore de France, ou Description des plantes qui croissent spontanément en France, en Corse et en Alsace-Lorraine*, ouvrage édité

par la Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure.
Asnières, G. Rouy ; Paris, Deyrolle.

T. I, Tableaux préliminaires. Des renonculacées aux crucifères (arabidées), par G. Rouy et J. Foucaud ; T. II, Des crucifères (arabidées) aux violariées, par G. Rouy et J. Foucaud ; T. III, Des violariées aux droséracées, par G. Rouy et J. Foucaud ; T. IV, Des droséracées aux légumineuses (ononidées), par G. Rouy ; T. V, Légumineuses (suite et fin), par G. Rouy ; T. VI, Rosacées, par G. Rouy, E.-G. Camus et N. Boulay ; T. VII, Des rosacées (pominées) aux ombellacées, par G. Rouy et E.-G. Camus ; T. VIII, Des ombellacées aux composées (silybées), par G. Rouy ; T. IX, Composées (suite), par G. Rouy ; T. X, Des composées (fin) aux solanacées, par G. Rouy ; T. XI, Des scrofulariacées aux labiées, par G. Rouy ; T. XII, par G. Rouy, Des illécébracées aux liliacées, par G. Rouy ; T. XIII, Des alismacées aux cypéracées, par G. Rouy ; T. XIV, Des graminées aux équisétacées, par G. Rouy.

Supplément de : *Annales – Société des sciences naturelles de la Charente-Inférieure*. Complété en 1927 par : *Conspectus de la Flore de France, ou Catalogue général des espèces, sous-espèces, races, variétés, sous-variétés et formes hybrides contenues dans la Flore de France* de Georges Rouy. Consultable sur Gallica.

1898. Classification raisonnée des *Centaurea* de la section *Jacea*. *Monde des plantes*, 7 p.

1898. Les *Dorycnium* de la flore française. *Bulletin de l'Association française de botanique*, 8 p.

1899. Note sur quelques *Pedicularis*. *Bulletin de l'Association française de botanique*, 10 p.

1901. Lettre de M. Rouy en réponse à l'article de M. J. Foucaud. *Bulletin de l'Association française de botanique*, 7 p.

1901. Observations sur le *Spergularia azorica* et sur les formes hybrides des *Saxifraga mutata* L. et *aizoides* L. *Bulletin de l'Association française de botanique*, Mai 1901, 7 p.

1901. Notes sur quelques plantes des Basses-Pyrénées recueillies pendant la session de 1899. *Bulletin de l'Association française de botanique*, Juin 1901, 14 p.

1901. Lettre de M. Rouy en réponse à l'article de M. J. Foucaud [intitulé : "Le *Spergularia azorica* Lebel n'est point une plante française"]. *Bulletin de l'Association française de botanique*, juillet 1901, 4 p.

1902. Observations sur quelques Rosiers des Deux-Sèvres. *Société botanique des Deux-Sèvres*, 227-234.

1893. Note sur le *Doronicum scorpioides* Willd. *Bull. Soc. Bot. France*, 40 : 186-189.

1903a. Le genre *Doronicum* dans la flore européenne et dans la flore atlantique. *Rev. Bot. Syst. Geogr.Bot.*, 1: 17-22.

1903b. Le genre *Doronicum* dans la flore européenne et dans la flore atlantique. *Rev. Bot. Syst. Geogr.Bot.*, 1 : 33-40.

1904. Conférence faite, le 29 mars 1904, aux élèves de l'École des mines sur l'organisation du travail dans les mines. *Bulletin de l'Association amicale des élèves de l'Ecole nationale supérieure des mines*, mai 1904, 25 p.

1900. *Flore de France*. VI, Tribu VI Rosées, genre VIII *Rosa*.

1902. Le "Galium Mollugo" L. dans la flore française. *Association française de botanique* : 146–150.
1902. Dernière réponse de M. Rouy au dernier article de M. Foucaud. *Association française de botanique* : 27–32.
1908. Un peu de bibliographie : *Narcissus capax*. *Bull. Soc. bot. Fr.*, LV : 148–154.
1927. *Conspectus de la "Flore de France", ou Catalogue général des espèces, sous-espèces, races, variétés, sous-variétés et formes hybrides contenues dans la "Flore de France" de Georges Rouy...* [Publié, avec une biographie de Georges Rouy, par Henri Lecomte. Paris, P. Lechevalier, XVI–320 p., portrait.

Collections

Herbier conservé à la faculté des sciences de Lyon (Lyon 1).

Affiliation aux Sociétés savantes

Société botanique de France 1870, vice-président (2 fois).

Société botanique des Deux-Sèvres, 1894.

Société pour l'étude de la flore franco-helvétique, 1905.

Académie Internationale de géographie botanique Directeur. Membre d'honneur 1892. Membre à vie, 1899.

Société française de botanique, président 1899.

Société des sciences naturelles d'Autun, membre d'honneur 1899.

Ressources en ligne

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis « »

<http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53>

Rouy Claude Charles

<https://www.leonore.archives-nationales.culture.gouv.fr/ui/notice/332474#show>

Rédacteur

Raymond Ramousse.

Journal des modifications :

12/03/2023 – RAMOUSSE Raymond : c

Citation

Ramousse Raymond 2009. Rouy Georges (1851–1924). *Dictionnaire des membres de la Société linnéenne de Lyon et des sociétés Physiophile de Lyon, d'études scientifiques de Lyon, botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies*.

<https://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-9877.pdf>

Gandoger 1923. L'*Anemone albida* Mariz nouveau pour la France et le genre *Anemone*. *Bull. Soc. Bot. Fr.*, LXX : 28–30.

Veuillez nous aider à améliorer cette biographie en envoyant vos corrections, ajouts, suggestions et autres commentaires

concernant Rouy Georges
à Ramousse R., ramoussier [à] free.fr ou secretariat [à] linneenne-lyon.org

ANNEXE

Quelques taxa publiés et dédiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

INPN, taxon présent à l'Inventaire national du Patrimoine Naturel.

<https://inpn.mnhn.fr/>

IPNI (International Plant Name Index). <https://www.ipni.org/>

- Le taxon est, soit absent de l'INPN, soit du Gbif, soit des deux.

IPNI International Plant Names Index (<https://www.ipni.org/>)

Les herbiers de la société linnéenne de Lyon, consultables à la société :

<http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article2150>

Herbier général www.linneenne-lyon.org/depot5/herbiergeneral.xlsx

Herbiers les plus récents www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierrecent.xlsx

Herbier Ronot www.linneenne-lyon.org/depot5/herbierronot.xlsx

(-) Ce taxon n'est pas présent dans les herbiers SLL.

Taxons dédiés

Conyza rouyana Sennen, 1905. (*C. naudini* X *Erogeron canadense*). Douteux selon Gbif. = *Erigeron floribundus* (Kunth) Sch.Bip., 1865 (Érigéron très fleuri, Conyze très fleurie, Vergerette à fleurs nombreuses, Vergerette très fleurie). **INPN**. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

Taxons publiés

Achillea millefolium var. *lamotteanum* Rouy, 1903. = *Achillea millefolium* proles *setacea* sensu Rouy, 1903. = ***Achillea millefolium*** L., 1753, p. 899. **INPN**. (Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge). **Herbier SLL : Récolté en Suisse, par Mme Lortet, 1827**. = *Achillea rosea* Desf., 1829. = *Achillea rosea* Desf. ex Poir., 1810, p. 101. = *Achillea serpentini* H.J.Coste & Soulié, 1897. = *Achillea subhirsuta* Gilib., 1782. = *Achillios millefoliatus* St.-Lag., 1884. = *Alitubus millefolium* (L.) Dulac, 1867. = *Achillea ceretana* Sennen, 1916, p. 15. = *Achillea millefolium* proles *ceretana* Sennen, 1916. = *Achillea millefolium* subsp. *ceretana* Sennen. = *Achillea millefolium* subsp. *caroli* Sennen, 1929. = *Achillea millefolium* subsp. *ceretana* (Sennen) Sennen, 1929. = *Achillea millefolium* subsp. *foliosa* Sennen, 1929. = *Achillea millefolium* subsp. *strictifolia* Sennen, 1929. = *Achillea millefolium* subsp. *balearica* Sennen, 1928, p. 215. = *Achillea dentifera* Rchb., 1831, p. 230. = *Achillea pseudotanitifolia* Wierzb. ex Rchb. = *Achillea millefolium* var. *rosea* Gray, 1822, p. 457. = Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

- *Adenostyles villarsii* Rouy, 1903, p. 352. = ***Adenostyles leucophylla*** (Willd.) Reichenbach, 1831, p. 278. **Herbier SLL : récolté à Chamrousse, Isère, par Mme Lortet, 1820**. = *Adenostyles alliariae* subsp. *hybrida* (Vill.) Tutin, 1973, p. 282. = *Cacalia tomentosa* Vill., 1779, p. 31. = *Adenostyles hybrida* (Vill.) DC., 1836, p. 204. = *Adenostyles petasites* subsp. *hybrida*

- (Vill.) Arcang., 1882, 1882. = *Adenostyles tomentosa* (Vill.) Schinz & Thell., 1907, p. 578. = *Cacalia tomentosa* var. *hybrida* (Vill.) Cariot & St.-Lag., 1889. = *Cacalia leucophylla* var. *hybrida* (Vill.) Steud., 1821. = *Cacalia tomentosa* var. *hybrida* Vill., 1786. = *Senecio tomentosus* (Vill.) Clairv., 1811, p. 240.
- Adonis autumnalis* var. *micrantha* (DC.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Adonis autumnalis* var. *pygmaea* Rouy & Foucaud, 1893. = *Adonis annua* subsp. *autumnalis* (L.) Maire & Weiller, 1964, p. 213. = *Adonis annua* subsp. *baetica* (Coss.) Maire & Weiller, 1964, p. 213. = *Adonis annua* var. *baetica* (Coss.) Maire, 1930, p. 53. = *Adonis annua* var. *coccinea* Maire & Wilczek, 1934, p. 287. = ***Adonis annua*** L., 1753, *Sp. Pl.* : 547. **INPN.** (Adonis annuel, Adonis d'automne, Goutte-de-sang). **Herbier SLL. Récolté dans les Alpes dauphinoise, Isère, par Mme Lortet, 1820.** = *Adonis linnaei* Sennen, 1926, p. 54. = *Cosmarium autumnale* Dulac, 1867, p. 215. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
- Aethionema saxatile* R. Br. subsp. *ovalifolium* (Boissier) Rouy & Foucaud
- Agrostemma githago* var. *nicaeensis* (Pers.) Rouy & Foucaud, 1896. = *Githago segetalis* St.-Lag., 1880, p. 119. = *Lychnis segetalis* St.-Lag., 1889, p. 113. = *Agrostemma hirsutum* Gilib., 1782, p. 173. = ***Agrostemma githago*** L., 1753, p. 435. (Nielle des blés, Lychnis nielle, Lychnide nielle). **INPN. Herbier SLL : Don de Dériard le 13 janvier 1823. Récolté à Aveize, Rhône par les Maristes, mai 1876. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, juin 1880. ; à Souclin, Ain par Mérit, juin 1925. ; à Vaux-en-Velin, Rhône par Boudet, juin 1942. ; à Charbonnières-les-Bains, Rhône par Espine, mai 1969. ; à Champillet, Indre par Boudet, ? Récolté à Avançon, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1992. Récolté : à Cuisery, saône-et-Loire par Coquillat, juin 1942. ; à Lalley, Isère par Borel, juillet 1970. ; à Yssingaux, Haute-Loire par Desmure, juin 1988. ; à ? par Gianquinto, ?** Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Agrostis alba* f. *prorepens* Rouy, 1913. = *Agrostis scabrida* Maire et Trabut, in Maire, 1924b, p. 144. = ***Agrostis stolonifera*** L., 1753. **INPN.** (Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère). = *Agrostis alba* subsp. *scabrida* (Maire & Trab.) Maire ex Jah. & Maire, 1931, p. 40. = *Agrostis alba* var. *stenantha* Maire & Trab., 1924d, p. 393. = *Agrostis alba* var. *cedretorum* Maire & Trab., 1924d, p. 393. = *Agrostis alba* var. *jahandieziana* Litard. & Maire, 1930b, p. 42. = *Agrostis alba* var. *longipaleata* Maire & Trab., 1932a, p. 218. = *Agrostis stolonifera* subsp. *scabrida* (Maire & Trab.) Maire, 1940a, p. 47. = *Agrostis alba* subsp. *prorepens* (Koch) Asch. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Agrostis canina* f. *decipiens* (H.J.Coste & Soulié) Rouy, 1913. = *Agrostis canina* var. *decipiens* (H.J.Coste & Soulié) Bonnier, 1931. = *Agrostis decipiens* Coste & Soulié. = *Agrostis decipiens* Coste & Soulié. = *Agraulus pallidus* (With.) Gray, 1833, p. 149. = ***Agrostis canina*** L., 1753, p. 62. **INPN.** (Agrostide des chiens, Agrostide canine, Traînasse, Agrostis des chiens). **Herbier SLL : Récolté à Saint-Genis-Laval, Rhône, 1813.** = *Agrostis canina* var. *nobilis* (De Not.) Ces., Pass. & Gibelli, 1861. = *Agrostis canina* var. *nobilis* (DeNot.) Arcang., 1882, p. 769. = *Agrostis canina* var. *pallida* Rchb., 1834. = *Agrostis canina* var. *pallida* Rchb., 1834. = *Agrostis canina* var. *pallida* Rchb., 1834. = *Agrostis nobilis* De

- Not. = *Agrostis stricta* De Not. = *Agrostis stricta* De Not. ex Parl., 1850, p. 187. = *Agrostis canina* var. *nobilis* (De Not.) Ces., Pass. & Gibelli, 1861. = *Agrostis canina* var. *nobilis* (DeNot.) Arcang., 1882, p. 769. = *Agrostis nobilis* De Not. ; De Not. ex Parl., 1850, p. 186. = *Agrostis violaceopurpurea* Gilib., 1782, p. 525. = *Agrostis vulgaris* var. *varians* (Thuill.) Poir., 1810. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Agrostis verticillata* f. *frondosa* (Ten.) Rouy, 1913. = *Agrostis verticillata* Vill., 1779, p. 16. = *Agrostis alba* var. *verticillata* (Vill.) Pers., 1805, p. 76. = *Agrostis stolonifera* var. *verticillata* (Vill.) DC., 1805. = *Agrostis villarsii* Poir. in Lamarck, 1810, p. 251. = ***Polypogon viridis*** (Gouan) Breistr., 1966, p. lxxxix. **INPN.** (Polypogon vert, Polypogon vrai). = *Agrostis verticillata* var. *acutiglumis* Costa, 1864. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Ajuga vulgaris* subsp. *alpina* (L.) Rouy, 1909. = *Ajuga vulgaris* subsp. *genevensis* (L.) Rouy, 1909. = ***Ajuga genevensis*** L., 1753. (Bugle de Genève). **INPN.** **Herbier SII : Récolté à Roye, somme par Roffavier, mai 1800. ; aux Brotteaux, Lyon, Rhône par Roffavier, septembre 1816. ; en Suisse par Mme Lortet, juillet 1827. ; à Alby-sur-chéran, Haute-Savoie par Pollier mai 1888 ; à Rillieux la Pape, Rhône par Ecole normale du Rhône, juin 1899. ; à Vaux-en-velin, Rhône par Boudet, mai 1927. = à Parves-et-Nattages, ain par Mérit, mai 1933. ; à Chuzelles, Isère par Espine, avril 1967. Récolté à Pusignan, Rhône par Coquillat, mai 1941. ; à Montessuy, Caluire-et-Cuire, Rhône par Coquillat, mai 1945 et juillet 1956. ; à Maisse, Essonne par Kraft, mai 1956. ; à Thonon-les-Bains, Haute-Savoie par Gianquinto, mai, 1959. ; à la Motte-d'Aveillans, Isère par Borel, mai 1971. ; à Charette, Isère par Coquillat, avril 1980. ; à ? par Coquillat-2, ? (2 exemplaires). Récolté à Chamrousse, Isère, par Ronot, mai 1971. ;. à la Louvesc, Ardèche par Ronot, juillet 1974. ;; à Valgaudemar, Hautes-Alpes, par Ronot, mai 1992. ; à Lyon, 8e, Rhône, avril 1994. = *Ajuga genevensis* var. *Cariot & St.-Lag.*, 1889. = *Ajuga genevensis* var. *longistyla* Cariot & St.-Lag., 1889. = *Ajuga interrupta* Dulac, 1867. = *Bugula tomentosa* Gilib., 1782. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.**
- Alnus glutinosa* f. *oblongata* (Willd.) Rouy, 1910. = ***Alnus glutinosa*** (L.) Gaertn., 1790, p. 54. = *Alnus communis* Desf., 1804 = *Pavia lutea* (Wangenh.) Poir. = *Alnus glutinosa* f. *macrocarpa* Req. CultivéC dans le Rhône, absence de date.
- Alsine Bauhinorum* Gay = ***Cherleria laricifolia*** (L.) Iamónico, 2016, p. 611. **INPN.** = *Alsine laricifolia* var. *villosissima* Rouy & Foucaud, 1896. = *Sabulina laricifolia* (L.) Rchb., 1832, p. 789. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Anagallis micrantha* Rouy. = *Anagallis mas* Vill., 1787, p. 461. = *Anagallis arvensis* L., 1753, p. 148. **Don par Foudras le 13 janvier 1823 = *Lysimachia arvensis*** subsp. *arvensis*. (Lysimaque des champs, Mouron rouge, Mouron des champs, Fausse morgeline). **INPN.** Magnoliopsida, Ericales, Primulaceae.
- Anemone albiflora* Rouy & Foucaud, 1893. = *Anemone nobilis* Jord., 1860. = *Anemone praestabilis* Jord., 1860. = *Anemone rissoana* Jord., 1860. = *Anemone coccinea* Jord., 1860. = *Anemone cyanea* Risso, 1844, p. 7. Pl., P^e. Geny, pinxit. = ***Anemone coronaria*** L., 1753, p. 539. (Anémone

couronnée, Anémone Coronaire, Anémone de Caen). **INPN. Herbar SLL :** Récolté à Hyères, Var par Balbis en février 1829. ; à Nice par Balbis en ? ; à Grasse, Alpes-Maritimes par les frères Maristes en avril 1865. ; à le Luc, Var par les frères Maristes en avril 1866. ; dans le Var par les frères Maristes en février 1870. ; à Mascara, Algérie par Boudet en avil 1933. ; à Hyères, Var par Hervé-Bazin en mars, 1967. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.

Antennaria dioica var. *discolor* Rouy, 1903. = *Antennaria dioica* var. *hyperborea* (D.Don) DC. = ***Antennaria dioica*** (L.) Gaertn., 1791, p. 410. (Antennaire dioïque, Patte-de-chat, Pied-de-chat dioïque, Gnaphale dioïque, Hispidule). **INPN. Herbar SLL :** Récolté au Mont Thou, Rhône par Mme Lortet, juin 1806. ; à Cerdon, Ain par Balbis, juin, 1821. ; à Grenoble, Isère par Balbis, juin 1830. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, mai 1881. ; à St-Michel-de-Chaillol, Hautes-Alpes par les frères Maristes, juillet 1883. ; au Pilat, Loire par Mérit, juin 1925. ; à Arvieux, Hautes-Alpes par Boudet, août 1961. ; à l'Espérou, Gard par Boudet, absence de date. ; à Luz-la-Croix-Haute, Drôme par Espine, juin 1968. = *Antennaria dioica* var. *borealis* E.G.Camus, 1892. = *Antennaria dioica* var. *gallica* E.G.Camus, 1892. = *Antennaria hibernica* Braun-Blanq., 1952, p. 298. = *Antennaria microphylla* Gand., 1887. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

Anthoxanthum odoratum subsp. *corsicum* (Briq.) Rouy. = *Anthoxanthum odoratum* var. *corsicum* (Briq.) Rouy, 1913, p. 36. = *Anthoxanthum odoratum* var. *foucaudii* (Briq.) Rouy, 1913. = *Anthoxanthum odoratum* var. *marsillyanum* (Briq.) Rouy, 1913. = *Anthoxanthum odoratum* subsp. *alpinum* Gray. = *Anthoxanthum odoratum* var. *effusum* Gray, 1822, p. 135. = *Anthoxanthum odoratum* var. *pubescens* Gray= ***Anthoxanthum odoratum*** L., 1753, p. 28. (Flouve odorante). **INPN. Herbar SLL :** récolté à Neyron, Ain par Balbis, avril 1822. ; à Neyron, ain par Roffavier. ; à Tassin-la-Demi-Lune, Rhône par Roffavier, juin 1827. ; à Limonest, Rhône par Roffavier, ? ; à Aveize, Rhône par Les Maristes, juin 1875. ; à Modane, Savoie par Coquillat, juin 1953. ; à ?, Isère par Espine, avril 1967. ; à Ste-Foy-lès-Lyon, Rhône par Boudet, juin 1975. ; à ?, ? par Valuy, ? Récolté au plateau des Glières, Haute-Savoie pat Ronot, juin 1997. ; au Luc, Var, mai 1899. ; à Arbigny, Ain, par Ronot, mai 2001. Récolté à Crémieu, Isère par Coquillat, avril 1944. ; ; Vallée de l'Yseron, Rhône par coquillat, juin 1953. ; à l'étang de Rama, Siccieu-St-Julien-et-Carisieu, Isère par Borel, mai 1972. ; à ?, ? par Gianquinto, ?. = *Anthoxanthum odoratum* var. *triaristatum* Beck, 1890. = *Anthoxanthum odoratum* var. *nanum* DC., 1815, p. 247. = *Anthoxanthum odoratum* var. *subramosum* DC., 1815, p. 247. = *Anthoxanthum odoratum* var. *paniculatum* Rchb., 1830. = *Xanthoanthos odoratus* (L.) St.-Lag., 1881, p. 189. Liliopsida, Poales, Poaceae. *Aphorais* Gray, 1847. = *Apporhais* Gray, 1852. = *Apporrhais* Gray, 1838. ***Aporrhais*** da Costa, 1778a. **INPN.** Gastropoda, Littorinimorpha, Aporrhaidae.

•*Anthriscus sylvestris* proles *alpestris* (Wimm. & Grab.) Rouy & E.G.Camus, 1901 = *Anthriscus sylvestris* proles *cicutaria* (Duby) Rouy & E.G.Camus, 1901. = *Anthriscus sylvestris* subsp. *candollei* Rouy & E.G.Camus, 1901.

= *Anthriscus nitida* (Wahlenb.) Hazsl., 1864. **INPN**. (Anthrisque luisant, Cerfeuil lustré). **Herbier SLL : Récolté en Suisse, par Mme Lortet, 1827.** = *Anthriscus sylvestris* subsp. *faurei* Sennen, 1936. = *Anthriscus abortiva* Jord., 1849. = *Anthriscus faurei* Sennen = *Anthriscus sylvestris* var. *alpestris* (Wimm. & Grab.) Gren. & Godr., 1848. Apiales, Apiaceae.

Aquilegia alpina var. *minor* Rouy & Foucaud, 1895, p. 322. = ***Aquilegia alpina* L., 1753, *Sp. Pl.* : 533. **INPN**.** (Ancolie des Alpes, Cornette des Alpes). **Herbier SLL : Récolté au Mont Chamoux, La Salette-Fallavaux, Isère par Mme Lortet, juillet 1827. ; au Mont-Ventoux, Vaucluse par les Maristes, juillet 1875. ; au Mont Chamoux, La Salette-Fallavaux, Isère par Mérit, juillet 1937. ; Massif de Belledone, Isère par Espine, août 1969. ; au Mont Cenis, Savoie par Valuy ? Récolté au col du Lautaret, Hautes-Alpes par Coquillat, juin 1935. ; au col de l'Iseran, Savoie par Coquillat, juillet 1959. ; à Chantelouve, Lanslevillard, Savoie par Gianquinto, juillet 1975. ; à Lanslevillard, Savoie par Borel, juillet 1979. Récolté aux Escreins, Vars, Hautes-Alpes par Ronot, juillet 1975. ; à Valpréveyre, Abriès, Hautes-Alpes par Ronot, juillet 1976.** = *Aquilegia alpina* f. *gracilis* Chenevard & Braun-Blanq., 1909, p. 483. = *Aquilegia alpina* var. *minor* Rouy & Foucaud, 1895, p. 322. = *Aquilegia sternbergii* Rchb., 1832, p. 749. = *Aquilegia vulgaris* f. *sternbergii* (Rchb.) Rapaics, 1909, p. 134. = *Aquilegia vulgaris* var. *sternbergii* (Rchb.) Baker, 1878, p. 76. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.

Arabis auriculata var. *dasycarpa* (Andrz.) Rouy & Foucaud, 1893. = ***Arabis nova* Vill., 1779, p. 39.** (Arabette nouvelle, Arabette des rochers). **INPN.** **Herbier SLL. Récolté au Mont-Ventoux, Vaucluse par Aunier, mai 1826. ; au Mont Coudon, Var par Jordan, mai 1843. ; à la Grande Sure, Chartreuse, Isère par les Maristes, mai 1864. ; au Mont-Ventoux, Vaucluse par Mérit, mai 1935. ; au Roc de Touleau, Léoncel, Drôme par Espine, juin 1969. ; à ? par Valuy, date absente.** = *Turritis nova* (Vill.) Vill., 1786, p. 351. ; *Arabis saxatilis* f. *latiorifolia* Pau, 1930, p. 198. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.

Arenaria ciliata var. *longipes* Rouy, 1896. = *Arenaria ciliata* f. *polycarpoides* Rouy & Foucaud. = *Arenaria ciliata* var. *fugax* Gay ex Gren. = *Arenaria ciliata* var. *fugax* Gay. = *Arenaria ciliata* subsp. *moerhingioides* (Murr) Braun-Blanq., 1927, p. 279. = ***Arenaria ciliata* L., 1753, *Sp. Pl.* : 425. **INPN.**** (Sabline ciliée, Sabline à plusieurs tiges). **Herbier SLL : Récolté en Chartreuse, par Mme Lortet, août 1822. ; au Mont-Cenis, Savoie par Balbis, juillet 1829 et par ?, août 1826. ; à la grande Sure, Chartreuse, Isère par les frères Maristes, juillet 1864. ; au col de la Vanoise, Savoie par Mérit, juillet 1920. ; au col de l'Isoard, Hautes-Alpes par Boudet, août 1967. ; à St-Pierre-de-Chartreuse, Isère par Espine ; août 1969. Récolté à la Clarée, Névache, Hautes-Alpes par Coquillat, juin 1936. ; au col de l'Isoard, Hautes-Alpes par Coquillat, janvier 1901. = au col des Aravis, Haute-Savoie par Coquillat, août 1945. ; au Mont Sénépy, Isère par Borel, août 1979. Récolté au grand Veymont, Gresse-en-Vercors, Isère par Ronot, juillet 1981. ; au col de la Bornette, Alpes-de-Haute-Provence par Ronot, juillet 1996. ; au massif du Grossglockner, Autriche par Ronot, juillet 1999. ; au cirque de Troumousse, Hautes-Pyrénées par Ronot, juillet 2001.** Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.

Arenaria serpyllifolia L. subsp. *leptoclados* Rouy & Foucaud

Arenaria serpyllifolia L. var. *viscidula* Rouy & Fouc.

• *Armeria bupleuroides* var. *reducta* Rouy, 1908, p. 174. = *Armeria montana* var. *stenophylla* Rouy, 1906, p. 166. = *Armeria plantaginea* (All.) Willd. var. *brachylepis* Battandier. = ***Armeria alliacea*** (Cav.) Hoffmanns. & Link, 1817, p. 441. (Armérie alliagée). **INPN**. = *Armeria alliacea* var. *allioides* Pau, 1910, p. 136. = *Armeria alliacea* var. *heterophylla* Pau ; Pau ex Viciosa, 1916, p. 139. = *Armeria matritensis* Pau, 1923, p. 98. = *Armeria sicorisiensis* Sennen = *Armeria montana* f. *sicorisiensis* Sennen, 1926. = *Armeria sabulosa* Jord. = *Armeria segoviensis* Gand., 1890, p. 8. = *Statice sabulosa* Fourr., 1869, p. 141. Magnoliopsida, Caryophyllales, Plumbaginaceae.

Artemisia campestris var. *argyrea* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia campestris* var. *brevicaulis* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia campestris* var. *collina* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia campestris* var. *fuscata* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia campestris* var. *fuscata* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia campestris* var. *monticola* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = *Artemisia campestris* var. *stenoclada* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1903. = ***Artemisia campestris*** L. 1753, p. 846. (Armoise champêtre, Aurone des champs, Armoise rouge). **INPN**. **Herbier SLL : Récolté à Montluel, Ain par Balbis, juin 1821. ; à Montluel, Ain par Valuy, septembre 1821. ; à Oullins, Rhône par Roffavier, septembre 1822. ; à Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme par les Maristes, août 1865. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, septembre 1870. ; à Sathonay, Rhône par Ecole normale du Rhône, septembre 1898. ; à Gerland, Lyon, Rhône par Merit, septembre 1929. ; à Jons, Rhône par Espine, septembre 1966. ; à Franconville, Val d'Oise par Hervé Bazin, septembre 1965. ; Cultivé dans le Rhône par Mme Lortet, septembre 1822. Récolté à Breil-sur Rpya, Alpes-Maritimes par Ronot, septembre 1983. ; à Arvieux, Hautes-alpes par Ronot, septembre 1985. ; à Sarenne, l'Alpe-d'Huez, Isère par Ronot, août 1886. ; à forêt de Finges, Valais Suisse par Ronot, août 1992. ; à Lanchâtra, St-christophe-en-Oisans, Isère par Ronot, août 1996. ; à la grande Motte, Hérault par Ronot, septembre 1999. ; dans les dunes, Soulac-sur-mer, Gironde par Ronot, mai 2004. Récolté au bord du Rhône, Lyon, Rhône par Coquillat, juillet 1963.** = *Absinthium campestre* (L.) Dulac, 1867. = *Oligosporus brachypyllus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus brevicaulis* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus collinus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus erythrocladus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus floribundus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus fuscatus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus griseus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus implexus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus laxatus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus monticola* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus orophilus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus pubescens* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus stenocladius* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus suberectus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus subsericeus* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus tenuifolius* Jord. & Fourr., 1868. = *Oligosporus virescens* Jord. & Fourr., 1868 Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

- Artemisia genipi* f. *eriantha* (Ten.) Rouy, 1903. = *Artemisia genipi* var. *majellensis* Rouy, 1903. = *Artemisia godronii* Rouy. = *Artemisia godronii* Rouy ex E.P.Perrier. = *Artemisia magellensis* Rouy. = *Artemisia villarsii* Grenier & Godron, 1779 ?, p130. = ***Artemisia eriantha*** Tenore, 1830, p. 14. INPN. (Armoise à fleurs laineuses, Génépi blanc, Génépi laineux). Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Asphodelus albus* var. *sphaerocarpus* (Gren.) Rouy, 1910. = *Asphodelus desegleseii* Jord. & Fourr. 1868 (*Brev. Pl. Nov.* ii. 121.). = *Asphodelus deseglisei* Jord. & Fourr., 1868. = ***Asphodelus albus*** Mill., 1768 subsp. ***albus*** (Asphodèle blanc, Bâton royal). INPN. Liliopsida, Asparagales, Asphodelaceae.
- Asphodelus albus* var. *villarsii* (Verl. ex Jord.) Rouy, in Rouy & Foucaud, 1910, p. 338. = *Asphodelus villarsii* Verl. ex Jord., 1864, p. 107. = *Asphodelus macrocarpus* subsp. *Macrocarpus*. = *Asphodelus ambigens* Jordan, 1862, p. 735. = *Asphodelus collinus* Jord. & Four., 1868, p. 123. = *Asphodelus ozanonii* Jord., 1862, p. 333. = *Asphodelus ramosus* subsp. *villarsii* (Verl. ex Jord.) Nyman, 1882, p. 719. = *Asphodelus spicatus* Desf. = *Asphodelus spicatus* Desf. ex Baker, 1876, p. 271. = *Asphodelus villarsii* Verl. ex Jord., 1864, p. 107. Liliopsida, Asparagales, Asphodelaceae.
- Aspidium aculeatum* var. *plukenetii* (Loisel.) Rouy, 1913. = ***Polystichum aculeatum*** (L.) Roth, 1799, p. 79. (Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Neyron, Ain par Balbis, août 1822. ; au Semnoz, Haut-Savoie par Pollier juillet 1884. ; à Gèdre, Hautes-Pyrénées par Boudet, août 1954. ; à Montluel, Ain par Espine, décembre 1966. ; Au Charmant som, Hautes-Alpes par Boudet, juillet 1974. ; au Pelvoux, Hautes-Alpes par Boudet, ? en France, Flora pyreneae par Soulié ? ; Cultivé dans le Rhône par Chauvin, ? Récolté Montagne de l'Epine, Savoie par Ronot, mai 1970. Récolté à Echallon, Ain par Borel, juin 1978 ; à Vaux-en-Bugey, Ain par Coquillat, ?.** = *Dryopteris lobata* (Huds.) Beck, 1918, 113. = *Dryopteris setifera* subsp. *lobata* (Huds.) Maire, 1931. = *Polystichum aculeatum* f. *punctatum* Bonap., 1917. = *Polystichum plukenetii* (Loisel.) DC. Polypodopsida, Polypodiales, Dryopteridaceae. *Astragalus depressus* L. subsp. *helminthocarpos* (Villars) Rouy.
- Astragalus foucaudii* (Gillot) Rouy = *Astragalus lazicus* f. *foucaudii* (Gillot) Rouy, 1899. = *Oxytropis lazica* f. *foucaudii* (Gillot) Rouy, 1899. = ***Oxytropis foucaudii*** Gillot, 1894, p. 47. ; 1895, p. 617. INPN. (Oxytropide de Foucaud, Oxytropis de Foucaud, Astragale de Foucaud). = *Astragalus foucaudii* (Gillot) A.W.Hill Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Astragalus madiotii* Rouy, 1911, p. 298, *Bull. Soc. Bot. Fr.*, 58. = ***Oxytropis madiotii*** Rouy, 1912, p. 515, in Rouy & Foucaud, *Fl. France*.
- Astragalus onobrychis* var. *major* Rouy, in Rouy & Foucaud, 1899, p. 182. = *Astragalus onobrychis* var. *purpurascens* Rchb., 1832, p. 867. = *Astragalus longiflorus* Gilib., 1782, p. 111. = ***Astragalus onobrychis*** L., 1753, p. 760. INPN. (Astragale esparcette, Fausse Esparcette, Astragale sainfoin). **Herbier SLL : Récolté en Suisse, par Mme Lortet, 1808.** = *Astragalus onobrychis* f. *leucanthus* Beck, 1900, p. 110. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.

- Astrocarpus sesamoides* Duby ssp. *purpurascens* (Rafin.) Rouy. = *Astrocarpus clusii* J.Gay.
- *Barbarea gautieri* Rouy & Foucaud, 1895, p. 324. = ***Barbarea intermedia*** Boreau, 1840, p. 48. (Barbarée intermédiaire). **INPN**. = *Barbarea prostrata* J.Gay, 1836. = *Barbarea pyrenaica* Jord., 1864. = *Barbarea vulgaris* var. *transiens* Pau & FontQuer, 1931, p. 276. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- *Bromus villosus* f. *ambigens* (Jord.) Rouy, 1913. = *Bromus villosus* var. *rigidus* Br.-Bl. = ***Bromus rigidus*** Roth, 1790, p. 21. = *Bromus ambigens* Jord., 1855, p. 229. = *Bromus asperipes* Jord., 1855, p. 229. = *Bromus villosus* var. *ambigens* (Jord.) Briq. = *Bromus diandrus* f. *asperipes* (Jord.) Soó, 1972, p. 115. = *Bromus diandrus* var. *ambigens* (Jord.) Asch. & Graebn., 1901. = *Bromus diandrus* var. *maximus* (Desf.) DC., 1813. = *Bromus gussonei* var. *ambigens* (Jord.) Cugnac & Camus. = *Bromus madritensis* var. *maximus* (Desf.) St.-Amans. = *Bromus maximus* Desf., 1798, p. 95. = *Bromus rigidus* var. *maximus* (Desf.) Guépin, 1845. = *Bromus maximus* var. *asperipes* (Jord.) Nyman, 1882. = *Bromus rigens* subsp. *maximus* (Desf.) Cout., 1913. = *Bromus rigidus* f. *asperipes* (Jord.) Maire & Weiller, 1955, p. 235. = *Bromus rigidus* subsp. *ambigens* (Jord.) Pignatti, 1977, p. 59. = *Bromus rigidus* subsp. *maximus* (Desf.) O.Bolòs et al. = *Bromus rigidus* subsp. *maximus* (Desf.) Rothm. & P.Silva, 1939, p. 248. = *Bromus rigidus* var. *maximus* (Desf.) Delastre, 1842. ; (Desf.) Guépin, 1845. = *Bromus rigidus* var. *minor* (Boiss.) Maire, 1941, p. 943. = *Bromus rubens* var. *maximus* (Desf.) Fiori. = *Bromus sterilis* var. *maximus* (Desf.) Kuntze, 1887, p. 250. = *Bromus villosus* f. *rigidus* (Roth) Rouy, 1913. = *Bromus villosus* subsp. *ambigens* (Jord.) Braun-Blanq., 1919. = *Bromus villosus* subsp. *maximus* (Desf.) Rothm. & P.Silva, 1939, p. 248. = *Bromus villosus* subsp. *rigidus* (Roth) Maire, 1931, p. 80. = *Bromus villosus* var. *ambigens* (Jord.) Asch. & Graebn. 1901, p. 595. = *Bromus villosus* var. *ambigens* (Jord.) Asch. & Graebn. = *Forasaccus maximus* (Desf.) Bubani, 1901, p. 392. = *Genea maxima* (Desf.) Dumort., 1868, p. 67. Liliopsida, Poales, Poaceae
- Bupleurum insulare* Rouy & Camus, 1901, p. 316. = *Bupleurum fruticosum* subsp. *insulare* Rouy & E.G.Camus, 1901 = *Bupleurum fruticosum* var. *insulare* (Rouy & E.G.Camus) P.Fourn., 1937. = ***Bupleurum fruticosum*** L., 1753, p. 238. **INPN**. (Buplèvre ligneux, Buplèvre en buisson, Buplèvre buissonnant). **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône, Absence date.**
- Bupleurum stellatum* f. *latifolium* Rouy & E.G.Camus, 1901, p. 318. = *Bupleurum stellatum* f. *majus* Rouy & E.G.Camus, 1901, p. 318. = ***Bupleurum stellatum*** L., 1753, Sp. Pl. : 236. **INPN**. (Buplèvre étoilé). **Herbier SLL : Récolté en Suisse, par Mme Lortet, 1827.** Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- Callitriche occidentalis* Rouy
- Calluna beleziana* Rouy 1895. = *Calluna erica* f. *beleziana* (Rouy) Rouy, 1908. = *Calluna erica* f. *olbiensis* (Albert) Rouy, 1908. = *Calluna erica* var. *condensata* (Lamotte) Rouy, 1908. = *Erica confusa* Gandoger 1875, p. 149. = *Calluna alpestris* Gandoger 1884. = *Calluna brumalis* Gandoger 1884. = *Calluna oviformis* Gandoger 1875. = *Calluna pyrenaica* Gandoger 1884. = *Calluna sancta* Gandoger 1884. = *Calluna*

- testudinaria* Gandoger 1875. = ***Calluna vulgaris*** (L.) Hull 1808. **INPN.** (Callune, Bérue) = *Calluna elegantissima* Sennen 1930. = *Calluna sagittifolia* Gray 1821. = *Calluna sagittifolia* var. *hirsuta* Gray, 1821. = *Calluna vulgaris* var. *hirsuta* (Gray) Rouy, 1908. *Calluna vulgaris* var. *pubescens* W.D.J.Koch = *Erica lutescens* K.Koch. = *Erica glabra* Gilibert 1782. = *Erica nana* K.Koch. = *Erica prostrata* K.Koch. = *Erica reginae* K.Koch. = *Erica vulgaris* L. 1753. = *Calluna vulgaris* f. *alba* (Weston) Braun-Blanquet 1926. = *Calluna vulgaris* f. *purpurea* (G.Don) Braun-Blanquet 1926. Magnoliopsida, Ericales, Ericaceae.
- Campanula rotundifolia* f. *bocconi* (Vill.) Rouy, 1908. = *Campanula rotundifolia* var. *major* (Timb.-Lagr.) Rouy. = *Campanula legionensis* Pau, 1928, p. 65. = *Campanula scheuchzeri* Vill. subsp. *lanceolata* (Lapeyr.) J.-M. Tison, 2010, p. 113. (Campanule lancéolée, Campanule à feuilles de lin, Campanule droite). **INPN. Herbière SLL. Récolté à champagneux, Savoie par Commandeur, septembre 1920. ; au Pelvoux, Hautes-alpes par Boudet, août 1953.** = ***Campanula rotundifolia*** L. = *Campanula bocconeii* Vill., 1786, p. 304. = *Campanula caballeroi* Sennen & Losa, 1936, p. 276. = *Campanula filiformis* Gilib., 1781, p. 53. = *Campanula rotunda* Gilib., 181, p. 46. = *Campanula pubescens* Rchb. Magnoliopsida, Asterales, Campanulaceae.
- ***Carduus xgillotii*** Rouy, Soc. ét. Fl. Franc. Helv. = *Carduus gillotii* Rouy, 1905, p.87. Fl. France [Rouy & Foucaud], 9. = *Carduus xnuriensis* Sennen, 1930, p. 106. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Carex ammophila* var. *longiculmis* (Willk.) Rouy, in Rouy & Foucaud, 1912, p. 405. = *Carex divisa* Huds. var. *platyphylla* Braun-Blanquet & Trabut, 1925, p. 170. = ***Carex divisa*** Huds., 1762, p. 348. **INPN.** (Laîche divisée, Laîche d'Oeder) = *Carex divisa* var. *setifolia* (Fourr.) Trabut, 1895, p. 107. = *Carex fontanesii* Poiret, Lamark de J.B.A.M. 1813, p. 257. = *Carex schoenoides* Desfontaines, 1799, p. 336. Liliopsida, Poales, Cyperaceae.
- Carex insulana* (Rouy) Prain, 192. = *Carex caryophyllea* f. *insulana* Rouy, 1912. = *Carex verna* var. *pedunculata* Beck, 1890. = ***Carex caryophyllea*** Latourr., 1785, p. 27. **INPN.** (Laîche caryophyllée, Laîche printanière, Laîche du printemps). Liliopsida, Poales, Cyperaceae.
- Chaerophyllum cicutaria* subsp. *villarsii* (W.D.J.Koch) Rouy & E.G.Camus, 1901. = *Chaerophyllum cicutaria* subsp. *villarsii* (W.D.J.Koch) Rouy & E.G.Camus, 1901. = *Cerastium pumilum* subsp. *geniculatum* (Braun-Blanq.) Maire, 1932, p. 197. = *Cerastium semidecandrum* subsp. *dentatum* (Möschl) Maire & Weiller, 1963, p. 219. = *Cerastium semidecandrum* subsp. *linnaeanum* Maire & Weiller, 1963, p. 218. = *Carex divisa* var. *setifolia* (Fourr.) Trabut, 1895, p. 107. = ***Chaerophyllum villarsii*** W.D.J.Koch, 1837. **INPN.** (Cerfeuil de villard, Chérophylle de Villars). = *Chaerophyllum hirsutum* subsp. *villarsii* (W.D.J.Koch) Bonnier & Layens, 1894. = *Chaerophyllum hirsutum* sensu H.J.Coste non Gren. & Godr. Equisetopsida, Apiales, Apiaceae.
- Centaurea jacea* f. *scopulicola* Rouy, in Rouy & Foucaud, 1905, p. 122. = *Centaurea scopulicola* (Rouy) Soest, 1947, p. 77. = ***Centaurea jacea*** L., 1753, Sp. Pl. : 914. **INPN.** (Centauree jacée, Tête de moineau, Ambrette).

- Herbier SLL : Récolté à Oullins, Rhône, 1808.** Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Cerastium quaternellum* var. *octandrum* (Moris) Rouy & Foucaud, 1896. = ***Moenchia erecta*** (L.) P. Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799. **INPN.** (Moenchie dressée, Moenchie commune, Céraiste dressé). **Herbier SLL : Récolté à Saint-Genis-Laval, Rhône, par Mem C. Lortet, 1802.** = *Cerastium glaucum* var. *octandrum* (Moris) Gren. & Godr., 1848. = *Cerastium glaucum* Gren., 1841. = *Malachium erectum* (L.) Gren., 1839. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Cerastium semidecandrum* var. *abortivum* (Coss. & Germ.) Rouy & Foucaud, 1896. = *Cerastium semidecandrum* var. *arenarium* (Ten.) Rouy & Foucaud, 1896. = *Cerastium semidecandrum* var. *parviflorum* Rouy & Foucaud, 1896. = *Cerastium geniculatum* Br.-Bl., 1922, p. 15. = ***Cerastium semidecandrum*** L., 1753, p. 438. **INPN.** (Céraiste à cinq étamines, Céraiste variable) = *Cerastium breviflorum* Gilibert, 1782, p. 158. = *Cerastium pumilum* subsp. *geniculatum* (Braun-Blanq.) Maire, 1932, p. 197. = *Cerastium semidecandrum* subsp. *dentatum* (Möschl) Maire & Weiller, 1963, p. 219. = *Cerastium semidecandrum* subsp. *linnaeanum* Maire & Weiller, 1963, p. 218. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Cirsium eriophorum* var. *richterianum* (Gillot) Rouy, 1904. = *Cirsium xgrandiflorum* var. *legrandii* (Sennen) Rouy, 1904. = *Cirsium corbariense* var. *involucratum* Sennen, 1902. = *Cirsium legrandii* Sennen, 1903, p. 8. = ***Cirsium richterianum*** Gillot, 1881, p. li. **INPN.** (Cirse de Richter) = *Cirsium eriophorum* subsp. *richterianum* (Gillot) Nyman, 1889. = *Cirsium turbinatum* H.J.Coste, 1903. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Clematis flammula* f. *maritima* (L.) Rouy & Foucaud, 1893. = ***Clematis flammula*** L., 1753 **INPN.** (Clématite flammette, Clématite brûlante, Clématite flamme, Clématite odorante). **Herbier SLL : 1. Récolté par Balbis, 1830. 2. Cultivé dans le Rhône par Madiot, absence date.** = *Clematis diversifolia* Gilib., 1792, p. 883. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
- ***Conopodium stenocarpum*** Rouy & E.G.Camus, 1901, p. 312. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
 - *Crupina vulgaris* f. *brachypappa* (Jord. & Fourr.) Rouy, 1905. = *Crupina brachypappa* Jord. & Fourr., 1868, p. 85. = *Crupina crupinastrum* subsp. *brachypappa* (Jord. & Fourr.) Beauverd, 1912. = *Crupina vulgaris* subsp. *brachypappa* (Jord. & Fourr.) Beauverd, 1912. = *Crupina alpestris* Arv.-Touv., 1879, p. 39. = ***Crupina vulgaris*** Cass., 1817, p. 68. **Herbier SLL : Récolté à vassieux-en-vecors, Drôme, par Mme Lortet, 1806.** = *Crupina vulgaris* var. *alpestris* (Arv.-Touv.) Douin, 1923. = *Serratula crupina* (L.) Vill. 1879, p. 38. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Daphne cneorum* proles *verlotii* (Grenier) Rouy, 1910. = *Daphne cneorum* var. *verlotii* (Grenier) Meisn., 1856. = *Daphne cneorum* subsp. *verlotii* (Grenier) Nyman, 1881. = *Daphne verlotii* Grenier & Godron, 1856. = *Daphne rhodanica* Gandoger 1875, p. 195. (Daphné du Rhône). = ***Daphne cneorum*** L. 1753. **INPN.** (Daphné camélée, Thymélée). = *Daphne alpestrivaga* Gandoger 1875. = *Daphne orogenes* Gandoger

1875. = *Daphne brigantiaca* Gandoger 1875. = *Daphne chamaebuxus* Gandoger 1875. = *Daphne bellojocensis* Gandoger, p. 196. (Daphné du Beaujolais). Magnoliopsida, Malvales, Thymeleaceae.
- Daphne laureola* subsp. *philippi* (Grenier) Rouy 1927. = *Daphne laureola* f. *philippi* (Grenier) Rouy, 1910. = *Daphne laureola* subsp. *philippi* (Grenier) Nyman, 1881. = *Daphne laureola* var. *philippi* (Grenier & Godron) Meisn. 1857. = *Daphne philippi* Grenier & Godron 1853. = *Daphne kabylica* Chabert 1889. = *Daphne pycnophylla* Gandoger 1875, p. 195. (Daphné à feuilles serrées). = ***Daphne laureola*** L. 1753. = *Daphne arvernensis* Gandoger 1875, p. 195. (Daphné d'Auvergne). = *Daphne lapeyrousii* Gandoger 1884. = *Daphne kabylica* Chabert 1889. Magnoliopsida, Malvales, Thymeleaceae.
- Digitalis gyspergerae* Rouy, 1903, p. 137. = *Digitalis purpurea* f. *humilis* (Rouy) K.Werner, 1960, p. 230. = *Digitalis mauretanica* (Humbert & Maire) Ivanina, 1955, p. 227. = *Digitalis purpurea* f. *humilis* (Rouy) K.Werner, 1960, p. 230. = *Digitalis purpurea* subsp. *gyspergerae* (Rouy) Rouy, 1909. = *Digitalis purpurea* var. *gyspergerae* (Rouy) Fiori, 1926, p. 353. ; (Rouy) P.Fourn., 1937. = *Digitalis purpurea* var. *humilis* Rouy, 1909, p. 100. ***Digitalis purpurea*** L., 1753, p. 621. (Digitale pourpre, Gantelée, Gant de Notre-Dame). **Herbier SLL : 1. Récolté à Vaugneray, Rhône, par M. C. Lortet, 1823. 2. Récolté à Thurins, Rhône, par Mme C. Lortet, absence de date.** Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae.
- Diplotaxis humilis* var. *delphinensis* Rouy, 1882. = ***Brassica repanda*** (Willd.) DC., 1821, p. 598. (Chou étalé, Érucastre étalé). **INPN.** = *Brassica saxatilis* subsp. *repanda* (Willd.) Maire. = *Diplotaxis nevadensis* Jord., 1864, p. 190. = *Diplotaxis repanda* (Willd.) Gren. & Godr., 1847, p. 79. = *Diplotaxis saxatilis* subsp. *repanda* (Willd.) Braun-Blanq., 1919. Brassicaceae.
- Draba aizoides* f. *affinis* (Host) Rouy & Foucaud, 1895. = *Draba candollei* Rouy & Foucaud, 1895, p. 208. = *Draba grassensis* Rouy & Foucaud, 1895, p. 209. = *Draba aizoides* f. *candollei* Rouy & Foucaud, 1895. = *Draba aizoides* f. *grassensis* Rouy & Foucaud, 1895. = *Draba aizoides* var. *laevipes* Rouy & Foucaud, 1895. = *Aizodraba aizoides* (L.) Fourr., 1868, p. 335. = *Aizodraba saxigena* Fourr., 1868, p. 335. = *Draba aizoides* St.-Lag., 1880, p. 125. = ***Draba aizoides*** L., 1767, p. 91. **INPN.** (Drave faux aizoon). **Herbier SLL : Récolté à La Balme-les-Grottes, par Mme Lortet, 1830.** = *Draba aizoides* subsp. *saxigena* (Jord.) Braun-Blanq., 1933. = *Draba alpestris* Jord., 1864, p. 204. = *Draba saxigena* Jord., 1864, p. 203. = *Draba stylosa* Dulac, 1867, p. 192. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.
- Doronicum ambiguum* Rouy, 1903, p. 52. = *Doronicum grandiflorum* f. *ambiguum* Rouy, 1903. = *Doronicum grandiflorum* f. *approximatum* Rouy, 1903. = *Doronicum grandiflorum* f. *viscorum* (Freyn & Gaut.) Rouy, 1903. = *Aronicum latifolium* Rchb., 1831, p. 234. = *Doronicum portae* Chabert. = *Doronicum porteii* Chabert. = ***Doronicum grandiflorum*** Lam., 1786, p. 313. **INPN.** (Doronic à grandes fleurs). = *Aronicum scorpioideum* (Scop.) St.-Lag., 1880, p. 119. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae. *Eruca sativa* Lamark var. *longirostris* (Uechtr.) Rouy

Epilobium parviflorum var. *maritimum* (H.Lév.) Rouy & E.G.Camus, 1901. = *Epilobium parviflorum* var. *verticillatum* (Coss. & Germ.) Rouy & E.G.Camus, 1901. = *Epilobium parviflorum* var. *lanuginosum* Sennen, 1928, p. 38. = *Epilobium parviflorum* var. *intermedium* Rouy & E.G.Camus, 1901. = *Epilobium numidicum* (Batt.) Batt. = ***Epilobium parviflorum*** Schreb., 1771, 146. **INPN.** (Épilobe à petites fleurs). **Herbier SLL : Récolté à Oullins, Rhône, 1829.** = *Epilobium parviflorum* var. *numidicum* Batt., 1896, p. 478. = *Epilobium xcaballeroi* Pau, 1922, p. 59. Magnoliopsida, Myrtales, Onagraceae.

Epilobium tetragonum f. *leveilleianum* Rouy & E.G.Camus, 1901 = *Epilobium tetragonum* var. *lucidum* Rouy & E.G.Camus, 1901. = *Epilobium obscurum* Rchb., 1824, p. 89. = *Epilobium gillotti* Léveillé, 1896, p. 21. *Le monde des plantes*, VI. *Bull. Assoc. Franc. Bot.*, p. 13. = *Epilobium tetragonum* subsp. *gillottii* Léveillé, 1896, p. 21. = *Epilobium miguelense* Léveillé, 1894, p. 91. = ***Epilobium obscurum*** Schreb., 1771, p. 147. **INPN.** (Épilobe à feuilles sombres, Épilobe obscur, Épilobe vert foncé, Épilobe foncé). = *Epilobium purpurascens* Gilib., 1782, p. 189. = *Epilobium ramosissimum* Gren. & Godr., 1848p. 579. = Magnoliopsida, Myrtales, Onagraceae.

Eragrostis vulgaris subsp. *major* (Host) Rouy, 1913. = *Eragrostis poaeoides* var. *megastachya* (Koeler) A.Gray, 1856. = *Eragrostis poooides* subsp. *megastachya* (Koeler) A.Gray = *Eragrostis megastachya* var. *elongata* Sennen & Pau = ***Eragrostis cilianensis*** (All.) Janch., 1907, p. 110. **INPN.** (Éragrostide de Cigliano, Grand éragrostis, Éragrostide Amourette, Grande éragrostide, Éragrostis de Cigliano). **Herbier SLL : Récolté à Saint-Genis-Laval, par Mme C. Lortet, 1819.** = *Eragrostis cilianensis* var. *leersioides* (C.Presl) Maire, 1941, p. 935. = *Eragrostis cilianensis* f. *leersioides* (C.Presl) Maire, 1953, p. 175. = *Eragrostis cilianensis* var. *major* (Host) Maire, 1941. = *Eragrostis cilianensis* f. *megastachya* (Koeler) Maire & Weiller 1953, p. 175. = *Eragrostis multiflora* subsp. *cilianensis* (All.) Maire. = *Eragrostis multiflora* var. *cilianensis* (All.) Maire, 1939, p. 369. = *Eragrostis multiflora* var. *cilianensis* (All.) Maire, 1939, p. 369. = *Eragrostis minor* var. *major* (Host) Beck, 1890. = *Eragrostis pappii* Gand., 1920. = *Eragrostis minor* var. *major* Beck, 1890, p. 118. = *Eragrostis minor* var. *major* Beck, 1890, p. 118. = *Eragrostis monodii* A.Camus, 1958, p. 97. Liliopsida, Poales, Poaceae.

Erigeron alpinus var. *hirsutus* Rouy. = ***Erigeron alpinus*** L., 1753, p. 864. **INPN.** (Érigéron des Alpes, Vergerette des alpes). Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.

Erysimum hieracifolium subsp. *pannonicum* Rouy & Foucaud, 1895. = ***Erysimum odoratum*** Ehrh., 1792, p. 157. **INPN.** (Vélar odorant). = *Erysimum strictum* DC., 1824, p. 197. = *Erysimum dubium* (Hornem.) DC., 1821, p. 504. **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône par Madiot, absence date.** Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.

Euonymus latifolius var. *grandifolius* Rouy & Foucaud, 1897, p. 160. = *Euonymus latifolius* var. *parvifolius* Rouy & Foucaud, 1897, p. 160. = *Euonymus latifolius* var. *eximius* Beck, 1921, p. 451. = ***Euonymus latifolius*** (L.) Mill., 1768. **INPN.** (Fusain à feuilles larges). **Herbier SLL :**

- Cultivé dans le Rhône par Madiot, absence date. Magnoliopsida, Celastrales, Celastraceae.
- Fagus sylvatica* proles *tortuosa* Rouy, 1910. = *Fagus sylvatica* f. *tortuosa* Rouy, 1910. = *Fagus sylvatica* L. (f. *purpurea* Aiton) = ***Fagus sylvatica*** L., 1753, p. 998. **INPN.** (Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau). = *Fagus comptoniifolia* Desf., 1815, p. 269. = *Fagus echinata* Gilib., 1792, p. 396. = *Fagus sylvatica* var. *quercoides* (Pers.) DC. **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône par Madiot, absence date.** Magnoliopsida, Fagales, Fagaceae.
- Ficaria degeni* Hervier, 1905, p. 27. = ***Ficaria ficariiformis*** (Rouy & Foucaud) A.W.Hill = *Ficaria verna* **subsp.** *grandiflora* (Robert) Hayek, 1924. (Ficaire à grandes fleurs). **INPN.** = *Ficaria verna* f. *disjuncta* Pau, 1924, p. 272. = *Ficaria verna* subsp. *africana* Pau. = *Ranunculus ficaria* subsp. *ficariiformis* Rouy & Foucaud, 1930, p. 59. = *Ficaria verna* subsp. *ficariiformis* (Rouy & Foucaud) Maire, 1930, p. 59. = *Ficaria verna* var. *grandiflora* (Robert) Rchb. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
- Fraxinus angustifolia* var. *obtusata* Rouy & Foucaud 1897. = *Fraxinus excelsior* f. *australis* (Cambess.) Rouy, 1897. = *Fraxinus angustifolia* var. *obtusata* Rouy & Foucaud. = *Fraxinus australis* (Cambess.) J.Gay. = *Fraxinus excelsior* var. *australis* (J.Gay) Gren. & Godr. = *Fraxinus excelsior* var. *australis* (Cambess.) Cariot & Saint-Lager 1889. = *Fraxinus stilboantha* Gandoger 1875, p. 152. = ***Fraxinus angustifolia*** subsp. *oxycarpa* (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso. = *Fraxinus leptocarpa* Sennen 1923. Magnoliopsida, Lamiales, Oleaceae.
- Fraxinus excelsior* proles *parvifolia* Rouy, 1897. = *Fraxinus excelsior* proles *angustifolia* (Vahl) Rouy, 1897. = *Fraxinus excelsior* proles *australis* (Cambess.) Rouy, 1897. = *Fraxinus australis* (Cambess.) J.Gay, 1850. = *Fraxinus excelsior* var. *australis* (J.Gay) Gren. & Godr., 1853, p. 471. = *Fraxinus lentiscifolia* Desf., 1804. = ***Fraxinus angustifolia*** Vahl ?, 1804, p. 53. **INPN.** = *Fraxinus parvifolia* var. *terraconensis* Sennen. **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône par Madiot, absence date.**
- Galium aparine* L. ssp. *spurium* (L.) Rouy
- Galium aparine* ssp. *spurium* var. *echinospermum* Desp. Rouy.
- Galium commune* var. *timeroyi* (Jord.) Rouy. = ***Galium timeroyi*** Jordan 1846, p. 138. (Gaillet de Timéroy, Gaillet de Jordan). **INPN.** = *Galium commune* var. *timeroyi* (Jord.) Loret & Barrandon, 1876. = *Galium jordanii* var. *timeroyi* (Jord.) Loret & Barrandon. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.
- Galium cruciata* var. *hirsutissimum* F.Gérard ex Rouy, in Rouy & Foucaud, 1903, p. 6. = ***Cruciata laevipes*** Opiz, 1852, *Seznam* : 34. **INPN.** (Croisette commune, Gaillet croisette). **Herbier SLL : Récolté à Saint-Genis-Laval, Rhône, par Mme C. Lortet, 1810.** = *Cruciata hirsuta* Fourr., 1868, p. 396. = *Galium luteocruciatum* St.-Lag., 1880, p. 126. = *Valantia hirsuta* Gilib., 1792, p. 25. Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.
- Galium harcynicum* var. *arvernense* Rouy, 1903. = *Galium harcynicum* var. *riparium* Rouy, 1903. = *Galium harcynicum* var. *transiens* Rouy, 1903. = ***Galium saxatile*** L., 1753, p. 106. **Herbier SLL : Récolté au Pilat, Loire, par Mme Lortet, 1809.** Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae.
- Galium pariense* L. subsp. *anglicum* (Huds.) Rouy.

- Galium rubrum* subsp. *obliquum* (Vill.) Rouy, 1903. = *Galium rubrum* var. *alpicola* (Jord.) Rouy, 190. = *Galium rubrum* var. *brachypodum* (Jordan) Rouy, 1903. = *Galium rubrum* var. *laetum* (Jordan) Rouy, 1903. = *Galium rubrum* var. *luteolum* (Jordan) Rouy, 1903. = *Galium rubrum* var. *myrianthum* (Jordan) Rouy, 1903. = *Galium luteolum* Jordan 1846. = *Galium myrianthum* Jordan 1846. = *Galium prostii* Jordan 1846. = *Galium rubidum* Jordan 1846. = *Galium alpicola* Jordan 1846. = *Galium brachypodum* Jord., 1846. = *Galium corsicum* subsp. *brachypodum* (Jordan) Arcang., 1882. = *Galium gracilentum* Jordan ex Billot, 1846. = *Galium jordanii* subsp. *gracilentum* (Jordan) Nyman, 1879. = *Galium laetum* Jordan 1846. = *Galium rubrum* subsp. *prostii* (Jordan) Bonnier, 192. = *Galium rubrum* subsp. *rubidum* (Jordan) Nyman, 187. = *Galium leucophaeum* Grenier & Godr., 1850. = *Galium rubrum* var. *leucophaeum* (Grenier) Rouy, 1903. = *Galium tomophyllum* Gandoger 1875, p. 115. = ***Galium obliquum*** Villars 1779 ; Villars 1785, p. 114. **INPN.** (Gaillet oblique). = *Galium rubrum* var. *obliquum* (Villars) W.D.J.Koch. = *Galium myrianthum* var. *rubriflorum* Cariot & Saint-Lager, 1889. Equisetopsida, Gentianales, Rubiaceae.
- Genista tinctoria* var. *perreymondii* (Loisel.) Rouy, 1897 = *Genista tinctoria* var. *delarbrei* (Lecoq & Lamotte) Rouy, 1897. = ***Genista tinctoria*** L., 1753, p. 710. **INPN.** (Genêt, Genêt de Delarbre, Genêt des grèves, Genêt prostré, Genêt des teinturiers, Genêt des teinturiers prostré, Petit Genêt). = *Genista tinctoria* subsp. *delarbrei* (Lecoq & Lamotte) Nyman, 1878. = *Genista tinctoria* var. *delarbrei* (Lecoq & Lamotte) Coss., 1852. = *Genista tinctoria* var. *lasiocarpa* Gren. & Godr. = *Genista delarbrei* Lecoq & Lamotte, 1847. Cultivé dans le Rhône, absence date. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Geranium rotundifolium* f. *albiflora* Rouy, 1897, p. 91. = *Geranium rotundifolium* f. *albiflora* (Rouy) Briq., 1936, p. = *Geranium rotundifolium* subsp. *albiflorum* (Rouy) Graebn., 1913, p. 49. = *Geranium rotundifolium* var. *albiflorum* (Rouy) Graebn. = *Geranium rotundifolium* subsp. *angustifolium* (Rouy) Graebn., 1913, p. 49. = *Geranium rotundifolium* var. *angustifolium* (Rouy) Graebn. = *Geranium rotundifolium* var. *angustifolium* Rouy, 1897, p. 91. = *Geranium semiorbiculare* Rchb., 1832, p. 778. = ***Geranium rotundifolium*** L., 1753, *Sp. Pl.* 683. **INPN.** (Géranium à feuilles rondes, Mauvette). Récolté à Oullins, Rhône, 1828. = *Geranium rotundifolium* var. *arenicolum* Sennen, 1918, n° 3667. = *Geranium rotundifolium* var. *barcinonense* Sennen, 1918, n° 3337. = *Geranium rotundifolium* var. *elongatum* Sennen, 1917, n° 2993. = *Geranium rotundifolium* var. *genuinum* Rouy, in Rouy & Foucaud, 1897, p. 91. = *Geranium viscosum* Gilib., 1782, p. 177. Magnoliopsida, Geraniales, Geraniaceae.
- Gymnadenia conopsea* f. *alpina* (Rchb.f.) Rouy, 1912. = *Gymnadenia conopsea* f. *pseudoconopsea* (Gren.) Rouy, 1912. = *Gymnadenia pseudoconopsea* (P.E.Parm.) Rouy, 1912, p. 99. = *Gymnadenia conopsea* var. *crenulata* Beck = ***Gymnadenia conopsea*** (L.) R.Br., 1813, p. 191. (Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique). **INPN.** **Herbier SLL : Récolté à Cerdon, Ain par Balbis, juin 1821. ; à St-Genis-Laval, Rhône par Roffavier, juin 1817. ; à Yvours, Irigny, Rhône par**

Roffavier, juillet 1823. ; à Mégève, Savoie par Ecole normale du Rhône, août 1916. ; à Ristolas, Hautes-Alpes par Coquillat, juillet 1952. ; à Lavours, Ceyzérieu, Ain par Espine, mai 1971. ; à St-Gingolph, Savoie par Boudet, absence de date. Récolté à Montagnole, Savoie par Ronot, juin 1969. ; à Aminona, Crans-Montana, Valais, Suisse par Ronot, juin 1969. ; au col des Guérins, Ceūze, Hautes-Alpes par Ronot, juin 1990. ; au Valromey, Ain par Ronot, juin 1993. ; à Font d'Urle, Bouvante, Drôme par Ronot, juin 1993. Récolté au col du Lautaret, Hautes-Alpes par Coquillat, juin 1935. ; à la dent de Crolles, Isère par Coquillat, Juin 1946. ; à la pierre percée, La Motte-d'Aveillans, Isère par Borel, mai 1971. = *Gymnadenia comigera* Rchb., 1830, p. 121. = *Gymnadenia conopsea* f. *comigera* (Rchb.) Rchb.f., 1851, p. 115. = *Gymnadenia conopsea* var. *alba* Gray, 1822, p. 205. = *Orchis setacea* Gilib., 1792, p. 482. Liliopsida, Asparagales, Orchidaceae.

Hieracium pyrenaicum Rouy

Hieracium villarsianum Rouy, 1905, p. 293. = *Hieracium saxatile* Villars, 1779, p. 35 in Gandoger 1875, p. 143. = ***Hieracium lawsonii*** subsp. ***lawsonii*** Vill., 1788, p. 118. (Épervière de Lawson, Épervière de Villars) **INPN**. = *Hieracium acrocerinthe* Arv.-Touv., 1913, p. 141. = *Hieracium parietinum* Arv.-Touv., 1913, p. 176. = *Hieracium scotocerinthe* Arv.-Touv., 1913, p. 142. = *Hieracium villarii* Jeanb. & Timb.-Lagr., 1876, p. 594.

Hypericum humifusum proles *liottardii* (Vill.) Rouy & Foucaud, 1896. = *Hypericum humifusum* var. *decumbens* (Peterm.) Reichenbach, 1844. = *Hypericum liottardii* Vill., 1779. = *Hypericum losae* Sennen ex Losa, 1930. = *Hypericum humifusum* var. *liottardii* (Vill.) Vill., 1788. = *Hypericum humifusum* L., 1753. **INPN**. (Millepertuis couché, Petit millepertuis).

Iberis intermedia f. *delphinensis* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1895. = *Iberis timeroyi* Jordan, 1847, p. 54. **INPN**. (*Iberis* de Timeroy) = *Iberis intermedia* subsp. *timeroyi* (Jord.) Nyman, 1878. = *Iberis boppardensis* Jordan, 1847. = ***Iberis linifolia*** L., 1759. = *Iberis intermedia* subsp. *beugesiacae* J.-M.Tison. = *Iberis lamottii* Jordan, 1852. = *Iberis leptophylla* Jordan, 1864. = *Iberis maialis* Jordan, 1847. = *Iberis stricta* Jordan = *Iberis villarsii* Jordan. Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae.

Kentranthus angustifolius D.C. var. *maroccanus* Rouy, *Fl. Fr.*, 8, p. 80. *Myosotis versicolor* proles *balbisiana* (Jord.) Rouy, 1908. = ***Myosotis balbisiana*** Jordan, 1851, p. 339. Jordan 1851. Pugillus plantarum novarum, praesertim gallicarum. *Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres de Lyon*, t.1 : 212-358. **INPN**. (*Myosotis* de Balbis). = *Myosotis discolor* subsp. *balbisiana* (Jord.) O.Bolòs & Vigo, 1983. = *Myosotis lutea* subsp. *balbisiana* (Jord.) Braun-Blanq., 1933. = *Myosotis versicolor* var. *balbisiana* (Jord.) Corb., 1894. = *Myosotis versicolor* var. *lutea* Cariot & St.-Lag., 1889. Magnoliopsida, Boraginales, Boraginaceae.

Laserpitium dufourianum Rouy & Camus

Linaria bipartita f. *longeracemosa* (Rouy) Palhinha, 1939. = *Linaria linogrisea* f. *longeracemosa* (Rouy) Cout., 1913. = *Linaria linogrisea* var. *longeracemosa* Rouy, 1883. = *Linaria sapphirina* (Brot.) Rouy. = *Anarrhinum incarnatum* (Vent.) Poir., 1816, p. 18. = *Linaria cossoniana*

- Br.-Bl. & Maire, 1925, p. 224. = *Linaria bipartita* subsp. *cossoniana* (Braun-Blanq. & Maire) Maire, 1924, p. 674. = *Linaria bipartita* subsp. *linogrisea* (Hoffmanns. & Link) Maire, 1934, p. 673. = *Linaria bipartita* var. *cossoniana* (Braun-Blanq. & Maire) Maire, 1931, p. 57. = *Linaria bipartita* var. *persicina* Jahand. & Maire, 1932, p. 201. = *Linaria incarnata* var. *cossoniana* (Braun-Blanq. & Maire) Viano, 1969, p. 232. = *Linaria incarnata* var. *persicina* (Maire) Viano, 1969. = *Linaria vivesiae* Emb. & Maire. = *Linaria afougueurensis* Coss. ex Braun-Blanq. & Maire, 1925. = ***Linaria incarnata*** (Vent.) Spreng., 1825, p. 796. INPN. (Linaire incarnate). Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae.
- Luzula chabertii* Rouy, in Rouy & Foucaud, 1912, p. 266. = *Juncus subpilosus* Gilib. = *Luzula subpilosa* Gilib. = *Luzula subpilosa* (Gilib.) V.I.Krecz., 1935, p. 571. = *Gymnodes campestris* (L.) Fourr., 1869, p. 172. = *Gymnoides campestris* (L.) Fourr. = ***Luzula campestris*** (L.) DC., 1805, Lam. & DC., Fl. Fr. ed. 3, 3 : 161. Récolté à Oullins, Rhône, 1816. Liliopsida, Poales, Juncaceae.
- Medicago rigidula* Desr. var. *germana* (Jord.) Rouy & Fouc.
- Mentha alopecuroides* var. *lamarckii* (Ten.) Rouy, 1909, p. 369. = *Mentha alopecuroides* var. *microdonta* (Briq.) Rouy, 1909, p. 369. = *Mentha amaurophylla* var. *rugosa* (Gadeceau) Rouy, 1909, p. 373. = *Mentha longifolia* var. *cordifolia* (Opiz ex Fresen.) Rouy, 1909, p. 368. = *Mentha timbalii* (Briq.) Rouy, 1909, p. 372. = *Mentha villosa* var. *heterophylla* Rouy, 1909, p. 371. = ***Mentha villosa*** Huds., 1778, p. 250. INPN. (Menthe velue). Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- *Molineriella minuta* (L.) Rouy, 1913, p. 102. = *Molineria minuta* var. *sabulicola* Br.-B. & Maire, 1922, p. 195. = *Periballia minuta* var. *lanata* Maire, 1933, p. 356. = ***Periballia minuta*** (L.) Asch. & Graebn., 1899, p. 298. = Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Myosotis segetalis* Rouy, in Rouy & Foucaud, 1908, 332. = *Myosotis dumetorum* Rouy, in Rouy & Foucaud, 1908, p. 331. = *Myosotis intermedia* f. *dumetorum* Rouy, 1908. = *Myosotis intermedia* f. *martinii* Rouy, 1908. = *Myosotis intermedia* f. *segetalis* Rouy, 1908. = *Myosotis intermedia* var. *aperta* Rouy, 1908. = *Myosotis arvensis* (L.) Hill., var. *atlantica* Maire, 1924b, p. 191. = ***Myosotis arvensis*** (L.) Hill, 1764, p. 55. INPN. (Myosotis des champs). = *Myosotis amosii* Sennen, 1930, p. 46. = *Myosotis caballeroi* Sennen, 1936, p. 24. = *Myosotis arvensis* var. *gymnosperma* Beck, 1893. = *Myosotis pentheri* Gandoger, 1913, p. 25. = *Scorpioides hirsutus* Gilibert, 1781, p. 20. Magnoliopsida, Boraginales, Boraginaceae.
- Narduroides* Rouy, 1913. = *Loretia* Duval-Jouve, 1880. = *Laston* Pau. = *Distomischus* Dulac, 1867. = *Distomomischus* Dulac, 1867. = *Ctenopsis* de Not., 1848, p. 324 (nov. gen.) = *Prosphysis* Dulac, 1867. = ***Festuca*** Tourn. ex L., 1753. INPN. = Genre. Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Nigritella xfragrans* var. *megastachya* (A.Kern.) Rouy, 1912. = ***Gymnadenia nigra*** (L.) Rchb., 1856, p. 321. INPN (Gymnadénie noire, Nigritelle noire, Orchis vanille). **Herbier SLL : Récolté en Chartreuse, Isère, par Mme Lortet, 1823.** = *Nigritella nigra* (L.) Rchb.f., 1908, p. 102. = *Nigritella suaveolens* var. *nigroconopsea* Rchb.f., 1851, p. 104. = *Gymnadenia nigra* var. *longibracteata* (Beck) Wettst., 1892, p. 92. = *Nigritella*

- angustifolia* f. *longibracteata* Beck, 1890, p. 577. = *Gymnigritella brachystachya* (A.Kern.) E.G.Camus, 1908, p. 358. = *Gymnigritella megastachya* (A.Kern.) E.G.Camus, 1908, p. 359. Liliopsida, Asparagales, Orchidaceae.
- Nuphar spathulifera* Rchb., 1824, p. 10. = *Nuphar tenella* Rchb., 1824, p. 10. = ***Nuphar lutea*** (L.) Sibth. & Sm., 1809, p. 361. Récolté à Villeurbanne, Rhône, 1825. = *Nuphar lutea* var. *submersa* Rouy & Foucaud, 1893. Magnoliopsida, Nymphaeales, Nymphaeaceae.
- Ononis brachyantha* Rouy, 1883, p. 81. = *Ononis saxicola* var. *cuartanensis* Reverchon & Hervier. = ***Ononis pusilla*** subsp. ***pusilla***. INPN. = *Ononis subocculta* Vill. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Orchis provincialis* Balbis in Gandoger 1875, p. 220. = *Orchis provincialis* Balbis ex DC., 1806. INPN. (Orchis de Provence) = *Androrchis provincialis* (Balbis ex Lam. & DC.) D.Tyteca & E.Klein 2008. = *Orchis pallens* subsp. *provincialis* (Balbis ex DC.) Bonnier & Layens, 1894. = *Orchis provincialis* var. *cyrnea* (Briq.) Rouy, 1912. = *Orchis provincialis* var. *yvesii* (Briq.) Rouy, 1912. = *Orchis provincialis* Balbis in Gandoger 1875, p. 220. = *Orchis provincialis* Balbis ex DC., 1806. INPN. (Orchis de Provence) = *Androrchis provincialis* (Balbis ex Lam. & DC.) D.Tyteca & E.Klein 2008. = *Orchis pallens* subsp. *provincialis* (Balbis ex DC.) Bonnier & Layens, 1894. Equisetopsida, Asparales, Orchidaceae.
- Paeonia peregrina* f. *angustata* Rouy & Foucaud, 1893, p. 146. = *Paeonia peregrina* f. *leiocarpa* (DC.) Rouy & Foucaud, 1893, p. 145. = *Paeonia peregrina* f. *microcarpa* (Nyman) Rouy & Foucaud, 1893, p. 146. = *Paeonia peregrina* f. *officinalis* (L.) Rouy & Foucaud, 1893, p. 146. = *Paeonia peregrina* var. *leiocarpa* (DC.) Coss., 1851, p. 93. = *Paeonia lobata* Desf. ex DC., 1818, p. 391. = *Paeonia officinalis* f. *leiocarpa* (DC.) Asch. & Graebn., 1923, p. 556. = *Paeonia paradoxa* var. *leiocarpa* DC., 1824, p. 66. = ***Paeonia officinalis*** L., 1753, p. 530. INPN. (Pivoine officinale). = *Paeonia feminea* (L.) Desf., 1804, p. 126. **Herbier SII : Cultivé dans le Rhône, absence date par Madiot.** Magnoliopsida, Saxifragales, Paeoniaceae.
- Papaver argemone* var. *glabratum* Rouy & Foucaud, 1893. = *Papaver clavatum* Gilib., 1782, p. 215. = *Cerastites macrocephala* Gray, 1821, p. 705. = *Papaver argemone* var. *minus* Latourr., 1785, p. 14. = *Papaver argemone* var. *plenum* Latourr., 1785, p. 14. = ***Papaver argemone*** L., 1753, p. 506. INPN. (Pavot argémone, Coquelicot argémone). = *Papaver argemone* var. *laciniatum* Lamotte, 1877. = *Papaver argemonium* St.-Lag., 1880, p. 131. Magnoliopsida, Ranunculales, Papaveraceae.
- Paronychia argentea* subsp. *polygonifolia* (Vill.) Rouy, 1910 = ***Paronychia polygonifolia*** (Vill.) DC. 1805. INPN. **Herbier SLL : Récolté au Mont-Cenis, Savoie par Roffavier, septembre 1826, et au Mont-Cenis, par ?, août 1826. ; à Andrézieu-Bouthéon, Loire par les Maristes, septembre 1874. ; Récolté au Canigou, Pyrénées-Orientales par Mérit, août 1935. ; En Suisse par Roffavier, ? Récolté au col de Suzon, Laruns par Ronot, juin 1988. Récolté à Ailefroide, Vallouise-Pelvoux, Hautes-Alpes par Coquillat, juillet 1938. = à l'Alpe d'Huez, Isère par Coquillat, juillet 1947. ; au lac d'Ayous, Pyrénées-Atlantiques par Desmure, juillet 1981. = au Rocher d'Aran, Pyrénées Atlantiques par Desmure, juillet 1983. ;**

- au col d'Eychauda, Hautes-Alpes par Desmure, juillet 1986. = *Illecebrum alpinum* Villars, 1786. = *Illecebrum polygoniifolium* Villars, 1786 = *Chaetonychia polygonifolia* (Vill.) Samp. 1913. = *Ferriera polygonifolia* (Vill.) Bubani, 1901. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.
- Pedicularis gillotiana*** Rouy et Faure, 1910, p. 198. *Soc. Bot. Fr.*, LVII. INPN. (Pédiculaire de Gillot). Magnoliopsida, Lamiales, Orobanchaceae.
- Peucedanum carvifolium* var. *autumnale* (Holandre) Rouy & E.G.Camus. = *Peucedanum lelievrei* Rouy & Camus. = *Carvifolia crantzii* Vill., 1787. = ***Dichoropetalum carvifolia*** (Vill.) Pimenov & Kljuykov, 2007, p. 478. (Peucedan à feuilles de carvi, Holandrée à feuilles de carvi, Dichoropétale à feuilles de carvi). INPN. = *Peucedanum decussatum* (Moench) Dulac, 1867, p. 343. = *Palimbia chabraei* (Jacq.) DC. = *Pteroselinum glaucum* Rchb. = *Selinum chabraei* (Jacq.) DC., 1830, p. 176. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- Peucedanum lelievrei* Rouy & Camus. = *Peucedanum carvifolium* var. *autumnale* (Holandre) Rouy & E.G.Camus. = *Pteroselinum glaucum* Rchb. = *Peucedanum carvifolia* Villars, 179, p. 25 in Gandoger 1875, p. 103. = *Carvifolia crantzii* Vill., 1787. = ***Dichoropetalum carvifolia*** (Vill.) Pimenov & Kljuykov, 2007, p. 478. (Peucedan à feuilles de carvi, Holandrée à feuilles de carvi, Dichoropétale à feuilles de carvi). INPN. = *Palimbia chabraei* (Jacq.) DC. = *Peucedanum decussatum* (Moench) Dulac, 1867, p. 343. = *chabraei* (Jacq.) DC., 1830, p. 176. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.
- Pirus gillotti* Rouy var. *cordata*. Magn. Fl. Sel., N° 270.
- Plantago lagopus* var. *intermedia* Rouy, 1908. = *Plantago lagopus* var. *glabrata* Maire, 1924, p. 226. = ***Plantago lagopus*** L., 1753, p. 114. INPN. (Plantain queue-de-lièvre, Plantain pied-de-lièvre). Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae.
- Plantago lanceolata* L. ssp. *altissima* (L.) Rouy
- Plantago lagopus* var. *intermedia* Rouy, 1908. = *Plantago lagopus* var. *glabrata* Maire, 1924, p. 226. = ***Plantago lagopus*** L., 1753, p. 114. INPN. (Plantain queue-de-lièvre, Plantain pied-de-lièvre). Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae.
- Plantago major* f. *intermedia* (Gilib.) Rouy, 1908. = *Plantago intermedia* Gilibert, in Gandoger 1875, p. 186. = ***Plantago uliginosa*** subsp. *uliginosa* = *Plantago major* f. *intermedia* (Gilib.) Pilg. = *Plantago major* var. *intermedia* (Gilib.) Ces. = *Plantago major* var. *intermedia* (Gilib.) Noulet, 1837. = *Plantago major* subsp. *pleiosperma* Pilg., 1937. INPN. (Plantain intermédiaire). Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae.
- Picris benearnensis* Rouy. = *Picris hieracioides* var. *benearnensis* (Rouy) P.Fourn. = *Picris villarsii* Jordan, 1848, p. 29. = *Picris sonchoides* var. *macrorhiza* Rouy. = *Picris sonchoides* var. *villarsii* (Jord.) Rouy, 1908. = *Picris sonchoides* var. *oreophila* (Timb.-Lagr.) Rouy, 1908. = ***Picris hieracioides*** subsp. *umbellata* (Schränk) Ces., 1844, p. 303. INPN. = *Picris hieracioides* subsp. *villarsii* (Jord.) Nyman, 1879, p. 467. = *Picris hieracioides* var. *crepoides* (Saut.) Cariot & St.-Lag., 1889. = *Picris hieracioides* var. *villarsiana* (Jord.) Cariot & St.-Lag., 1889. = *Picris*

- oreophila* Timb.-Lagr., 1872. = *Picris sonchoides* var. *oreophila* (Timb.-Lagr.) Rouy, 1908. = Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Poa supina* proles *foucaudii* (Hack.) Rouy, 1913. = *Poa rivulorum* Maire & Trabut, in Maire, 1924b, p. 147. = ***Poa supina*** Schrader, 1806, p. 289. (Pâturin couché, Pâturin étalé). Liliopsida, Poales, Poaceae.
- Polygala vulgaris* subsp. *pedemontana* (E.P.Perrier & B.Verl.) Rouy & Foucaud, 196, 70. = ***Polygala pedemonta*** Perr. et B.Verl., 1863, p. 433. (Polygale du Piémont, Polygala du Piémont). INPN. = *Polygala corsica* Boreau, 1857. Magnoliopsida, Fabales, Polygonaceae.
- Polygala vulgaris* f. *calliptera* (Legrand) Rouy & Foucaud, 1896. = *Polygala vulgaris* f. *dunensis* (Dumort.) Rouy & Foucaud, 1896. = *Polygala oberthueri* Sennen, 1936, p. 8. = *Polygala caerulea* Miégev. ex Rchb. = *Polygala amaurocarpa* Timb.-Lagr., 1892. = *Polygala angustifolia* Gilibert, 1782, p. 113. = ***Polygala vulgaris*** L., 1753, p. 702. INPN. (Polygale commun, Polygala commun, Polygala vulgaire). **Herbier SLL : Récolté en Suisse, par Mme Lortet, 1827.** = *Polygala vulgaris* var. *vestita* Gren. & Godr., 1848. Magnoliopsida, Fabales, Polygalaceae.
- Potamogeton rufescens* f. *alpinus* (Balb.) Rchb., 1845, p. 20. = ***Potamogeton alpinus*** Balbis, 1804, p. 13. = *Potamogeton alpinus* var. *alpinus* Balbis = *Potamogeton obtusus* var. *alpinus* (Balb.) Gaudin, 1828, p. 469. = *Potamogeton rufescens* var. *alpinus* (Balb.) Mert. & W.D.J.Koch. = *Potamogeton rufescens* var. *alpinus* (Balb.) Mert. & W.D.J.Koch = *Potamogeton rufescens* var. *spathulatus* (T.Marsson) Rouy, 1912. Liliopsida, Alismatales, Potamogetonaceae.
- Potentilla cinerea* f. *arenicola* (H.Roux) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Potentilla cinerea* f. *velutina* (Lehm.) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Potentilla cinerea* f. *vivariensis* (Jord.) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Potentilla cinerea* var. *battersbyi* (Siegfr. ex R.Keller) Rouy & E.G.Camus. = *Dynamidium clementei* (Jord.) Fourr., 1868, p. 371. = *Dynamidium vivariense* (Jord.) Fourr., 1868, p. 371. = ***Potentilla cinerea*** Chaix ex Vill., 1779. (Potentille cendrée). INPN. **Herbier SLL. Récolté au Mont Ventoux, Vaucluse par Balbis, mai 1820. ; à Serrières, Ardèche par les Maristes, mai 1872. ; à Châteaubourg, Ardèche par Mérit, avril 1927. ; au Mont Ventoux, Vaucluse, par Mérit, mai 1935 ; à Caussols, Alpes-Maritimes, par Boudet, juin 1979 et par Mérit, date absente.** = *Potentilla opaca* Vill., 1779, p. 47. ; *Potentilla cinerea* var. *vestita* (Jord.) Cariot & St.-Lag., 1889, p. 227. = *Potentilla clementei* Jord., 1852, p. 70. = *Potentilla vestita* Jord., 1849, p. 23. = *Potentilla vivariensis* Jord., 1850, p. 24. = *Potentilla ovata* Poir., 1804, p. 601. Magnoliopsida, Rosales, Rosacea.
- Potentilla inclinata* var. *canescens* (Besser) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Potentilla xcollina* var. *subrecta* (Jord.) Rouy & E.G.Camus, 1900. = ***Potentilla inclinata*** Vill., 1788, p. 567. (Potentille inclinée, Potentille grisâtre). INPN. **Herbier SLL. Récolté à St-Laurent-du-Pont, Isère par Balbis, juin, 1829. ; dans le Massif des Maures, Var par les Maristes, juin, 1869.** = *Potentilla assurgens* Vill., 1789, p. 567. = *Potentilla xinclinata* Vill. = *Hypargyrium subrectum* (Jord.) Fourr., 1868, p. 371. = *Potentilla sadleri* Rchb., 1832, p. 594. = *Potentilla subrecta* Jord., 1852, p. 65.
- Poterium sanguisorba* subsp. *dictyocarpum* Rouy & E.G.Camus, 1900, p. 436.

= *Sanguisorba vulgaris* Pau. = *Poterion sanguisorbens* St.-Lag., 1880, p. 132. = *Sanguisorba maroccana* (Coss. In Battandier) Maire, 1924, p. 170. = *Sanguisorba minor* subsp. *anceps* (Ball) Maire, 1932, p. 340. = *Sanguisorba minor* subsp. *maroccana* (Batt.) Maire, 1980, p. 229. = *Sanguisorba minor* var. *atlantica* Litard. & Maire, 1924, p. 10. = ***Poterium sanguisorba*** subsp. ***sanguisorba*** L., 1753, p. 994. (Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure). **INPN.** = *Poterium glaucescens* Rchb., 1832, p. 610. = *Poterium glaucescens* var. *guestphalicum* Boenn. ex Rchb., 1832, p. 610. = *Poterium maroccanum* Coss. ex Batt., 1919, p. 31. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.

Prunus spinosa f. *densa* (Martrin-Donos) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Prunus spinosa* f. *depressa* (Clavaud) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Prunus spinosa* f. *ericiflora* (Sav.) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Prunus spinosa* f. *foecundissima* (Clavaud) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Prunus spinosa* f. *lamottei* (Sav.) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Prunus spinosa* f. *latiflora* (Clavaud) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Prunus spinosa* f. *lucida* (Clavaud) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Prunus spinosa* f. *ovata* Rouy & E.G.Camus, 1900, p. 19. = *Prunus spinosa* f. *pubescens* (Clavaud) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Prunus spinosa* f. *subcylindrica* (Sav.) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Prunus spinosa* f. *subinermis* (Clavaud) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Prunus spinosa* var. *erythrocalyx* (Clavaud) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Prunus spinosa* var. *oxyphyrena* (Clavaud) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Prunus spinosa* var. *rubella* (Clavaud) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Prunus spinosa* var. *stenopetala* (Clavaud) Rouy & E.G.Camus, 1900. **Prunus spinosa** L., 1753. **INPN.** (Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier). = *Prunus densiflora* Jord. & Fourr., 1868, p. 24. Cultivé dans le Rhône, 1830. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.

Ranunculus repens subsp. *reptabundus* (Rouy & Foucaud) P.Fourn., 1928. = *Ranunculus repens* subsp. *reptabundus* (Rouy & Foucaud) P.Fourn., 1928. = *Ranunculus lucidus* Poir., 1804, p. 113. = *Quercus calliprinos* var. *eigii* A.Camus, 1933, p. 335. = *Quercus calliprinos* var. *fenzlii* (Kotschy) A.Camus, 1933, p. 355. = *Quercus calliprinos* var. *integrifolia* (Boiss.) A.Camus. = *Quercus calliprinos* var. *recurvans* (Kotschy ex A.DC.) A.Camus, 1938, p. 456. = *Quercus calliprinos* var. *subaquifolia* A.Camus, 1938, p. 460. = *Quercus calliprinos* var. *integrifolia* (Boiss.) A.Camus, 1938. = *Quercus coccifera* f. *dolichocarpa* (A.Camus) F.M.Vázquez, 1998, p. 81. = *Ranunculus prostratus* Poir., 1804, p. 113. = *Ranunculus tomentosus* Poir., 1804, p. 127. = *Ranunculus repens* f. *prostratus* (Poir.) Bonnier. = *Ranunculus repens* var. *lucidus* (Poir.) N.H.F.Desp., 1838. = *Ranunculus clintonii* Beck, 1833, p. 9. = *Ranunculus repens* var. *typicus* Beck = *Ranunculus repens* var. *typicus* Beck = *Ranunculastrum repens* (L.) Fourr., 1868, p. 324. = *Ranunculastrum reptabundum* Fourr., 1868, p. 324. = ***Ranunculus repens*** L., 1753, *Sp. Pl.* : 554. **Herbier SLL : Récolté à Saint-Genis-Laval, Rhône, par Mme Lortet, 1812.** = *Ranunculus reptabundus* Jord., 1860. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.

Ranunculus bulbosus L. subsp. *aleae* (Willk.) Rouy et Fouc.

- Ranunculus ophioglossifolius* var. *dentatus* Rouy & Foucaud. = *Ranunculus ophioglossifolius* var. *intermedius* Rouy & Foucaud, 1893. = ***Ranunculus ophioglossifolius* Vill., 1789, p. 731.** (Renoncule à feuilles d'ophioglosse, Bouton-d'or à feuilles d'ophioglosse). **INPN. Herbar SLL.** Récolté à Hyères, Var par Balbis, mai, 1817 et mai 1827. ; à Hyères, Var par Roffavier, absence de date. ; à Hyères, Var par Méhu, mai 1841 ; à ? par les Maristes, juin 1875. ; à Capeiry, Savoie par Pollier, mai 1884. ; en Algérie par Boudet, avril 1932. = *Glossophyllum ophioglossifolium* (Vill.) Fourr., 1868, p. 325. = *Ranunculus ophioglossifolius* var. *laevis* Chabert, 1882, p. 111. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
- Ranunculus repens* subsp. *reptabundus* (Rouy & Foucaud) P.Fourn., 1928. = *Ranunculus repens* subsp. *reptabundus* (Rouy & Foucaud) P.Fourn., 1928. = *Ranunculus lucidus* Poir., 1804, p. 113. = *Ranunculus prostratus* Poir., 1804, p. 113. = *Ranunculus tomentosus* Poir., 1804, p. 127. = *Ranunculus repens* f. *prostratus* (Poir.) Bonnier. = *Ranunculus repens* var. *lucidus* (Poir.) N.H.F.Desp., 1838. = *Ranunculus clintonii* Beck, 1833, p. 9. = *Ranunculus repens* var. *typicus* Beck = *Ranunculus repens* var. *typicus* Beck = *Ranunculastrum repens* (L.) Fourr., 1868, p. 324. = *Ranunculastrum reptabundum* Fourr., 1868, p. 324. = ***Ranunculus repens* L., 1753, Sp. Pl. : 554. Herbar SLL : Récolté à Saint-Genis-Laval, Rhône, par Mme Lortet, 1812.** = *Ranunculus reptabundus* Jord., 1860. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
- Ranunculus sardous* Crantz ssp. *trilobus* (Desfontaines) Rouy.
- Ranunculus trichophyllus* proles *godronii* (Gren.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Ranunculus trichophyllus* proles *radians* (Revel) Rouy & Foucaud, 1893. = *Ranunculus pau* Sennen, 1928. = *Batrachium gilibertii* V.I. Krecz., 1937, p. 345. *Flora URSS*. = *Ranunculus diversifolius* Gilib., 1782. = ***Ranunculus aquatilis* L., 1753, p. 556.** (Renoncule aquatique). **INPN. Herbar SII : Récolté à Alix, Rhône en mai 1821 par Champagneux. ; à Chaponost en mai 1824 par Roffavier. ; à Hyères, Var en avril 1828 par Balbis. ; à Jonzieux en mai 1875 par les Maristes. ; à Brévenne (rivière) en mai 1875 par les Maristes. ; à Champagneux en mai 1919 par Commandeur. ; à Montagny en mars 1935 par Mérit. ; à Givors en mai 1950 par Boudet. ; à Givors en avril 1966 par Espine. ; à Montpellier en juillet 1966 par Espine. ; à Chapeiry en mai 1888 par Pollier. ; aux Brotteaux, Lyon en ? par Valuy. Récolté à Llauro, Pyrénées-Orientales par Ronot, mai 1993. ; au plateau de Gigors, Drôme par Ronot, juin 1993. ; au plateau du Cézallier, Puy-de-Dôme par Ronot, juillet 1997. ; au lac Chauvet, Picherande, Puy-de-Dôme par Ronot, juillet 1997. ; Picherande au Causse Méjean, Lozère par Ronot, mai 1999. ; à St-Laurent-de-Médoc, Gironde par Ronot, mai 2004. ; à l'étang de la Tuilerie, Dammarie-en-Puysaye, Loiret par Ronot, septembre 2011. Récolté à Joyeux, Ain en mai 1980 par Borel. ; à Pont-de-Chéruy, Isère en mai 1941 par Coquillat. ; à Givors, Rhône en mai 1940 par Coquillat.** = *Ranunculus circinatoides* Arv.-Touv., 1871. = *Batrachium circinatoides* Arv.-Touv. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.
- Rhamnus cathartica* f. *hydriensis* (Hacq.) Rouy, 1897. = *Rhamnus cadevallii* Pau, 1902, p. 85. = ***Rhamnus cathartica* L., 1753, p. 193.** = *Rhamnus cathartica* var. *silvatica* (J.Serres) Cariot & St.-Lag., 1889. = *Rhamnus*

- cathartica* var. *microphylla* Beck, 1921, p. 451. = *Rhamnus spinosa* Gilib., 1782, p. 132. **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône, absence date.** Magnoliopsida, Rosales, Rhamanceae.
- Rhamnus frangula* var. *subrotunda* Rouy & Foucaud, 1895, p. 518. = *Frangula vulgaris* var. *parvifolia* Beck, 1921, p. 451. = *Frangula vulgaris* var. *subrotunda* (Rouy & Foucaud) Beck, 1921, p. 451. = ***Frangula alnus*** Mill., 1768. **INPN.** (Bourdaine, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaine de Dodone, Bourdaine aulne, Bourgène). = *Rhamnus autumnalis* Gand., 1875, p. 68. **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône par Madiot, absence date.** Magnoliopsida, Rosales, Rhamnaceae.
- Rosa laevipes* Rouy, 1875. = *Rosa rothomagensis* Rouy, 1875. = *Rosa scopulorum* Rouy, 1882. = *Rosa viscaria* var. *jordanii* (Déségl.) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Rosa ladanifera* Timb.-Lagr., 1871. = *Rosa boulluii* Gandoger 1875, p. 84. = *Rosa argus* Gand., 1875. = *Rosa lugdunensis* var. *platyphylloides* Boullu, 1889. = ***Rosa inodora*** Fr. = *Rosa elliptica* Tausch, 1819. **INPN.** = *Rosa cheriensis* Déségl., 1864. = *Rosa lugdunensis* Déségl., 1861. = *Rosa graveolens* subsp. *jordanii* (Déségl.) Gremlé, 1885. = *Rosa jordanii* Déségl., 1861. Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae.
- *Rosa sicula* var. *ligustica* (Christ) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Rosa sicula* var. *subsessiliflora* (Boullu) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Rosa viscaria* subsp. *sicula* (Tratt.) Rouy. = *Rosa viscaria* var. *ligustica* (Christ) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Rosa viscaria* var. *thuretii* (Burnat & Gremlé) Rouy & E.G.Camus, 1900. = *Rosa sicula* subsp. *maroccana* Pau & Font Quer. = *Rosa mairei* Sennen, 1933, p. 40. = *Rosa micrantha* var. *mairei* (Sennen) Maire, 1941, p. 1024. = ***Rosa pulverulenta*** M.Bieb., 1808, p. 399. = *Rosa sicula* var. *leiopoda* Sennen, 1934, p. 890. = *Rosa brachiata* Déségl., 1872, p. 103. = *Rosa ucnensis* Boullu, 1884, p. 256. = *Rosa subsessiliflora* Boullu, 1880, p. 89.
- Rosa tomentosa* subsp. *omissa* (Déségl.) Rouy = ***Rosa sherardii*** Davies, 1813. **INPN.** (Rosier de Sherard, Églantier de Sherard). Magnoliopsida, Rosales Rosaceae.
- Rubia peregrina* L. var. *longifolia* (Poiret) Rouy.
- Salix alba* proles *chabertii* (Gand.) Rouy, 1910. = ***Salix chabertii*** Gandoger 1875, p. 204. (Saule de Chabert). = *Salix fausta* Gandoger 1881. = *Salix leucophora* Gandoger 1875, p. 204. = *Salix sepicola* Gandoger 1875, p. 204. (Saule des haies). = *Salix alba* L., 1753. **INPN.** (Saule blanc, Saule commun). Magnoliopsida, Malpighiales, Salicaceae.
- Salix issleri* Rouy, 1910. = *Salix caprea* subsp. *aurita* (L.) Bonnier & Layens, 1894. = ***Salix obtusissima*** Gandoger 1875, p. 205. (Saule à feuilles très-obtuses). = *Salix conformis* Gandoger 1881. = *Salix daumensis* Gandoger 1882. = *Salix drumensis* Gandoger 1881. = *Salix montivaga* Gandoger 1881. = *Salix tomentilloidea* Gandoger 1881. = *Salix aurita* L., 1753. (Saule à oreillette). **INPN.** = *Salix ulmifolia* Vill., 1789. = *Salix caperata* Gandoger 1875, p. 206. Magnoliopsida, Malpighiales, Salicaceae.
- Salix xpentandroides* Rouy. = *Salix pentandra* var. *angustifolia* W.D.J.Koch, 1844. = *Salix carthusianorum* Gandoger 1875, p. 204. (Saule des Chartreux). = *Salix adenodonton* Gandoger 1875. (Saule à dents

- glanduleuses). = *Salix arvernensis* Gandoger 1881. = *Salix malarbetii* Gandoger 1881. = ***Salix pentandra*** L., 1753. **INPN.** (Saule à cinq étamines, Saule odorant), in Gandoger 1875, p. 205. **Herbier SLL : Cultivé dans le Rhône par Madiot, date absente.** = *Salix meridionalis* Debeaux, 1879. Magnoliopsida, Malpighiales, Salicaceae.
- Salix repens** L., 1753, p. 1020. **INPN.** (Saule rampant, Saule à feuilles étroites). **Herbier SLL : Récolté au Mont-Cenis, Savoie, par Mme C. Lortet, 1826.** = *Salix dunensis* Rouy, in Rouy & Foucauld, 1910, p. 12. ; (Rouy) Prain, 1913. = *Salix repens* var. *dunensis* (Rouy) P.Fourn. = *Salix alpestrivaga* Gand., 1881. = *Salix binata* Gand., 1881. = *Salix humilior* Gand., 1881. = *Salix iodophylla* Gand., 1881. = *Salix marichalii* Gand., 1881. = *Salix mauriana* Gand., 1881. = *Salix megastachya* Gand., 1881. = *Salix roffiavieri* Gand., 1881. = *Salix velutina* Gand., 1881. Magnoliopsida, Malpighiales, Salicaceae.
- Salix x rubens* var. *excelsior* (Host) Rouy, 1910. = *Salix x rubens* var. *palustris* (Host) Rouy, 1910. = *Salix x rubens* var. *viridis* (Fr.) Rouy, 1910. = ***Salix argyrodendron*** Gandoger 1875, p. 204. (Saule arbre argenté). = *Salix x rubens* Schrank, 1789. **INPN.** (Osier jaune). = *Salix arnassensis* Gandoger 1875, p. 204. (Saule d'Arnas). = *Salix obtusisquamea* Gandoger 1876. Magnoliopsida, Malpighiales, Salicaceae.
- Scorzonera laciniata* var. *intermedia* (Guss.) Rouy, 1908. = *Scorzonera laciniata* var. *intermedia* (Guss.) Rouy, 1908. = *Scorzonera laciniata* var. *latifolia* Rouy, 1908. = *Podospermum laciniatum* var. *intermedium* (Guss.) Batt. = *Podospermum laciniatum* var. *octangulare* (Willd.) Batt. = *Podospermum laciniatum* subsp. *latifolium* Gren. & Godr. = *Scorzonera laciniata* var. *integrifolia* Gren. = *Scorzonera muricata* Balbis, 1804, p. 25. = *Scorzonera laciniata* var. *muricata* (Balb.) Jáv. = ***Scorzonera laciniata*** L., 1753, p. 791. = *Podospermum laciniatum* (L.) DC., 1805. **INPN.** (Podosperme lacinié, Scorsonère à feuilles de chausse-trape, Scorsonère laciniée). = *Scorzonera laciniata* var. *integrifolia* Rouy = *Scorzonera laciniata* var. *octangularis* (Willd.) Maire. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Senecio erucifolius* var. *viridulus* (Martrin-Donos) Rouy, 1903. = *Senecio brachiatus* Jord. ex Martrin-Donos, 1864. = ***Senecio autumnalis*** (Cariot) Gandoger, 1875, p. 123. = *Senecio arnassensis* Gand., 1875. = *Senecio erucifolius* var. *autumnalis* Cariot. = *Jacobaea erucifolia* (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801. **INPN.** (Séneçon à feuilles de Roquette). = *Senecio erucifolius* subsp. *costae* Rouy, 1903. = *Senecio erucifolius* subsp. *lycopifolius* (Desf.) Nyman, 1879. = *Senecio erucifolius* var. *ceratophyllus* Willk. & Costa, 1859. = *Senecio jacobaea* subsp. *lycopifolius* (Desf.) Rouy, 1908. = *Senecio lycopifolius* Desf., 1829. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Seseli leiocarpum* (Heuff.) Rouy et Cam., 1901, p. 276. = *Libanotis athamantoides* D C. = *Seseli athamantoides* Reich. = ***Seseli libanotis*** subsp. ***libanotis*** in Koch, 1824, p. 111. = *Libanotis pyrenaica* (L.) O.Schwarz, 1949. (Libanotide des Pyrénées, Séséli libanotide, Libanotis des Pyrénées, Séséli libanotis). **INPN.** **Herbier SLL : Brénod, Ain par Ecole Normale Rhône, ? à Aiguebelette, Savoie par Mérit, août 1922. ; à**

Hauteville-Lompnes, Ain par Ecole normale Rhône, août 1928. ; à Charmant Som, Chartreuse, Ain par Espine, août 1968. ; région Beaujolais, Rhône par Vaivolet, ? Récolté à gorges de Holzarte, Larrau, Pyrénées-Atlantiques, par Ronot, Mai 2002. Récolté à Izernore, Ain par Coquillat, août 1943. ; vallée du Célé, Loire-Atlantique par Desmure, juillet 1985. Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae.

Sideritis hirsuta f. *tomentosa* (Pourr.) Rouy, 1909. = *Sideritis hirsuta* var. *altilabra* Pau. = *Sideritis hirsuta* var. *microphylla* Sennen, 1911. = *Sideritis hirsuta* var. *vallisoletana* Sennen & Pau, 1907, p. 464. = *Sideritis vulgaris* (Willk.) Coulomb & J.-M.Tison, 2010. **INPN**. = *Sideritis adjecta* Gand., 1889. = *Sideritis andalusica* Gand., 1889. = *Sideritis aragonensis* Gand., 1889. = *Sideritis borderei* Gand., 1889. = *Sideritis conferta* Gand., 1889. = *Sideritis elongantula* Gand., 1889. = *Sideritis granatensis* Gand., 1889. = *Sideritis hispanorum* Gand., 1889. = *Sideritis hospita* Gand., 1889. = *Sideritis laciniosa* Gand., 1889. = *Sideritis minutifolia* Gand., 1889. = *Sideritis murcica* Gand., 1889. = *Sideritis obtusissima* Gand., 1889. = *Sideritis oenodonta* Gand., 1889. = *Sideritis sarracenorum* Gand., 1889. = *Sideritis segobrigensis* Gand., 1889. = *Sideritis sparsipila* Gand., 1889. = *Sideritis tenuipubens* Gand., 1889. = *Sideritis zubiae* Gand., 1889. = *Sideritis hirsuta* L. var. *maroccana* Coss. In Battandier, 1919, p. 69. *Contr. Fl. Atl.* = ***Sideritis hirsuta*** L., 1753, p. 575. (Crapaudine hirsute, Crapaudine velue, Crapaudine hérissée). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à Narbonne, Aude par Roffavier, absence de date. ; à Quillan, Aude par les frères Maristes, juin 1876. ; Récolté à Villaseca, Espagne par Borel, août 1977. ; à la montagne d'Alaric, Aude par Desmure, juin 1984. Récolté à Villesèque-des-Corbières, Aude par Ronot, mai 2006. ; au col de Perbes, Pyrénées espagnoles par Ronot, juillet 1998. = *Sideritis nemausensis* Jord. & Fourr., 1869, p. 137. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.

Sisymbrium columnae Jacq. var. *macroloma* (Pomel) Batt. subvar. *rigidum* Rouy.

Solanum nigrum var. *tauschii* (Opiz) Rouy, 1908. = *Solanum nigrum* var. *pterocaulos* (Dunal) Batt. = *Solanum nigrum* var. *aurantium* Maire, 1926, p. 139. = *Solanum chenopodiifolium* Lévl., 1913e, p. 531. = ***Solanum nigrum*** L., 1753, p. 186. (Morelle noire). **INPN**. **Herbier SLL** : Récolté à Pierre-Bénite, Rhône par Roffavier, juillet 1822. ; à Rochecardon, Rhône par Balbis, août 1823. ; à Perrache, Lyon, Rhône par Roffavier, octobre 1831. ; à St-Just-St-Rambert, Loire par les frères Maristes, septembre 1865. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, août 1880. ; à Oullins, Rhône par Mérit, septembre 1924. ; à Cannes, Alpes-Maritimes par Mérit, 1953. ; à Théoule-sur-mer, alpes-Maritimes par Boudet, juillet 1894. ; à Villejuif, Val-de-Marne par Boudet, juin 1943. ; à Andrézieux-Bouthéon, Loire par Boudet, ? Cultivé dans le Rhône par Valuy, ? ; dans le Rhône par Balbis, ? Récolté à Lyon 3e, Rhône par Ronot, août 1998. Récolté à La Doua, Villeurbanne, Rhône par Coquillat, septembre 1940. ; à Neuville-sur-Saône, Rhône par Borel, Juillet 1970. ; à Lyon, Rhône par Gianquinto, janvier 1982. ; dans le Rhône par Desmure, août 1989. = *Solanum cestrophyllum* Dunal, 1852, p. 186. = *Solanum ganchouenense* H.Lév., 1912, p. 295. = *Solanum guineense* var. *nepalense* Dunal. =

- Solanum memphiticum* var. *repandum* Dunal. = *Solanum nigrum* var. *atriplicifolium* Desp. ex Dunal. = *Solanum paludosum* Dunal, 1852, p. 57. = *Solanum nigrum* var. *vulgatum* Dunal, 1852, p. 50. = *Solanum pterocaulum* var. *deppei* Dunal = *Solanum roxburghii* Dunal, Magnoliopsida, Solanales, Solanaceae.
- Sonchus vulgaris* Rouy, un Rouy & Foucaud, 1905, p. 204. = *Sonchus vulgaris* subsp. *arvensis* (L.) Rouy, 1905, p. 9. = *Sonchus vulgaris* var. *marinus* Rouy, 1905, p. 9. = *Sonchoseris decora* Fourr., 1869, p. 102. = ***Sonchus arvensis*** L., 1753, p. 793. (Laiteron des champs). **INPN. Herbiier SLL : Récolté à Barcelonnette, Hautes-Alpes par Borel, août 1981. ; Récolté fleuve Rhône, Rhône par Mme Lortet, juillet 1806. ; à Béchevelin, Lyon, Rhône par Balbis, juillet 1824. ; à Plan de Vaise, Lyon, Rhône par Balbis, juillet 1828. ; Fleuve Rhône, par Valuy, juillet 1826. ; à Roanne, Loire par les Maristes, juillet 1864. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, septembre 1879. ; à Bourgouin-Jallieu, Isère, par Espine août 1966.** = *Sonchoseris decora* Fourr., 1869, p. 102. = *Sonchus arvensis* var. *glaber* Cariot & St.-Lag., 1889. Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae.
- Spiranthes autumnalis* var. *major* Rouy, 1912. = *Spiranthes autumnalis* var. *major* Rouy, 1912, p. 212. = *Spiranthes autumnalis* (Balb.) Richard, 1817, p. 37. = ***Spiranthes spiralis*** (L.) Chevall. 1827. (Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralee). **INPN.** = *Ophrys autumnalis* Balb., 1801, p. 96. = *Spiranthes autumnalis* f. *bracteata* E.G.Camus, 1908, p. 390. Liliopsida, Asparagales, Orchidaceae.
- Stellaria media* var. *brachypetala* (Opiz) Rouy & Foucaud, 1896. = *Stellaria media* var. *pedicellata* Rouy & Foucaud, 1896. = *Stellaria cucubaloides* Pau, 1887, p. 14. = *Stellaria chlorotica* Timb.-Lagr., 1892, p. 144. = *Alsine marginata* Rchb., 1832, p. 566. = *Alsine elongata* Jord. & Fourr., 1868, p. 19. = *Alsine glabella* Jord. & Fourr., 1868, p. 20. = *Alsine gussonii* Jord. & Fourr., 1868, p. 20. = *Stellaria boreana* Jord., 1852, p. 33. = *Alsine bipartita* Gilib., 1782, p. 150. = ***Stellaria media*** (L.) Vill., 1789, p. 415. **INPN.** (Stellaire intermédiaire, Mouron des oiseaux, Morgeline, Mouron blanc). **Herbiier SLL. Récolté à Béchevelin, Lyon, Rhône par Balbis, mai 1825. ; à Béchevelin, Lyon, Rhône par Roffavier, mai 1825. ; à St-Genis-Laval, Rhône par Mme Lortet, mai 1829 ; par les Maristes, avril 1900. ; à Sallenoves, Haute-Savoie par Pollier, mai 1888. ; à La Châtre, Indre par Boudet, février 1943. ; à la Chapelle-de-Guinchay, Saône-et-Loire par Espine, mars, 1967. ; à Le Chesnay, Ivelines par Hervé Bazin, avril 1968.** = *Stellaria duthiei* Gand., 1913, p. 456. = *Stellaria media* var. *micropetala* Batt. = *Stellaria media* var. *micropetala* Batt. = *Stellaria media* var. *micropetala* Batt. ex Bég., 1910, p. 361. = *Stellaria media* var. *nana* Bég., 1910, p. 356. = *Alsine media* var. *transiens* (Bég.) Tzvelev, 2004. = *Stellaria latisepala* Bég., 1910, p. 363. = *Stellaria hiemalis* (Bég.) Raunk., 1934, p. 12. = *Stellaria latisepala* Bég., 1910, p. 363. = *Stellaria media* subsp. *hiemalis* Bég., = *Stellaria media* subsp. *latisepala* Bég., 1910, p. 363. = *Stellaria media* subsp. *romana* Bég., 1920, p. 7. = *Stellaria media* subsp. *typica* Bég., 1910, p. 351. = *Stellaria media* var. *gymnocalyx* Bég., 191, p. 353. = *Stellaria media* var. *subgymnocalyx* Bég., 1910, p. 352. = *Stellaria media* var. *transiens* Bég., 1910, p. 361. = *Stellaria media* var. *trichocalyx* Bég.,

1910, p. 351. = *Stellaria pilosa* Dulac, 1867, p. 250. Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae.

Tamus communis var. *smilacifolia* (Jullien ex Boreau) Rouy, 1912. = *Tamus baccifera* St.-Lag., 1889, p. 765. = *Tamus communis* L., 1753, p. 1028. **Herbier SLL : Récolté à Cerdon, Ain par Balbis, juin 1821. ; à Bénonces, Ain par Mérit, mai 1955. ; à Vaux-en-Velin, Rhône par Boudet, juin 1963. ; à Hyères, Var par Hervé Bazin, avril 1972. ; à Cannes, Alpes-Maritimes par Mérit, absence de date. ; à Bourgoin-Jallieu, Isère par Valuy, date absente. Récolté Montagne de l'Epine, Savoie par Ronot, juin 1969 ; à Barranco del infierno, Tenerife, Espagne, avril 1995. ; dans la vallée de la Cance, Ardèche par Ronot, mai 1996. ; à Antalya, Turquie par Ronot, avril 2010. = *Dioscorea communis* (L.) Caddick & Wilkin, 2002, p. 112. (Dioscorée commune, Tamier commun, Herbe aux femmes battues, Taminier, Sceau-de-Notre-Dame). INPN. Liliopsida, Dioscoreales, Dioscoreaceae.**

Thalictrum gallicum f. *medianum* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum gallicum* f. *medianum* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum longipes* Rouy & Foucaud, 1893, p. 22. = *Thalictrum minus* f. *fallacinum* (Gren. ex Lecoy.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum minus* f. *flexuosum* (Bernh.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum minus* f. *godronii* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum minus* f. *oreites* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum minus* f. *sabaudum* Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum minus* f. *schleicheri* Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum minus* f. *schultzii* (Jord.) Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum sabaudum* Rouy & Foucaud, 1893, p. 18. = *Thalictrum minus* subsp. *sylvaticum* (W.D.J.Koch) Rouy & Foucaud, 1893. = *Thalictrum schleicheri* Rouy & Foucaud, 1893, p. 22. = ***Thalictrum minus* L., 1753, p. 546. INPN. (Pigamon mineur, Petit pigamon). Herbier SLL : Récolté en Suisse, par Mme Lortet, 1827.** = *Thalictrum oreites* Jord., 1861, p. 396. = *Thalictrum godronii* Jord., 1861, p. 400. = *Thalictrum abortivum* Jord., 1864, p. 39. = *Thalictrum laggeri* Jord., 1861, p. 394. = *Thalictrum porrigens* Jord., 1864, p. 48. = *Thalictrum billotii* F.W.Schultz ex Jord., 1864, p. 36. = *Thalictrum pyrenaicuro* Jord. = *Thalictrum schultzii* Jord., 1861, p. 400. = *Thalictrum majus* var. *arnaudi* (Jord.) Nyman = *Thalictrum medianum* Jord. = *Thalictrum capillare* Rchb., 1832, p. 729. = *Thalictrum depauperatum* Arv.-Touv., 1872. = *Thalictrum fallacinum* Gren. = *Thalictrum fallacinum* Gren. ex Lecoy., 1885, p. 271. = *Thalictrum longipedunculatum* Sennen. = *Thalictrum silvaticum* Sennen. = *Thalictrum vergens* Sennen. = *Thalictrum nutans* Gilib. ; Poiret ; Poir. ex Lam. & DC., 1805. ; Vill., 1786, p. 84. = *Thalictrum praeruptum* Timb.-Lagr. = *Thalictrum virescens* Timb.-Lagr. = *Thalictrum minus* var. *montserratense* Pau. = *Thalictrum subtrigynum* Rchb. = *Thalictrum subtrigynum* Rchb. ex Lecoy., 1885, p. 320. Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae.

Thymus silvicola Rouy, 1909. = ***Thymus serpyllum* L., 1753. (Thym serpolet, Serpolet à feuilles étroites). INPN. Herbier SLL : Récolté à La Pape, Rillieux-la-Pape, Rhône par Roffavier, juin 1816. ; à Chauffailles, Saône-et-Loire par Ecole normale du Rhône, juin 1816. ; au bord du Rhône, Lyon, Rhône par Balbis, juillet 1823. ; à Sallenoves, Haute-**

- Savoie par Pollier, juillet 1889. ; à la Tronche, Savoie par Commandeur, septembre 1917. ; à Décines, Rhône par Boudet, juin 1927. ; à Bénonces, Ain par Mérit, août 1928. ; à Tignieu-Jameyzieu, Isère par Boudet, ? = *Serpyllum vulgare* Fourr., 1869. = *Serpyllum angustifolium* Fourr., 1869. = *Thymus serpyllum* var. *angustifolius* (Schübl. & G.Martens) Cariot & St.-Lag., 1889. Magnoliopsida, Lamiales, Lamiaceae.
- Trifolium montanum* var. *flaviflorum* Rouy, 1899, p. 77. = *Trifolium celtibericum* Pau, 1887, p. 7. = *Trifolium balbisianum* Ser., in DC. 1825, p. 201. = ***Trifolium montanum*** subsp. ***montanum*** INPN. (Trèfle des montagnes). = *Trifolium subulatum* Gilib., 1782, p. 90. Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae.
- Montia minor* var. *lamprosperma* (Cham.) Rouy & Foucaud. = *Montia decumbens* Saint-Lager 1880. = *Montia alsine-facie* Gilibert 1782. = *Montia chaberti* Gandoger 1875, p. 96. = *Montia fontana* L., 1753. INPN. = ***Montia fontana*** subsp. ***fontana***. Magnoliopsida. Caryophyllales, Montiaceae.
- Vaccinium myrtillus* var. *anomalum* Rouy, 1908. = *Myrtillus nigra* Gilib. = ***Vaccinium myrtillus*** L., 1753, p. 349. (Airelle myrtille, Myrtille, Maurette, Brimbelle). INPN. **Herbier SLL : Récolté à Narreyoux, Puy-St-Vincent, Hautes-Alpes par Ronot, juillet 1968. ; Massif du Pilat, Loire par Ronot mai 1993. Récolté au col de la Luère, Rhône par Coquillat, mai, 1941. ; à la Jasserie, le Pilat par Borel, Juin 1975.** Magnoliopsida, Ericales, Ericaceae.
- Verbascum chaixii* var. *urticifolium* (Lam.) Rouy, 1909. = *Verbascum nitidum* var. *dentatum* Cariot & St.-Lag., 1889. = ***Verbascum chaixii*** Villard, 1779, p. 22 in Gandoger, 1875, p. 162. (Molène de Chaix), INPN. **Herbier SLL. Récolté à Gréoux-les-Bains, Alpes de Haute-Provence par Balbis, juin 1840. ; à Villeurbanne, Rhône par Boudet, juillet, 1935.** Magnoliopsida, Lamiales, Scrophulariaceae.
- Verbascum phlomoides* subsp. *thapsiforme* Rouy, 1909. = *Verbascum grandiflorum* Poiret 1814. = ***Verbascum eremocharis*** Gandoger 1875, p. 161. = *Verbascum densiflorum* Bertol., 1810. INPN. (Molène faux-bouillon-blanc, Molène à fleurs denses). Magnoliopsida, Lamiales, Scrophulariaceae.
- Verbascum floccosum* var. *gymnostemon* (Franch.) Rouy, 1909. = *Verbascum floccosum* var. *heterophyllum* Rouy, 1909.
- Verbascum pulverulentum*** Villars, 1779, p. 22 in Gandoger, 1875, p. 162. **Herbier SLL. Récolté à Pierre-Bénite, Rhône par Balbis, juillet 1822. ; à Tignieu-Jameyzieu, Isère par Boudet, Juillet 1945.** = *Lychnitis pulverulenta* (Vill.) Fourr. =
- Vulpia unilateralis*** (L.) Stace, 1978, p. 350. INPN. (Vulpie unilatérale). **Herbier SLL : Récolté Saint-Genis-Laval, par Mme C. Lortet, 1813.** = *Brachypodium biunciale* (Vill.) Roem. & Schult., 1817, p. 746. = *Brachypodium hispanicum* (Reichard) Rchb., 1831, p. 140. = *Nardurus hispanicus* (Reichard) Rchb., 1850. = *Catapodium tenellum* var. *aristatum* (Tausch) Maire, 1955, p. 212. = *Nardurus maritimus* var. *aristatus* (W.D.J.Koch) Maire, in Jahandiez & Maire, 1931, p. 78. = *Nardurus maritimus* var. *trabutii* Maire, 1942, p. 96. = *Nardurus tenellus* var. *trabutii* Maire, 1942. = *Vulpia hispanica* var. *villosa* (Maire) Carreras,

1986. = *Nardurus maritimus* var. *biuncialis* (Vill.) Rothm. & P.Silva, 1939. = *Nardurus gandogeri* Gredilla, 1900, p. 146. = *Nardurus tenellus* var. *muticus* Gren., 1869. = *Nardurus tenuiflorus* var. *aristatus* (W.D.J.Koch) Rouy, in Rouy & fucaud, 1913, p. 300. = *Nardurus tenuiflorus* var. *muticus* Boiss. ex Rouy, 1913. = *Triticum biunciale* Vill., 1787, p. 167. = *Triticum hispanicum* Vill. = *Vulpia maritima* Gray, 1822, p. 124.